Asatrus®
Atrazine 50% WP
(Herbicide)

It is a herbicide which contains 50% W.P. w/w atrazine active ingredient and balance adjuvants.

Recommendation :

Crops	Common name of weeds	A.I. (Kg)	Dosage / Ha Formulation (Kg)	Dilution in Water (Litr)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
Sugar-cane	Portulaca oleracea, Digiteria spp., Boerhaavia diffusa, Euphorbia spp., Tribulus terrestris	0.50-2.0	1.0-4.0	500 -700	--
Maize	Trianthema monogyna, Digera arvensis, Echinochloa spp., Eleusine spp., Xanthium strumarium, Brachiaria spp., Digitaria spp., Amaranthus virdis, Cleome viscosa, Polygonum spp., Polygonum spp.	0.5-1.0	1.0-2.0	500-700	--

Re-entry Period : 24 hours.

Direction of Use : Plant Protection Equipment: Knapsack Sprayer, Compression Knapsack Sprayer, Compression Knapsack Battery Sprayer with flat fan or Flood zet nozzle.

Weather Condition(in general): Do not spray during rainy, windy and hot sunny period

Soil & Water(where ever applicable): This Herbicide is for foliar application and has no adverse effect when used at recommended dose. Avoid using near aquaculture.

Application Timing: Should be applied preferably in the morning or evening hours

Frequency : One application

Stages during which pesticides should not be applied on any crop : After three days of sowing /planted (Post emergence of weeds)

Cautions : It may be used with caution is the areas where the ground water level high.

Time of Application: Maize : Immediately after transplanting (pre-emergence).

Sugarcane : Pre-emergence on weed free soil.

Precaution: 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Precautions to be taken to avoid harm to the beneficial insects like honey bees and natural enemies of pests.

Symptoms of Poisoning : Headache, nausea, vomiting, dizziness, tremors, possibly coupled with diarrohoea may occur.

First Aid : 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminate skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaiminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity : The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Antidote : No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of Used Container : 1. Packages shall be broken and burried away form habitation. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages or surplus materials and washing from the machines and containers should be disposed of in a safe manner as to prevent environmental water pollution.

Storage Conditions : 1. The packages containing the materials shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of or shall be kept in separete almirahs under lock and key depend upon the quantity and nature of the herbicide. 2. The rooms or premises meant for storing the herbicide shall be well built, dry, well-lit and ventilated and of sufficient dimensions to avoid concentration with vapour.

Chemical Composition :

Atrazine Technical (based on 80% w/w a.i.)	62.50% w/w
Anionic wetting and dispersing agent (Tamol, NNO)	3.00% w/w
Anionic suspending agent (dedenol-G)	5.00% w/w
Non-ionic Ethylene oxide {adduct of alkyl phenols (Rg-3113)}	5.00% w/w
Inert Carrier (China clay)	24.50% w/w
Total :	100.00% w/w

Warnings: 1. Not to be used on crops and pests other than mentioned on label/leaflet. 2. Not to be used for post harvest application. 3. Destroy Container after use as directed on leaflet. **4. Dangerous to re-use empty containers.**

एसाट्रस
एट्राजीन ५० प्रतिशत डब्लू.पी.
(खरपतवारनाशक)

यह एक खरपतवार नाशक है। जिसमें ५० प्रतिशत सक्रिय तत्व तथा बाकी सहयोगी पदार्थ है।

उपयोग :

फसल	खरपतवारों के नाम	मात्रा/हेक्टर स.तत्व. (कि.ग्रा.)	मात्रा/हेक्टर संरचना (कि.ग्रा.)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिडकाव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों में)
गन्ना	क्रेब घास विष खपरा दूधी बडा गोखरु कुल्फा	०.५०से२.००	१.००से४.००	५००-७००	-
मक्का	पत्थर चट्टा लहसुआ सावांक माडला गोखरु बंसी क्रेब घास जंगली चौलाई हुल हुल जंगली गेंहू छोटा धतुरा	०.५०-१.०	१.०-२.०	५००-७००	-

पुन: प्रवेश अवधि: २४ घंटो के बाद

उपयोग के लिये निर्देश : छिड़काव यंत्र : नैपसेक स्प्रेयर, कम्प्रेशन नैपसेक स्प्रेयर, कम्प्रेशन नैपसेक बैटरी स्प्रेयर जिसमें फ्लैट फैन मक्का और ब्राजर ब्लैकेट एप्लिकेशन, गन्ना : उगने के पहले । हाइ वाल्यूम छिड़काव आलु : ब्लैंकेट एप्लिकेशन 'जुताई'

मौसम की स्थिति : बरसात,हवा और धूप की अवधि के दौरान स्प्रे न करें।

मिट्टी और पानी: यह हर्बीसाइड पर्ण आवेदन के लिए है और अनूशंसित खुराक पर उपयोग किए जाने पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। जलीय कृषि के पास उपयोग करने से बचें।

आवेदन का समय: अधिमानत: सुबह और शाम के समय।

आवृत्ति: एक बार इस्तेमाल।

चरण जिसके दौरान किसी भी फसल पर कीटनाशक नहीं लगाया जाना चाहिए: बुआई/रोपन के तीन दिन बाद (खरपतवारों के उभरने के बाद)

चेतावनी : जहाँ पर भू-जल स्तर उपर हो वहां पर उस खरपतवारनाशी का उपयोग सावधानी पूर्वक करें।

छिड़काव का समय : मक्का : जुताई के तुरन्त बाद 'उगने के पहले' । गन्ना : उगने के पहले घासपात मुक्त जमीन पर, आलु : जुताई के तुरन्त बाद।

प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानिया : १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें। २. मूहं, त्वचा और आंखो के संम्पर्क से बचायें। ३. छिड़काव की धाम्र को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचाये। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपडो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोंए। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नही चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें।

शहद की मक्खियों और कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं जैसे लाभकारी कीडों से नुकसान से बचाने के लिए बरती जाने वाली सावधानियां:

विष के लक्षण : सिरदर्द, मतली, उल्टी, चक्कर, अकडन कंपकंपी तथा सम्भवत: दस्त हो सकते है।

प्राथमिक चिकित्सा : १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराये यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकाला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराये। २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपडे उतार दे और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोंए। ३. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन / साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोंए। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी का शुद्ध हवा में ले जायें।

पौध विशाक्तता : सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह खरपतवारनाशक पैधविशाक्त नहीं है।

विषनाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. खाली डिब्बों को अच्छी तरह तोड फोड कर आबादी से दूर जमीन में गाड देना चाहिए। २. खाली डिब्बों को उपयोग के बाद बाहर इस तरह न रखें कि उनका दुबारा प्रयोग कर सके। ३. खाली डिब्बों, बची हुई घासपात नाशक और डिब्बों तथा यंत्रो के धोवन को सुरक्षित रीति से निपटारा करें ताकि पीने का पानी तथा वातावरन के प्रदुषित होने की आशंका न रहें।

संग्रहण की शर्तें : १. घासपात नाशक के पैकटों को अलग-अलग कमरों या अलमारियों में अन्य पदार्थो सहत करके खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कमरों या जगह से दूर या अलग-अलग अलमारियों में घासपात नाशक के प्रमाण व प्रकार के अनुसार ताला चाबी में बंद करके रखा जाना चाहिए। २. जिस कमरे या जगहों में घासपात नाशक का भंडारण करना हो वह जगह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाश युक्त व हवादार और आयतन में पर्याप्त लम्बा चौडा होना चाहिए ताकि घासपात नाशक के भाप से वातावरन के प्रदूषित होने का भय न रहे।

रासायनिक संरचना:

एट्राजीन टेक्निकल (भारानुसार ८० प्रतिशित भार/भार स.त. पर आधारित)	६२.५० %भार/भार
आयोनिक वेटिंग और डिस्परसिंग एजेन्ट (तामोल एन एन ओ)	३.००%भार/भार
एनआयोनिक सस्पेंडिंग एजेन्ट (डेडेनोल-जी)	५.००%भार/भार
नान-आयोनिक इथोलिन आक्साइड (एडक्ट ऑफ एलकाइल फीनोल (आर जी-३११३)	५.००%भार/भार
इन्टर्ट कैरियर्स (चायना क्ले)	२४.५०%भार/भार
योग	१००.००%भार/भार

चेतावनी : १. लिफलेट और लेबल मे सिफारिश किये हुये फसलों और किट के सिवा अन्य पर इस्तेमाल न करें। २. फसल कटाई के बाद किये जाने वाले अन्य उपचार मे शामील न करें। ३. इस्तेमाल के बाद डब्बों को लिफलेट मे दिये हुये तरीके से नष्टकरें। **४. खाली डिब्बों को दुबारा उपयोग करना खतरनाक है।**

एसाट्रस
अट्राझीन ५०% डब्ल्यू पी
(तणनाशक)

हे एक तणनाशक असून त्यात ५०% डब्ल्यू पी व/व अट्राझिन सक्रिय तत्व आणि इतर संबंधित घटक आहेत.

शिफारस :

पीक	तणाचे सामान्य नाव	प्रमाण / हेक्टरी स.त. (कि.ग्रॅ.)	प्रमाण / हेक्टरी द्रावण (कि.ग्रॅ.)	सौम्य करण्यासाठी पाणी (लिटर)	शेवटची फवारणी काढणी करण्यासाठी कापणीतील वाट पाहण्याचा कालावधी (दिवसात)
ऊस	डिजिटेरिया एसपीपी बोचांव्हिया डिफ्यूसा युफोर्बीया एसपीपी ट्रायब्युलस टेरेस्ट्रीस पोर्टुलाका ओलेरेसिया	०.५०ते२.०	१.०ते४.०	५००ते७००	—
मका	ट्रायन्थमा मोनोगायना डायजेरा ॲरेव्हन्सीस इल्यूसिन एसपीपी इचिनोक्लोवा एसपीपी झेन्थियम स्ट्रुमरिअम ब्रचिट्रिया एसपीपी डिजिटेरिया एसपी ॲमरन्थस विरीडीस क्लिओम विस्कोसा पॉलिगेनम एसपी	०.५ ते १.०	१.० ते २.०	५०० ते७००	—

पुन: प्रवेश कालावधी: २४ तासांनंतर ।

वापरासाठी निर्देश: रोपसुरक्षा उपकरणे नॅपसॅक स्प्रेयर,कम्प्रेशन नॅपसॅक स्प्रेयर, कम्प्रेशन नॅपसॅक बॅटरी स्प्रेयर फ्लॅट फॅन वा फ्लड जेड नोजल.

हवामानाची स्थिती (सर्वसाधारणपणे): पावसाळी, वादळी आणि कडक उन्हात फवारणी करू नका.

माती आणि पाणी (जेथे लागू असेल) : हे तणनाशक पर्णिय फवारणीसाठी आहे आणि शिफारस केलेल्या प्रमाणामध्ये त्याचा वापर केल्यावर कोणताही विपरीत परिणाम होत नाही. जवळील मत्स्यशेतीत वापरणे टाळा.

फवारणीची वेळ: शक्यतो सकाळी किंवा संध्याकाळी फवारणी करावी.

वारंवारता: एकदा फवारावे.

कोणत्या टप्प्यात कोणत्याही पिकावर कीटकनाशके वापरू नयेत अशी अवस्था: पेरणी/लागवड केल्यानंतर तीन दिवसांनी (तण उगवल्यानंतर)

सावधान : जर पाण्याची पातळी जमिनीच्या वर असल्ल तर घ्या तणनाशकाचा वापर सावधान पूवक करा.

फवारणीची वेळ : मका : रोपणी नंतर लगेच (उगवण्यापूर्वी) ऊस : उगवण्यापूर्वीची तणमुक्त जमीन.

खबरदारी : १) अन्नपदार्थ, अन्नपदार्थाचे रिकामे ड्रमे हे जनावरांच्या चाचापासून दूर ठेवा. २) तोंड, डोळे आणि त्वचेशी संपर्क होवू देंवू नका. ३) फवारणीचे तुषार श्वासाद्वारे आत घेंवू नका. दाचापाच दिशेने फवारणी करा. ४) फवारणी नंतर दूषित झालेले कपडे आणि शरीराचा भाग स्वच्छ धुवा. ५) फवारणी करताना धुम्रपान, खादू-पीवू वा चघळू नये. ६) फवारणी द्रावन बनविताना संपूर्ण संरक्षित कपडे वापरावेत.

फायदेशीर कीटक जसे की मधमाश्या आणि कीटकांचे नैसर्गिक शत्रू यांचे नुकसान टाळण्यासाठी ध्यावयाची खबरदारी.

विषबाधेची लक्षणे : डोकेदुखी, मोळक येणे, चेरी येणे, मळमळ, उलट्या होणे, दृष्टी अंधुक होणे, पाण्यासारखे जुलाब होणे, आंकडी, थाम येणे, डोळ्यातून अधिक पाणी येणे आणि तीव्रपदे लाळ सुटणे अशी लक्षणे दिसू शकतात.

प्रथमोपचार: १) जर गिळले गेले असेल तर, घशात बोट घालून उल्टी करवावी हीच क्रिया पुन: पुन: करीत रहावी जो पर्यंत उल्टी साफ होत नाही. जर रूग्ण बेशुद्ध असेल तर उल्टी करवू नये. २) जर कपडे व त्वचा दूषित झाल्यास दूषित कपडे काढा व त्वचा भरपूर साबण व पाण्याने धुवा. ३) जर डोळ्यात गेले तर भरपूर प्रमाणात सलाइन/स्वच्छ पाण्याने उघडा-उघडा १०-१५ मिनीटे धुवा. ४) जर श्वासाद्वारे आत गेल्यास रूग्णास मोकळ्या हवेत आणा.

रोप विषकता : शिफारस केलेल्या प्रमाणानुसार वापर केल्यास हे तणनाशक रोपविषकारक नाही.

विषोपचार: कोणताही खास विषोपचार माहित नाही, लक्षणानुसार उपचार करा.

रिकाम्या डब्यांची विल्हेवाट: १) रिकामी पाकीटे मोडून-तोडून वस्तीपासून दूर जागी जमिनीखाली पुरावीत. २) पुन: ऊपयोग कामासाठी वापरली जाऊ नये म्हणून रिकामी पाकीटे उघड्यावर टाकू नयेत. ३) पाकीटे किंवा उरलेले द्रावन किंवा फवारणीची उपकरणे धुतलेले पाणी यांची विल्हेवाट पर्यावरण किंवा पाणी प्रदुषित होणार नाही अशा सुरक्षित पद्धतीने लावावी.

साठवण: १) हे रसायन असणारी पाकीटे इतर माल ठेवण्यासारखी असलेल्या जागा वा खोल्या यापासून विशेषत: अन्नपदार्थ ठेवण्यासाठी असलेल्या जागा वा खोल्या यापासून दूर जागी वा खोल्यात किंवा साहित्याचा दर्जा व स्वरूप यांचा विचार करून कपाटात कडीकुलपात ठेवावीत. २) हे साहित्य साठा करून ठेवण्याची जागा उत्तम बांधणीची कोरडी, हवा खेलती राहणारी भरपूर उजेडाची व पुरेशी मोठी असावी, त्यामुळे वाफांची होणारे प्रदुषण टळेल.

रासायनिक संरचना:

अट्राझिन टेक्निकल (८०%व/वस.त. वर आधारित)	६२.५०%व/व
ॲनिओनिक वेटींग आणि डिस्पर्सिंग एजन्ट (टेमॉल,एनएन ओ)	३.००%व/व
ॲनिओनिक सस्पेंन्डींग एजन्ट (डेडीनोल-जी)	५.००%व/व
नॉन-आयोनिक इथोलिन ऑक्साइड (ॲडक्ट ऑफ अल्केल फिनॉल्स (आरजी-३११३)	५.००%व/व
इनर्ट कॅरिऊर (चायना क्ले)	२४.५०%व/व
एकूण	१००.००%व/व

चेतावणी: १. लेबल और पत्रक पर जो वर्णित है, उससे भिन्न फसल और नाशकजीव पर उपयोग के लिए नहीं। २. कटाई के बाद के उपयोग के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए ३. पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात आदयान को नष्ट करें। ४.**रिकामी डबे पुन्हा वापरणे धोकादायक.**

અસત્રસ
ઍટ્રાઝિન ૫૦% ડબ્લ્યુ પી
(વૃણનાશક)

ઍટ્રાઝાઇન એક પસંદગીકૃત નીંદણનાશક છે, જેમાં ૫૦% વ/વ ઍટ્રાઝાઇન સ.ત. ૦૫૦ અને અન્ય સંબંધિત દ્રવ્યો સામેલ છે.

ભલામણો:

પાક	નીંદણોનાં સામાન્ય નામ	માત્રા / હૅક્ટર સ.ત. (કિ.ગ્રા.)	માત્રા / હૅક્ટર દ્રાવણ (કિ.ગ્રા.)	પાણીમાં લેવાયણી (લીટર)	છેલ્લા છંટકાવથી લણણી સુધીનો પ્રતિક્ષા સમય (દિવસમાં)
શેરડી	લૂણી કડીવુ આદીવું દૂધિ, સામો	૦.૫ થી૨.૦	૧.૦થી૪.૦	૫૦૦થી ૭૦૦	-
મકાઈ	સાંઠો,કણસરો સામો,મૂમશિ ધતુરો, કડીવુ આદીવું આરોગારો બોકડુ બોકડુ	૦.૫ થી૧.૦	૧.૦થી૨.૦	૫૦૦થી ૭૦૦	-

પુનઃપ્રવેશ સમયગાળો: ૨૪ કલાક પછી.

વાપરવા અંગે નિર્દેશ : છંટકાવમાં વાપરવાનાં ઉપકણો : ફ્રૅક્ટ ફૅન અને ફ્લડેડ નોઝલ લગાડેલાં નૅપસૅક સ્પ્રેયર, કૉમ્પ્રેશન નૅપસૅક સ્પ્રેયર, કૉમ્પ્રેશન નૅપસૅક બૅટરી સ્પ્રેયર.

હવામાનની સ્થિતિ (સામાન્ય): વરસાદ, પવન અને ગરમીના સમયગાળામાં છંટકાવ નહીં કરો.

માટી અને પાણી (જ્યાં લાગુ હોય): આ નીંદણનાશક પાર્ણિય છંટકાવ માટે છે અને ભૂલેચક માત્રામાં ઉપયોગ કરાય ત્યારે કોઈ માઠી અસર ધરાવતું નથી.મત્સ્યપાલન નજીક ઉપયોગ કરવાનું ટાળો.

છંટકાવનો સમય: સવારે અથવા સાંજના સમયે છંટકાવ કરવો જોઈએ.

આવર્તવતા: એક છંટકાવ.

કોઈ પાણ પાક પર જંતુનાશકનો છંટકાવ નહીં કરવો જોઈએ તે તબક્કા: વાવણી / રોપણીના ત્રણ દિવસ પછી (નીંદણ ઊભરતા પહેલા).

સાવધાની : જ્યાં ભૂમિગત પાણીનું સ્તર ઉંચું હોય તેવા વિસ્તારમાં અને ઉપયોગ સાવધાનીપૂર્વક કરી શકાય.

છંટકાવનો સમય: મકાઈ: વાવણી કર્યા પછી તરાત.

શેરડી: રોપણી અથવા વાવણી ના 3-4 દિવસમાં.

સાવચેતીઓ: ૧) ખાદ્યપદાર્થો, ખાલી પદાર્થોના ખાલી પાત્રો અને પશુઆહારથી દૂર રાખો. ૨) મોં, આંખો અને ત્વચાથી દૂર રાખો. ૩) છંટકાવનું ધુમ્મસ શ્વાસમાં લેવાનું ટાળો. પવનની દિશામાં છંટકાવ કરો. ૪) છંટકાવ કર્યા પછી દૂષિત થયેલાં કપડાં અને શરીરના ભાગો ફોપૂર્ણ ધોઈ નાંખો. ૫) છંટકાવ કરતાં પહેરી ધૂમ્રપાન ન કરો, ઉંઘવાળ પીનો, ખાશો અને ચાવો નહીં. ૬) મિશ્રણ કરતી અને છંટકાવ વખતે સંપૂર્ણ રક્ષણકારક કપડાં પહેરો.

મધમાખીઓ અને જંતુના નૈસર્ગિક શત્રુઓ જેવા લાભકારી જંતુઓને હાનિ ટાળવા માટે લેવાની સાવચેતીઓ:

ઝેર ચઢવાનાં લક્ષણો: માથાનો દુઃખાવો, ચક્કર, ગભરાટ, ઉબકા, ઉલટી, ઝાંખી દૃષ્ટિ, અતિસાર, આંચકી, પસ્તોવો થવો, લથ પડવાં અંતુ ગળવાં અને લાળ ગળવી એવું થઈ શકે.

પ્રાથમિક સારવારનાં પગલાં: ૧) જો ગળવામાં આવે, તો ગળામાં આંગળાં નાંખી ઉલટી કરાવો. જ્યાં સુધી ઉલટીનું પ્રવાહી સાફ ના આવે ત્યાં સુધી આમ કરતા રહો. જો દરદી બેભાન હોય, તો ઉલટી કરાવવા પ્રયાસ ન કરો. ૨)દૂષિત થયેલાં કપડાં કાઢી નાંખો અને દૂષિત થયેલી ત્વચા પુષ્કળ પાણી અને સાબુવડે ધોઈ નાંખો ૩) જો આંખો દૂષિત થવા પામે, તો આશરે ૧૦ થી ૧૫ મિનિટ સુધી પુષ્કળ મીઠાના/ લોખના પાણી વડે ચાલક મારીને ધુલો. ૪) પેટમાં ગઈ હોતો, દરદીને તાજી હવામાં ખસેડો.

વનસ્પતિ માટે ઝેરકારક: ક્ષેત્રીય ભલામણો મુજબ વાપરવામાં આવે ત્યારે ઉત્પાદન વનસ્પતિ માટે ઝેરી છે.

ઝેરનું મારણ: કોઈ ચોક્કસ મારણ જાણમાં નથી, લક્ષણો અનુસાર સારવાર આપો.

ખાલી પાત્રોનો નિકાલ: ૧. પેકેજીસ જાંગી નાંખવાં અને વસ્તીથી દૂર ઠાંટી દેવાં. વપરાયેલાં પેકેજીસ વહાર રાખવાં નહ૬. બેચી તેમની ફરીથી ઉપયોગ થતો અટકે. પેકેજીસ અથવા વધારાની સામગ્રી અને મશીનમાંથી ધોવાણોનો બેચી સરાસર નિકાલ કરવો બેચી પર્યાવરણનું અને જળ પ્રદુષણ ઘટું અટકે.

સંગ્રહ: ૧) સામગ્રી ધરાવતા પેકિંગ, બીજા વીખવસ્તુઓ ખાસ કરીને ખોરાકની બીજ વસ્તુઓ સંગ્રહવા માટે વપરાતા ઓરડાઓ અથવા જગ્યાથી દૂર અલગ ઓરડાઓ અથવા જગ્યામાં સંગ્રહવાં અથવા સામગ્રીમાં જથ્થા અને પ્રકાર ઉપર આધારિત અલગ કબાટમાં તાળાં વાળીમાં બંધ કરીને રાખવાં. ૨) સામગ્રી સંગ્રહવા માટેના ઓરડાઓ અથવા જગ્યા ત્રણે પ્રકારથી ધરાવતાં, સારી બાંધણીનાં, સૂકાં, હવાઈ ઝ અને પૂરતી ઓરડાશીવાળાં હોવાં જોઈએ જેથી વરાળથી પ્રદુષિત થવાનું ટાળી શકાય.

રાસાયણિક સંયોજન:

ઍટ્રાઝાઇન ટેકનિકલ ૮૦%વ/વ શુદ્ધતા પર આધારિત	૬૨.૫૦% વ/વ
ઍનિયોનિક વેટીંગ અને ડિસ્પર્સિંગ દ્રવ્યો ટૅમોલ (આલ્કાઇલ ફૅક્ષાઇલ પ્રકાર)	૩.૦૦%વ/વ
ઍનિયોનિક સસ્પેન્ડિંગ ઍક્ષેટ (ડેડીનોલ-જી)	૫.૦૦% વ/વ
નોન-આયોનિક ઈથોક્સીલેન (એલ્કાઇલ ફૅનોલનો ઍડક્ટ ઑફ આલ્કાઇલ ફેનોલ્સ (આરજી-૩૧૧૩))	૫.૦૦% વ/વ
ભ્રેમજુદ્રક કૅરિયર (ચીનાઈ માટે)	૨૪.૫૦%વ/વ
કુલ	૧૦૦.૦૦ % વ/વ

ચેતવણી : ૧. આ પત્રક અને લીફલેટ પર ઉલ્લેખ સિવાયના પાક અને જંતુઓ પર ઉપયોગ નહીં કરવું જોઈએ, ૨. લણણી પશ્ચાત છંટકાવ માટે ઉપયોગ નહીં કરવો જોઈએ. ૩. પત્રક પર નિર્દેશ અનુસાર ઉપયોગ પછી કન્ટેઈનરનો નાશ કરો. **૪.ખાલી કન્ટેઈનર ઉપયોગ કરવાનું ખતરનાક છે.**

અસાટ્રસ
ઍટરાઝીન ૫૦% ડબલયુ.પી.
(નદીનનાશક)

દિવ ક્રિય નદીનનાશક વૈ સિમ વિંધ ૫૦% ડબલ્યુ.પી. વ/વ ઍટરાઝીન વિલિમાશીલ તંત્ર અંતે બચાવી સપિયેંગી તંત્ર શામલ ગઠા

સિફારસ:

ક્રમલ	નદીન ના આમ નાં	માત્રા/હેક્ટર સ.ત. (કિ.ગ્રા.)	માત્રા/હેક્ટર દ્રાવણ (કિ.ગ્રા.)	પાણીની જરૂરિયાત (લીટર)	છેલ્લા છંટકાવની લણણી સુધીનો પ્રતિક્ષા સમય (દિવસમાં)
શેરડી	લુસ્ટર વેલ્ધ ઘાસ દૂધવ ઍવરજીલીયા ઝીઝિફુમા	૦.૫૦ થી ૨.૦	૧.૦ થી ૪.૦	૫૦૦-૭૦૦	-
મૉવી	ઈંટિસિટ મૅનોસ્ત્રોના ટૉંડલા બ્યાણ્ટા મૉવડા સાંઠીઅમ ઇચોનિકલૅવ્ય સપ. સટુવર્તીઅમ બ્રાચીટ્રીઆ સપ. વેલ્ધ ઘાસ ચૌલાઈ કલીઉવ દિમસેમા પૅલોમેનમ સપ. પૅલોમેનમ સપ.	૦.૫ થી૧.૦	૧.૦થી૨.૦	૫૦૦-૭૦૦	-
મોચુકઈંચુ	ગોઝીઝ પેનોઝોરા કાચી સ્ટ્રી ઈંટ પાનસ પાસોની ગાઝ ગ્રાસ ચઝુલાઈટ્રી પેનસેટોઝારા મચુગાલેવા ગોઝોરા મચુગાલેવા ગોઝોરા	૦.૫ - ૧.૦	૧.૦ - ૨.૦	૫૦૦-૭૦૦	-

આપમી પ્રદેશ ફી નિમાણ: ૨૪ ઘંટિમાં બાખદ ।

વરસ્ત લશી દિલાઈ: પેદા સુર્નિયા મશીનો: કૈપમૈસ સપ્રેમલ, લ્યૈપ્રસ કૈપમૈસ સપ્રેમલ, લ્યૈપ્રસ કૈપમૈસ બૈટરી સપ્રેમલ, ફ્લૈટ ફૈન સાં ફ્લડેડ મૈંન્ટ નૈઝલ લલા કે।

મોસમી વરસ્ત (આમ કરવે): મૈંગિ-વલ્ટી,ચેત્ર તવ્ય અંતે વલ્ટવી ધુંપ વાલે દિન ના વરસ્તે।

મિંટી અંતે પાન્ટી: (જિંચે લી લાગુ ચૌંદે): દિવ નદીનનાશક પૅત્તી ક્રિકલ્ચાઅ લશી વૈ અંતે મુશ્તાદી લાશી માન્ડર વિંદ વરસ્તન નાલ કેલી તુકમાન નવીં વરસ્ત। નલ-પ્પાન્ટી પાલ્ત મંશાનાં લે ચેત્રે ના વરસ્તે।

વરસ્તન લી સમં: ચિવરસ વૈ કિ દિસ નૈ સવેર નાં શામ લે વેલે વરસ્તિઆ જાણે।

ચાર્ંચેવારસ્ત: દિવ વાર વરસ્તે।

ઉપ વાલસ્તં નિગું દિવ કિસે લી ક્રમલ દિવ કીટનાશક નવીં વરસ્તે ચાવીંદે: ચિનાઈ / ચૈપાઈ (નદીનાં લે ઉંગ્રૈંગન તૈ ધાન્દ) તૈ ત્રિંન દિન બાખદ।

ચેતાવની: જિંચે પાણી લા ચૈલલ ઉંગ્રૈંચા ચૈદે, ઉંગ્ર દિલાકે વિંધ દિવ કે ગ્રાવધાની નાલ વરસ્તિઆ જા સકલા વૈ।

વરસ્ત લા સમં: મૈંગી: ચૈપાલે કલન તૈ બાખદ (ઉંગ્રૈંગન તૈ પહિલાં) ઢૈલન વરસ્તે।

ભૈંન: નલૈંગાં તૈ મુલક ઉંગ્રૈંગન તૈ પહિલાં વરસ્તે।

સાવધાનીખાં: ૧) ઉંગન, ઉંગન વાલે ખાલી વરસ્તનાં અંતે પશુ ચારે તૈ દૂર રંખે। ૨) મુંહ, અંખાં વિંદ તે ચમડી 'તે ના સંલાટ દિંણે। ૩) સપ્રે કુવાર નું ગ્રગ રાપૌં અંદલ ના દિંણે। સપ્રે વલ્ટા વલાટ લે ચુંધ વિંદ પી કલે। ૪) સપ્રે કલન તૈ બાખદ પલોત તૈંદે લાલે તે સલીત લે ભગ પી લલે। ૫) સપ્રે કલન ચૈંગન ના ચુલ ખાવિ પીંણિ, ના ગુમલગાન કલે। ૬) સપ્રે કલલે નાખં લલાખલી ચલન પંણિ।

મ્રદિલ લોંચે સંકટ: સિગપીલ, ચૈંવર, મુખમૈરી, ઉંધેંગ, ઉંણલી, ઉંદલી નલર, લગલ, વલ્લલ, પમોંગ, વાપુ અંચલુ અંતે ઘૈંવાં આંદિ

ક્રમર ટેક: ગિલપીલ, ચૈંવર, મુખમૈરી, ઉંધેંગ, ઉંણલી, ઉંદલી નલર, લગલ, વલ્લલ, પમોંગ, વાપુ અંચલુ અંતે ઘૈંવાં આંદિ

ક્રમર ટેક: ૧) નિનાલે ગાટ લી ગાલલ વિંદ લાલે તે અંલર ઠલંવે લલવે ઉંણલી લલન લલી ઉંગ્રૈંગન। ઉંણલી દા લલલ મગ્ર ચૈંટ ચલ દિંણ અંખલ ઘુગલવુંદે લલી। લૈલી ઘેંગેલ ચૈંલે તે ઉંણલી લલન લલી ના ઉંગ્રૈંગન। ૨) તે લલલે અંતે ચમડી પલોત તૈ ગાટ તે ગાલલે ઉંગ્રૈંગ તે પલોત ચૈંલી ચમડી નૈં વેંદ સાલે પાલી તે ગ્રાપુંદ નાલ પી સલી। ૩) તે અંખાં ઉંગ્રૈંગ અંગલ ચૈંલિંણ ચૈંલે, તાં ગ્રાદ્ર સાં ગૈલલોંલ પાલી નાલ ઘૈંટે-ઘૈંટ ૧૦-૧૫ મિંટાં કલ ધિંલે લલી। ૪) દલલાંલ સુંબી ગાટ 'તે લૈલી નૈં તાચી પલા વિંદ લે નાંણિ।

વિશ્રિનિલવલ: લૈલી નિલપાંલિલ વિશ્રિનિલવલ નવીં ચૈ। લિલગમલાં લે આપાલાંતે લિલગ કલે।

ખલી કંટેનર્સ લી નિપટલ: ૧. ખલી ચૈંલે કંટેનર્સ નૈં ઉંલ કંગ લે અંચલી તૈં દૂર ગ્રમીંલ ગેલાં લલી ચલ લે નલટ કલ વિંણે। ખલી ચૈંલે કંટેનર્સ નૈં બચલ ના પલે લલિંદ દિંણે ગાં કિ ચુંબલા ના વલ્લે ગા મલલે। પૈંલેગાં નાં વધુ ચલ લલી ઉંગ્રૈંગ લલી વલલાં તે મગીંલાં ચૈં ગિંલલે પૈંદ લે પલી લા નિપટલા ચિલ ત્રવૂં મૂર્સિયલ નાલ કલે વિંણે અંતે વલ્વલન લા પ્રદુલન ના ચૈંલે।

સંટેન: ૧. નલીનનાચલ લે કંચે ઉંગ્રૈંગી ચીંગાં પ્રગ કલલે ખલ વલ્લે પલવલ ચૈંલટ લે ચલલે તૈં દુર લિંગે લેંવલે ચલલે વિંદ લેંવલી અલમલી અંલર ચલા મગ લે લેંવે। ૨. લલલી ચૈંલટ વલ્લે ચલલે મચ્ચુલ બલે ચૈંદે, રોમલીલલ, ચલવલ, ઠંલે અંતે લેંવે સલીલ લે ગૈંદે ચલીંદે ચલ ગાં કિ ચલલ ગલ પલ્લલ ના ચૈંદે।

રાસાયણિક મિશ્રણ:

ઍટરાઝીન ટૈક્નીકલ ૮૦%વ/વ શુદ્ધતા પર આધારિત	૬૨.૫૦% વ/વ
ઍનિયોનિક વેટીંગ અને ડિસ્પર્સિંગ દ્રવ્યો ટૅમોલ (ટામોલ, એનએનઓ)	૩.૦૦% વ/વ
ઍનિયોનિક સસ્પેંડિંગ ઍજન્ટ (ડેડીનોલ-જી)	૫.૦૦% વ/વ
નૉન-આયોનિક ઈથોક્સીલેન (ઍડક્ટ ઑફ આલ્કાઇલ ફેનોલ્સ (આરજી-૩૧૧૩)	૫.૦૦% વ/

অস্যাট্রস্
অট্রাযিন্ 50% ডব্লু.পি
(ছত্রাকনাশক)

ব্যবহারের পূর্বে নির্দেশাবলী পড়ুন। প্রযুক্তিগত গ্রেড। ছত্রাকনাশক সক্রিয় উপাদান এবং বাহকের সমন্বয়ে গঠিত।

উপযোগিতা:

ফসল	রোগের নামসমূহ	মোতাদেয় / প্রস্তুতির মাত্রা			শেষ স্প্রে থেকে ফল তোলার পর্যন্ত অপেক্ষাকাল (দিন)
		সংস্থা (কিগ্রা)	কার্যকর (কিগ্রা)	প্রস্তুতির জল (লি)	
কুমড়া	ডাউনি মিলডিউ	0.50 থেকে 2.0	1.0 থেকে 4.00	500 থেকে 700	-
	পাউডারি মিলডিউ	0.5 থেকে 1.0	1.0 থেকে 2.0	500 থেকে 700	-
	কাঁকুড়ের অ্যান্থ্রাকনোজ				
	মরিচ ও টমেটোর ব্লাইট				
	ব্যাকটেরিয়াল ডাম্পিং অফ				
	উরদ ও মুগ ডালের হলুদ মোজাইক ভাইরাস				
	কাঁকুড়ের ফুসারিয়াম উইল্ট				
	উরদ ও মুগ ডালের পাতা কোঁকড়ানো ভাইরাস				
	উরদ ও মুগ ডালের সারকোস্পোরা পাতা দাগ				
	উরদ ও মুগ ডালের অ্যান্থ্রাকনোজ				

মন্তব্য- প্রস্তুতির জন্য ব্যবহৃত: 24 লিটার/হেক্টর।

ব্যবহার নির্দেশাবলী: সর্বোত্তম ফলাফলের জন্য: ন্যূনতম স্প্রেয়ার, কম্প্রেশন ন্যাপসাক স্প্রেয়ার, কম্প্রেশন ন্যাপসাক ব্যাটারি স্প্রেয়ার - ফ্লাট্ ফান বা ফ্লাট্ জেট্ নজল্ ব্যবহার করুন।

আবহাওয়া পরিস্থিতি (সাধারণত): বৃষ্টির দিনগুলিতে, প্রবল হাওয়ায় এবং উষ্ণ রোদজ্জ্বল দিনে স্প্রে করবেন না।

মাটি এবং জল (যথাযোগ্য প্রয়োগযোগ্য): এই আগাছানাশক পাতার উপর প্রয়োগ করার জন্য এবং কোনও বিপরীত প্রভাব পাওয়া যায়নি সুপারিশ করা মাত্রা ব্যবহার করা হয়। জলজ চাষের নিকটে ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

প্রয়োগের সময়: সকাল এবং বিকালের সময় এটি প্রয়োগের জন্য আদর্শ, তাই এই সময়টিতে প্রয়োগ করা উচিৎ।

প্রয়োগের সংখ্যা: একবার প্রয়োগ

ফসলের অবস্থা যখন কীটনাশকটি কোনও ফসলের উপর প্রয়োগ করা উচিৎ নয়: বপন রোপণের তিন দিন পরে (আগাছা নির্গমন পরবর্তী)।

সতর্কতা: যেখানে মাটির নীচের জলের স্তর উচ্চ, সেইসব এলাকাতে হাত এটি সবধানে ব্যবহার করতে হবে।

প্রয়োগের সময়:

ঢুট্টা: রোপণের ঠিক পরেই (গাজানোর আগে)।

আখ: আগাছাকুল মাটির ওপর (গাজানোর আগে)।

সতর্কতা: ১) বাদামবর্ষ, খালি পাত্রগুলি এবং পশুখাদ্য থেকে দূরে রাখুন। ২) মুখ, চোখ ও ত্বকের সংস্পর্শ এড়ান। ৩) স্প্রে করার কাজে হাতের মোজা এড়ান। বাতাসের অনুকূলে স্প্রে করুন। ৪) স্প্রে করার পর দৃষ্টিহ্রাস পোশাক ও হেলমেট ভালোভাবে ধুয়ে নিন। ৫) স্প্রে করার সময় ধূমপান, পানীয় পান, খাওয়া ও চোবানো নিষেধ। ৬) শোনান এবং স্প্রে করার সময় সম্পূর্ণ সুরক্ষামূলক পোশাক পরুন।

বন্ধুকীট যেমন মৌমাছি এবং কীটের প্রাকৃতিক শত্রুর ক্ষতি থেকে বিরত থাকতে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ: মাথাব্যথা, বিমুনিভাব, মাথাঘোরা, গরমি, বমি করা, ঝাপসা দৃষ্টি, পেটব্যথা, পেশি দুর্বলতা, ঘুম, অত্যাধিক লালাক্ষরা এবং চোখ দিয়ে জল পড়া পরিলক্ষিত হতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা: ১. গিলে ফেলে উপচয়ের আঙুল ঢুকিয়ে বমি করান। বমির তেল স্বচ্ছ না হওয়া পর্যন্ত বারবার করুন। রোগী অচৈতন্য থাকলে বমি করাবেন না। ২) পোশাক ও ত্বক সাফ্রাঁচিত হ'লে, পোশাক বদলে নিন এবং সাবান ও প্রচুর জল দিয়ে দূষিত ত্বক ধুয়ে দিন। ৩) চোখ দূষিত হ'লে প্রচুর সাদাজিনপরিষ্কার জল দিয়ে প্রায় ১৫ থেকে ১৫ মিনিট ধাপ্টা দিন। ৪) স্প্রেয়ে গোলে রোগীকে মুখব্যবৃত্তে সরিয়ে নিন।

বিষাক্ততা: ক্রোনে সুপারিশ মাত্রা ব্যবহারের ক্ষেত্রে উৎপন্নটি বিষাক্ত।

প্রতিষেধক: সুনির্দিষ্ট কোনও প্রতিষেধক জানা নেই, লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করানো।

খালি পাত্রের নিপ্তিকরণ: ১.খালি পাত্র ভেঙ্গে, জমকাটী থেকে দূরে গুঁতে ফেলতে হবে। ব্যবহৃত পাত্রের পুনর্ব্যবহার রোধ করতে তা ধ্বংস্ত ফেলে রাখবেন না। পাত্র বা উদ্বৃত্ত পদার্থ এবং দ্রেন্সে ফেলা বন্ধ করা তলানি এবং নিরাপদ উপায়ে নিপ্তি করতে হবে যাতে পরিবেশের এবং জলের দূষণ প্রতিরোধ হয়।

মন্তব্যসমূহ: ১) পদার্থ সম্বন্ধিত প্রাচীর বিশেষতঃ যানবস্তু মন্তব্যের জন্যে ব্যবহৃত ঘর বা স্থান থেকে দূরে পশুক ঘর বা স্থানে মন্তব্য করতে হবে অথবা পদার্থের পরিমাণ ও প্রকৃতিতে ওপর নির্ভর করে পশুক আমমাটিতে তলা বন্ধ করে রাখতে হবে। ২. পদার্থ মন্তব্য করার জন্যে ব্যবহৃত ঘর বা স্থানটি ইঁটের হবে, সুনির্মিত, শুকনো, ঠাণ্ডা, বাতাটিত এবং বাম্পশত্রুর দ্বারা হওয়া সুনির্মিত, শুকনো, ঠাণ্ডা, বাতাটিত এবং বাম্পশত্রুর দ্বারা হওয়া সাদ্রমন এড়াতে পর্যাপ্ত পরিসরযুক্ত।

রাসায়নিক সমিশ্রণ :

অ্যাট্রাজিন টেকনিকাল	
৮০% ওজন/ওজন সংযত্ত ভিত্তিতে	৬২.৫০০ ওজন/ওজন
আনিমিক সিক্তকারী এবং	
ছড়িয়ে পড়ার পদার্থ (ডিমেক্স, এনএন৩)	৩.০০০ ওজন/ওজন
আনিমিক নিলম্বিতকারী	
পদার্থ (ডেলেনার-জি)	৫.৫০০ ওজন/ওজন
আলকইল বেনজেনস	
নন-আয়োনিক ইথাইলিন অক্সাইড	
একত্রিকরণ (আরডি-৫১৬)	৫.০০০ ওজন/ওজন
নিষ্ক্রিয় সংবাহক (চিনেমাটি)	২৪.৫০০ ওজন/ওজন
মোট	১০০.০০০ ওজন/ওজন

সতর্কতা: ১. লেবেল এবং লিফলেটে উল্লিখিত ফসল এবং কীট ব্যতীত অন্যান্য ফসল এবং কীটের উপর ব্যবহার করা যাবে না। ২. ফসল কাটার পর ব্যবহার করা যাবে না। ৩. লিফলেটের নির্দেশ অনযায়ী খালি পাত্র নিষ্পত্তি করান। ৪.খালি পাত্রের পুনর্ব্যবহার বিপজ্জনক।

অ্যাসাট্রাস
অ্যাট্রাজিন ৫০% ডব্লুপি
(আগাছানাশক)

এটি একটি আগাছানাশক, যাতে আছে ৫০% ডব্লু.পি. ওজন/ওজন অ্যাট্রাজিন সক্রিয় উপাদান এবং বাহকের সমবায়ক পদার্থ।

সুপারিশ :

ফসল	আগাছার প্রজাতি নাম	মাত্রা/হেক্টর সংস্থা (কিগ্রা)	মাত্রা/হেক্টর কার্যকরণ (কিগ্রা)	তরলীকরণের জল (লি)	শেষ স্প্রে থেকে ফল তোলা পর্যন্ত অপেক্ষাকাল (দিন)
আখ	নুনিয়া, দূর্বিয়া বথুয়া, বোক্রহাভিয়া ডিফুসা	০.৫০ থেকে ২.০	১.০ থেকে ৪.০	৫০০ থেকে ৭০০	-
ভুট্টা	পুনর্নবা, লাটামারি, কোনই, ইকাইনোক্লোয়া জ্যাস্থিয়াম, ব্রাকিয়ারিয়া সিগন্যাল ঘাস, কেওয়াই, জংলী নাটে, দুবরঙ, পলিগোনাম জাত	০.৫ থেকে ১.০	১.০ থেকে ২.০	৫০০ থেকে ৭০০	-

পুনঃ-প্রবেশের সময়কাল: ২৪ ঘণ্টা পরে.

ব্যবহারের নির্দেশ: গাছ সুরক্ষাকারী সরঞ্জাম: ন্যাপ্সাক স্প্রেয়ার, কম্প্রেশন ন্যাপসাক স্প্রেয়ার, কম্প্রেশন ন্যাপসাক ব্যাটারী স্প্রেয়ার - ফ্লাট্ ফান বা ফ্লাট্ জেট্ নজল্ যুক্ত।

আবহাওয়া পরিস্থিতি (সাধারণত): বৃষ্টির দিনগুলিতে, প্রবল হাওয়ায় এবং উষ্ণ রোদজ্জ্বলন্ত দিনে স্প্রে করবেন না।

মাটি এবং জল (যথাযোগ্য প্রয়োগযোগ্য): এই আগাছানাশক পাতার উপর প্রয়োগ করার জন্য এবং কোনও বিপরীত প্রভাব পাওয়া যায়নি সুপারিশ করা মাত্রা ব্যবহার করা হয়। জলজ চাষের নিকটে ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

প্রয়োগের সময়: সকাল এবং বিকালের সময় এটি প্রয়োগের জন্য আদর্শ, তাই এই সময়টিতে প্রয়োগ করা উচিৎ।

প্রয়োগের সংখ্যা: একবার প্রয়োগ

ফসলের অবস্থা যখন কীটনাশকটি কোনও ফসলের উপর প্রয়োগ করা উচিৎ নয়: বপন রোপণের তিন দিন পরে (আগাছা নির্গমন পরবর্তী)।

সতর্কতা: যেখানে মাটির নীচের জলের স্তর উচ্চ, সেইসব এলাকাতে হাত এটি সবধানে ব্যবহার করতে হবে।

প্রয়োগের সময়:

ঢুট্টা: রোপণের ঠিক পরেই (গাজানোর আগে)।

আখ: আগাছাকুল মাটির ওপর (গাজানোর আগে)।

সতর্কতা: ১) বাদামবর্ষ, খালি পাত্রগুলি এবং পশুখাদ্য থেকে দূরে রাখুন। ২) মুখ, চোখ ও ত্বকের সংস্পর্শ এড়ান। ৩) স্প্রে করার কাজে হাতের মোজা এড়ান। বাতাসের অনুকূলে স্প্রে করুন। ৪) স্প্রে করার পর দৃষ্টিহ্রাস পোশাক ও হেলমেট ভালোভাবে ধুয়ে নিন। ৫) স্প্রে করার সময় ধূমপান, পানীয় পান, খাওয়া ও চোবানো নিষেধ। ৬) শোনান এবং স্প্রে করার সময় সম্পূর্ণ সুরক্ষামূলক পোশাক পরুন।

বন্ধুকীট যেমন মৌমাছি এবং কীটের প্রাকৃতিক শত্রুর ক্ষতি থেকে বিরত থাকতে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ: মাথাব্যথা, বিমুনিভাব, মাথাঘোরা, গরমি, বমি করা, ঝাপসা দৃষ্টি, পেটব্যথা, পেশি দুর্বলতা, ঘুম, অত্যাধিক লালাক্ষরা এবং চোখ দিয়ে জল পড়া পরিলক্ষিত হতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা: ১. গিলে ফেলে উপচয়ের আঙুল ঢুকিয়ে বমি করান। বমির তেল স্বচ্ছ না হওয়া পর্যন্ত বারবার করুন। রোগী অচৈতন্য থাকলে বমি করাবেন না। ২) পোশাক ও ত্বক সাফ্রাঁচিত হ'লে, পোশাক বদলে নিন এবং সাবান ও প্রচুর জল দিয়ে দূষিত ত্বক ধুয়ে দিন। ৩) চোখ দূষিত হ'লে প্রচুর সাদাজিনপরিষ্কার জল দিয়ে প্রায় ১৫ থেকে ১৫ মিনিট ধাপ্টা দিন। ৪) স্প্রেয়ে গোলে রোগীকে মুখব্যবৃত্তে সরিয়ে নিন।

বিষাক্ততা: ক্রোনে সুপারিশ মাত্রা ব্যবহারের ক্ষেত্রে উৎপন্নটি বিষাক্ত।

প্রতিষেধক: সুনির্দিষ্ট কোনও প্রতিষেধক জানা নেই, লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করানো।

খালি পাত্রের নিপ্তিকরণ: ১.খালি পাত্র ভেঙ্গে, জমকাটী থেকে দূরে গুঁতে ফেলতে হবে। ব্যবহৃত পাত্রের পুনর্ব্যবহার রোধ করতে তা ধ্বংস্ত ফেলে রাখবেন না। পাত্র বা উদ্বৃত্ত পদার্থ এবং দ্রেন্সে ফেলা বন্ধ করা তলানি এবং নিরাপদ উপায়ে নিপ্তি করতে হবে যাতে পরিবেশের এবং জলের দূষণ প্রতিরোধ হয়।

মন্তব্যসমূহ: ১) পদার্থ সম্বন্ধিত প্রাচীর বিশেষতঃ যানবস্তু মন্তব্যের জন্যে ব্যবহৃত ঘর বা স্থান থেকে দূরে পশুক ঘর বা স্থানে মন্তব্য করতে হবে অথবা পদার্থের পরিমাণ ও প্রকৃতিতে ওপর নির্ভর করে পশুক আমমাটিতে তলা বন্ধ করে রাখতে হবে। ২. পদার্থ মন্তব্য করার জন্যে ব্যবহৃত ঘর বা স্থানটি ইঁটের হবে, সুনির্মিত, শুকনো, ঠাণ্ডা, বাতাটিত এবং বাম্পশত্রুর দ্বারা হওয়া সুনির্মিত, শুকনো, ঠাণ্ডা, বাতাটিত এবং বাম্পশত্রুর দ্বারা হওয়া সাদ্রমন এড়াতে পর্যাপ্ত পরিসরযুক্ত।

রাসায়নিক সমিশ্রণ :

অ্যাট্রাজিন টেকনিকাল	
৮০% ওজন/ওজন সংযত্ত ভিত্তিতে	৬২.৫০০ ওজন/ওজন
আনিমিক সিক্তকারী এবং	
ছড়িয়ে পড়ার পদার্থ (ডিমেক্স, এনএন৩)	৩.০০০ ওজন/ওজন
আনিমিক নিলম্বিতকারী	
পদার্থ (ডেলেনার-জি)	৫.৫০০ ওজন/ওজন
আলকইল বেনজেনস	
নন-আয়োনিক ইথাইলিন অক্সাইড	
একত্রিকরণ (আরডি-৫১৬)	৫.০০০ ওজন/ওজন
নিষ্ক্রিয় সংবাহক (চিনেমাটি)	২৪.৫০০ ওজন/ওজন
মোট	১০০.০০০ ওজন/ওজন

সতর্কতা: ১. লেবেল এবং লিফলেটে উল্লিখিত ফসল এবং কীট ব্যতীত অন্যান্য ফসল এবং কীটের উপর ব্যবহার করা যাবে না। ২. ফসল কাটার পর ব্যবহার করা যাবে না। ৩. লিফলেটের নির্দেশ অনযায়ী খালি পাত্র নিষ্পত্তি করান। ৪.খালি পাত্রের পুনর্ব্যবহার বিপজ্জনক।

এচেট্রাছ
অট্রাজাইন ৫০% ডব্লিউপি
(অপতৃণনাশক)

ই.ই'ন এবিব মপ্রকৃনাশক য'ত আছে সক্রিয় উপাদানরূপে 50% ডব্লিউপি ও/ও অট্রাজিন আর বাকীবিনি এডজুভেন্টস্।

অনুমোদন

শস্য	ঘাঁহ-বনব উদ্ভিদিক নাম	মাত্রা/হেক্টর সংস্থা (কেজি)	মাত্রা/হেক্টর কার্যকরণ (কেজি)	মিহলাবব বাবে পানী (লিটার)	শেষ স্প্রেব পরা চাপোরাইকে বরলগীয়া সময় (দিন)
কুঁইয়াব	পর্তুলাকা অ'লেরেচিয়া, ডিজিটেরিয়া প্রজাতি বোবহাভিয়া ডিফুসা, ইউফর্বিয়া প্রজাতি, ট্রাইবুলাচ টেরেস্ট্রিচ	0.50-2.0	1.0-4.0	500-700	-
চোল্লু, ৱাচ্ছ		0.50-1.0	1.0-2.0	500-700	-
গোমাকাব	ট্রাযেস্টিমা এম'ন'জাইনা, ডাইজেবা অর্নেনচিচ, একিনা'ক্লা'রা প্রজাতি, এলিউচিন প্রজাতি, জেন্থিয়াম ষ্ট্রুমেরিয়াম, ব্রেচিয়েরিয়া প্রজাতি, অমবেল্লাচ ডিবিচচ, ক্লেব'ম ডিচক'চা, ডিজিটেরিয়া প্রজাতি, পলিগনাম প্রজাতি পলিগনাম	0.5-1.0	1.0-2.0	500-700	-

পুনঃপ্রবেশের কালাব: 24 ঘনাকিঙ্ক্যুরিনি শেষেও.

উপযোগ নির্দেশগুলি : শস্যসংগ্রহকরণ উপকরণ: সাপ্সিসার্ক সরিপ্রযোগ, ফ্যাট্ট্ সরিপ্রযোগ, ক্ষ্যাপ্রসাগ্রী সাপ্সিসার্ক সরিপ্রযোগ, ক্ষ্যাপ্রসাগ্রী সাপ্সিসার্ক ব্যাটারি সরিপ্রযোগ অল্লোক্সীর আপ্সি-এফ্লুইডিএ সরিপ্রযোগ উপযোগীকৃত.

কারবাবযোগ্য সাহচাব্যগুলি (পোত্তবব): ধ্যবপ্যং কাত্র্যং উপ্লুপ্লোপ্যং নল্ল ঢ্যত্রং বেযিথিয়ং উপ্লুপ্লোপ্যং; তল্লী নংশ্লত্বযুত্ব.

মন্ত্রাযুং বেপ্লুব্যং (ব্যাযঙ্কমত্ত স্থালঙ্গুলিগুলি): ছ্যু কাল্লুগ্রাগ্রীনী বিপ্লুকল্লিগুলি তল্লিক্ষ্যংযোগ্রী উপ্লুপ্লোপ্যং উপ্লুপ্লোপ্যং ঠ্যাগ্রীনী কল্লুগ্রাগ্রীনী বিপ্লুকল্লিগুলি উপ্লুপ্লোপ্যং উপ্লুপ্লোপ্যং উপ্লুপ্লোপ্যং