ਅਜਿਆਨੋ
ਕਲੋਰੀਮਿਊਰੋਨ ਏਥਾਈਲ ੨੫% ਡਬਲਯੂਪੀ
(ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ)

ਕਲੋਰੀਮਿਊਰੋਨ ਏਥਾਈਲ ਇਕ ਅਗੇਤਾ ਉੱਗਰਣੋਂ-ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਸਲਫੋਨਾਈਲ ਯੂਰੀਆ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਕਲੋਰੀਮਿਊਰੋਨ ਏਥਾਈਲ ਸੰਇਆਥੀਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਰਵ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੌਨਾਮਕਰਾ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ :

ਫ਼ਸਲ	ਨਦੀਨ ਦਾ ਆਮ ਨਾਂ	ਮਾਤਰਾ/ਹੈ. ਕਿ.ਤ. (ਗ੍ਰਾ.)	ਫ਼ਾਰਮੂ. (ਗ੍ਰਾ.)	ਘੋਲ ਦਾ ਪਾਣੀ (ਲੀ.)	ਆਖ਼ਰੀ ਸਪ੍ਰੇ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਤਕ ਉਡੀਕ (ਦਿਨ)
ਝੋਨਾ (ਸਿੱਧਾ ਬੀਜਿਆ)	ਸਵਾਂਕ ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬੂਟੀ ਕਾਣੂ ਮੱਕੀ, ਬਾਥੂ, ਛੀਲਾ ਮੋਥਾ	੬	੨੪	੫੦੦-੬੦੦	੬੦
ਸੰਇਆਥੀਨ	ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਰੋਟੌਨਡਾਸ, ਕਮੇਲਿਨਾ ਬੇਂਗਾਲੇਂਸਿਸ, ਸੇਜਲਿਸ਼ਾ ਆਰਗੋਨੇਂਟਿਸ, ਸਿਲੋਸਿਆ ਅਰਸੰਟੀਆ, ਡਾਇਸਿਤਿਆ ਆਰਵੇਂਸਿਸ, ਕੋਰੋਨਿਸ ਟ੍ਰਾਇਲੋਰਸ, ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਇਰਿਆ, ਪਰਾਧਨੇਇਥ, ਹਾਈਲੋਰਥਸ ਹਿਸਟਰੋਵਰਸ, ਐਕਰਲੀਫ਼ਾ ਇੰਡਿਕਾ ਫ਼ਾਈਲੈਂਥਸ ਨਿਰੂਰੀ, ਟ੍ਰਾਈਡੈਕਸ ਪਰਾਕੁੰਬੇਂਸ, ਵਰਮੁਲਿਆ ਏਥਮਾਈਰਿਸ	੯	੨੪	੫੦੦-੬੦੦	੬੦
	ਸਵਾਂਕ ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬੂਟੀ ਕਾਣੂ ਮੱਕੀ, ਬਾਥੂ, ਛੀਲਾ ਮੋਥਾ	੯	੩੬	੩੦੦	੪੫
	ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਰੋਟੌਨਡਾਸ, ਕਮੇਲਿਨਾ ਬੇਂਗਾਲੇਂਸਿਸ, ਸੇਜਲਿਸ਼ਾ ਆਰਗੋਨੇਂਟਿਸ, ਸਿਲੋਸਿਆ ਅਰਸੰਟੀਆ, ਡਾਇਸਿਤਿਆ ਆਰਵੇਂਸਿਸ, ਕੋਰੋਨਿਸ ਟ੍ਰਾਇਲੋਰਸ, ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਇਰਿਆ, ਪਰਾਧਨੇਇਥ, ਹਾਈਲੋਰਥਸ ਹਿਸਟਰੋਵਰਸ, ਐਕਰਲੀਫ਼ਾ ਇੰਡਿਕਾ ਫ਼ਾਈਲੈਂਥਸ ਨਿਰੂਰੀ, ਟ੍ਰਾਈਡੈਕਸ ਪਰਾਕੁੰਬੇਂਸ, ਵਰਮੁਲਿਆ ਏਥਮਾਈਰਿਸ	੯	੩੬	੩੦੦	੪੫

ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਵਸਾ: ੨੪ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ।

ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ : ਸੰਇਆਥੀਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ, ਕਲੋਰੀਮਿਊਰੋਨ ਏਥਾਈਲ ੨੫% ਡਬਲਯੂਪੀ ਦੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼-ਆਧਾਰਿਕ ਸਰਫ਼ੈਕਟੰਟ (ਆਈਸੀ-ਐਕਟਾਈਲ - ਫ਼ੀਨੋਕਸੀਲ ਪੋਲੀ ਔਕਸੀਥਾਨੋਲ ੧੨.੫%) @ ੦.੨% ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਆਯੋਨਿਕ ਸਰਫ਼ੈਕਟੰਟ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮੰਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ (ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ): ਚੰਦਲਵਾਈ ਦੇ ਦਿਨ, ਜਦ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਸਾਧਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਪ੍ਰੇ ਕਰੋ। ਜਦ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਪ੍ਰੇ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਪ੍ਰੇ ਦੀ ਫ਼ੁਹਾਰ ਟੀਚਾ-ਰਹਿਤ ਹਲਕੇ ਤਕ ਨਾ ਖਿਸਕ ਸਕੇ।

ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ: ਪੰਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ: ਫ਼ੀਟ ਫ਼ੈਨ/ਫ਼ਲੰਜ ਜੈਟ ਨੋਜ਼ਲ ਲਗਾ ਕੇ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਵਰਤੋ।

ਸਪ੍ਰੇ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ: ੧. ਡਿਫ਼ਰਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰਨ ਬਾਅਦ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਅਤੇ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ੧੧% ਘੋਲ ਵਾਲੇ ਅੰਮੋਨੀਏ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਕੇ ੧੫ ਮਿੰਟਾਂ ਤਕ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਧੋਵੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਗਾਲੋ। ੨. ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਡ੍ਰਿਫ਼ਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਪੌਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾ ਪਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਲ-ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਤਕ ਹੀ ਰਹੇ।

ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ: ੫੦੦-੬੦੦ ਲੀ. ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾਅ ਘੋਲ ਵਜੋਂ।

ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸੇਇਆਥੀਨ: ੩-੭ ਡੀਏਐਸ (ਇੰਕ ਵਰਤ)।

ਮਾਵਧਾਨੀਆਂ: ੧) ਭੋਜਨ, ਭੋਜਨ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ੨) ਮੂੰਹ, ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਸਪ੍ਰੇ ਛੁਹਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਖਿੱਚੋ। ਸਪ੍ਰੇ ਪਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੁੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੋ। ੪) ਸਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੰਤ ਹੋਏ ਕਪੜੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਗ ਧੋ ਲਓ। ੫) ਸਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਨਾ ਧੂਮਪਾਨ ਕਰੋ। ੬) ਸਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਜ਼ਾਰਕਾਰੀ ਢਸਤਰ ਪਹਿਨੋ।

ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਦੁਦਰਤੀ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ:

ਵਿਗੜੇ ਅਸਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ: ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਵਗਣੇ, ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਤਰਵਾ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਬੇਆਰਾਮੀ ਜਾਂ ਰੌਸ਼ ਸਹਿਤ।

ਫ਼ਸਟ ਏਡ: ੧) ਨਿਗਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠਰੋਰ ਕਰਕੇ ਉਲਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਓ। ਉਲਟੀ ਦਾ ਤਰਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਤਕ ਇਹ ਅਮਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਰੋਗੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਉਕਸਾਓ। ੨) ਜੇ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਪਲੰਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਲੰਤ ਹੋਈ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਬੁਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ੩) ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਾਂ ਸੈਲਾਈਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ੧੦-੧੫ ਮਿੰਟਾਂ ਤਕ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ। ੪) ਦਵਾਈ ਸੁੰਘੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਓ। ੫) ਜੇ ਵਿਗੜੇ ਅਸਰ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫ਼ੌਰਨ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।

ਵਿਗੜੇਲੇਪਣ ਦੇ ਲੱਛਣ : ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਮੜੀ ' ਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਵਾਸ ਪੱਥ ਵਿਚ ਜਲਣ।

ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: ੧) ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਕਿਆਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਬਚ ਗਈ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਧੋਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਸਰੂਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਕਾਣਵਰਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ੨) ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਪੈਕਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤਾਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤੇ। ੩) ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੇ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਦਬਾ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ।

ਸਟੋਰੇਜ: ੧) ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਚੂਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿਚ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖੋ। ੨) ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਹੋਣੇ, ਮੁਸ਼ਕ, ਰੋਸ਼ੀ ਹਵਾਦਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੁਲੂ ਛੁਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂਕਿ ਹਵਾੜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਾ ਫੈਲ ਸਕੇ।

ਰਸਾਇਣਕ ਮਿਸ਼ਰਣ :

ਕਲੋਰੀਮਿਊਰੋਨ ਏਥਾਈਲ ਕਿ.ਤ.	:	੨੫.੦੦ % ਵ/ਵ
ਇਮਲਸੀਫ਼ਾਇਰ : ਸੋਡੀਅਮ ਤਾਰਾਈਲ ਸਲਫ਼ੇਟ	:	੦.੫੦ % ਵ/ਵ
ਡਿਸਪਰਸਿੰਗ ਏਜੰਟ: ਏ ਮਿਕਸ ਅਫ਼ ਨੇਫ਼ਥਲੀਨ ਸੋਡਿਯਮ ਫ਼ੋਰਮਾਲਡਿਹਾਈਡ ਪੋਲਿਮਰ	:	੩.੦੦ % ਡਬਲ/ਡਬਲ
ਸਲਫ਼ੋਨੇਟ ਫ਼ੋਰਮਾਲਡੀਹਾਈਡ ਪੋਲੀਮਰ ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ	:	੩.੦੦ % ਵ/ਵ
ਏਮਿਬਿਟਰੀਰਾ ਏਜੰਟ: ਸੁਰਵੇਸ ਔਕਟੋਸੀਟੇਟ	:	੦.੫੦ % ਵ/ਵ
ਡਿਲੂਏਂਟ: ਸੁਰਵੇਸ	:	੩੪.੦੦ % ਵ/ਵ
ਡਿਲੂਏਂਟ: ਬਾਰਚੇਡ ਕਲੋ (ਕਾਓਲਿਨ)	:	ਕਿਊ. ਐਸ. % ਵ/ਵ
ਕੁੱਲ	:	੧੦੦.੦੦ % ਵ/ਵ

ਚੇਤਾਵਨੀ:੧. ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੁਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ੨. ਫ਼ੁਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮਸਲਬ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੋ। ੩. ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ੪. **ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।**

अजियानो
क्लोरिमुरोन ईथाइल २५% डब्लूपी
(आगाछानाशक)

क्लोरिमुरन ईथाइल आगाछा अङ्कुरनेर पराउ प्रयोग करा हय एमन एकटि आगाछा नाशक या सालफोनिल ईउरिया परिवार अन्तर्गत। क्लोरिमुरन ईथाइल वृहत् पाता आगाछा आर जलज घास जातीय आगाछा ईत्यादि उपर खुवई भाल काज करे विशेष करे सयाबिन आर धानेर फसलेर क्षेत्रे।

सुपारिश

फसल	आगाछार चलति नाम	हेक्टर पिछु मात्रा स.उ: (ग्राम)	फर्मूलेशन (ग्राम)	तरलीकरणेर जल (लिटार)	शेष स्प्रे थेके फसल तोलार मधे अपेक्षाकाल (दिन)
धान (सरासरि बपन)	शामा घास, केशुत, कौशिरा, बाथुआ, मोथा	६	२४	५००-६००	६०
सोयाबिन	साइपेरस रोटौनडास, कमेलिना बेङ्गालेंसिस, सेलसिया आरजेंन्टि, दिगेरा आरजेनेसिस, किउकुमिस ट्रिगनास, साइपेरास ईरिया, परायचिनेथ, हिस्टेरोथरास, आयकालाइया इण्डिका, बिलाह्यास निकरि, ट्रिडेक्सेया गराट्रुलाकास्ट्रीम, कासुलिया अञ्जालारिस	९	३६	३००	४५

पुनः प्रवेश समयकाल: २४ घण्टा परे।

प्रयोग विधि: सयाबिन फसलेर जन्य आयनिक पृष्ठटान ह्रास कारी (आईसो अक्टिल फिनखिल पलक्सिथेन १२.५% : ०.२% तार साथे क्लोरिमिउरन ईथाइल २५% डाब्लिपि प्रयोग करुन। धानेर फसलेर क्षेत्रे आयनिक पृष्ठटान ह्रास कारी प्रयोग करार सुपारिश करा हयना।

आबहाओयार परिस्थिति (साधारानाव): तापमात्रा माझारि हले, वृष्टिर कोनओ सम्भावना ना थाकले, एबं चमेली निन हले स्प्रे करुना। प्रबल वातासे कीटनाशक स्प्रे करबेन ना, कारण स्प्रेर फले रासायनिक फोंटोगुलि अभीष्ट नय। अमन कृषिजमिते येते पारे।

बावहारेर निर्देश: गाछ सुरक्षाकारी सरञ्जाम; ब्लाट्ट फान/ब्लाट्ट जेट् नोजल लगाने न्याएपाक स्प्रेअार।

स्प्रे ट्याङ्क परिष्कार करा: १. प्रयोगेर पश्चात् अविलम्बे १% अ्यामोनिया सह परिष्कार जलेर द्रवण दिये ट्याङ्केर भितर ओ बाईरेर अंश धोयआर द्वारा सकल मेशानो तथा स्प्रे-सरञ्जाम आगाछोग्रा परिष्कार करते हबे। सम्पूर्णरूपे ट्याङ्के जल डरार परे १५ मिनिट धरे नाड़िये-चाड़िये झुते हबे। ताहपरे पुनराय परिष्कार जल दिये धुये नेबेन। २. ट्याङ्क धोयानि तरलानि एमन निरापद उपाय बिनष्ट कराते हबे याते परिवेशे ओ जलेर दूषण प्रतिरोधे हय।

स्प्रे करा सामलानो: चिहिन्त एलाकार बाईरे वा जलसूत्रेर मधोर ठकुआ पाताग्रार माझेर मधो स्प्रे-करार द्वारा क्षति थेके चूड़ान्त यत्न अवश्यई नितें हबेनो

प्रयोगेर मात्रा: २४ घण्टा पराओ।

सतर्कता : १) बाणपार्थ, खालि बाणपात्रा एबं पशुखाद्य थेके दूरे राखुन। २) मुख, चोख ओ त्वकेर सरंक्षर्ण एड़ान। ३) स्प्रे-करार श्वासे याओआ एड़ान। वातासेर अनुकूले स्प्रे करुन। ४) स्प्रे करार पर प्रतिनि पोशाक ओ देहांश भालोभावे धुये निन। ५) स्प्रे करार समय कोनकिछु धूमपान, भानीय पान, खाओआ ओ देखाना निषेध। ६) मेशानो एबं स्प्रे करार समय सम्पूर्ण सुरक्षामूलक पोशाक परुन।

बन्धुकीट (येमन मौमाछि एबं कीटेर प्राकृतिक शत्रुर क्षति थेके विरत थाकते सतर्कता अवलम्बन करते हबे।

विषाक्ततार लक्षण: अक्षमता वा बाधसा पाई, चोख ओ त्वकेर अस्वस्थि तथ्यस अत्याक्षमता वा फुसकुड़ि हओआ।

प्राथमिक चिकित्सा: १. गिले फेलले टाणाग्रार आङुल ढुकिये वमि कराान। वमिर तरल स्वच्छ ना हओआ पर्यन्त बारबारेर कराने। कोनो बेउशेनो थाकले वमि कराबेन ना। २) पोशाक ओ त्वक सरञ्जामिष्ट हं'ले, पोशाक बदले निन एबं साबान ओ प्रचुर जल दिये दूषित त्वक धुये निन। ३) चोख दूषित हं'ले प्रचुर स्यालाइन/परिष्कार जल दिये प्राय १० थेके १५ मिनिट धाप्ति दिन। ४) श्वास गेले रोगीके मुक्तवायुते सरिये निन। ५) विषक्रिया लक्षण देखा गेले अविलम्बे चिकित्सकेर परामर्श निन।

प्रतिषेधक: सुनिर्दिष्ट कोनओ प्रतिषेधक जाना नेई। लक्षण अनुयायी चिकित्सा।

बावहृत पात्रादिर निष्क्रिकरण: १) उत्पादनेर निर्माता, फर्मूलाकारी एबं अपारेटरेदेर दायित्व ये माक्र वा उभ्रेत पथर्थ तथा मेशिन एबं पात्रादि धोयानि तराल एमन निरापद उपाये किछु करा उचित हबे, याते परिवेशे ओ जलेर दूषण प्रतिरोधे हय। २) बावहृत पात्रेर पुनर्ब्यवहार रोध करते हेय यजतद्र फेले राखतेन ना। ३) पात्र ल्याण्ड जनकस्थि थेके दूरे पुँते फेलतुए हबे।

सरक्षण: १. आगाछानाशक पात्रकेश-फेशन वह रा वाड़िते अन्यान्य जिनिष मजुत करा हय सेखान थेके दूरे कोनो आलान घर रा वाड़िते मजुत करुन अथवा आगाछानाशक परिमाण ओ जात अनुयायी कोनो आलान आलमारिते ताला दिये बिहार राखुन। २. आगाछानाशक मजुत करार घर वा वाड़ि थेन सुसामलिकेइ रुकानो, शुष्क वायु चलाचलेर उपयुक्त ओ प्रशस्त परिसरयुक्त हय, याते वाष्पेर द्वारा दूषितकरण एड़ानो याय।

रासायनिक सरंमिश्रण:

क्लोरिमुरन ईथाइल सः उः	२५.००% ওজন/ওজন
अवद्रव : सोडियाम लाउरिल सालफेट	০.৫০% ওজন/ওজন
डिस्पर्सिंग एजेन्ट: ए मिक्सर अफ़ नेफ़थालीन सोडियाम फोरमालिडहाईड पोलिमर सोडियाम सल्ट	৩.০০% ওজন/ওজন
एमिटिटेरिक एजेन्ट: सुक्रोस ऑक्टा सिटेट	০.৫০% ওজন/ওজন
डिलूएन्ट: सुक्रोस	৩৪.০০% ওজন/ওজন
डिलूएन्ट: बार्टेन माटि (केओलिन)	পর্য্যাপ্ত পরিমাণ ও.এস./ওজন
मोट	১০০.০০% ওজন/ওজন

सतर्कता: १. लेबेलेर एबं लिफलेटे उल्लिखित फसल एबं कीटे छाड़ा ब्यतीत अन्यान्य फसलेर एबं कीटेर उपर ब्यबहार करा याबे ना। २. फसल कातार परर ब्यावहार करा याबे ना। ३. लिफलेटेर निर्देश अनयायी खालि पात्र निष्पत्ति करुना। ४. **खालि पात्रेर पुनर्ब्यवहार बिपज्जनक।**

অজিয়ানো
ক্ল'রিমুরন ইথাইল ২৫% ডব্লিউপি
(অপতৃণনাশক)

ক্ল'রিমুরন ইথাইল হ'ল থাঁহ-বন ওলোরাব পিছত আগতীয়াকৈ প্রয়োগযোগ্য অপতৃণনাশক যি চালফ'নিল ইউরিয়া অপতৃণনাশক নামৰ ৰাসায়নিক বৰ্গৰ অন্তৰ্গত পৰে। ক্ল'রিমুরন ইথাইলে চ'য়াবীন আৰু ধানখেতিত দেখা দিয়া বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ থাঁহ-বন ইয়াৰ বিস্তৃত বাছনিক্ষমতা আৰু বহু উপযোগী ক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পাৰে।

অনুমোদন :

শস্য	থাঁহ-বনৰ উদ্ভিদিক নাম	মাত্ৰা/হেক্টৰ স. উ. (গ্ৰাম)	ফৰ্মুলেশান (গ্ৰাম)	মিহলাবৰ বাবে পানী (লিটাৰ)	শেষ স্প্ৰে আৰু চপোৱাৰ মাজত বৰ লগা সময় (দিন)
ৰোপণ কৰা ধান	একিনোক্ল'ৱা ক্ৰাছগালি এক্লিপ্টা প্ৰস্থা কমেলিনা বেণ্থালেনচিচ সেন'পডিয়াম এলবাম চাইপেৰাচ ৰটানডাচ একিনোক্ল'ৱা ক'ল'নাম	৬	২৪	৫০০-৬০০	৬০
সোয়াবিন	সাইপেৰস ৰোটানডাস, কমেলিনা বেঙ্গালেন্সিস, সেলসিয়া আৰজেন্টি, দিগেৰা আৰজেনেসিস, কিউকুমিস ট্ৰিগনাস, সাইপেৰাস ইৰিয়া, পৰাথনিউথ, হিস্টেৰোথৰাস, আয়কালাইয়া ইণ্ডিকা, বিলাহ্যাস নিকৰি, ট্ৰিডেক্সেয়া গৰাট্ৰুলাকাস্ট্ৰীম, কাসুলিয়া অঞ্জালাৰিস	৯	৩৬	৩০০	৪৫

পুনৰ প্ৰবেশৰ সময় : ২৪ ঘন্টাৰ পিছত ।

প্ৰয়োগ পদ্ধতি : চ'য়াবীন শস্যৰ ক্ষেত্ৰত, ক্ল'ৰিমুৰন ইথাইল ২৫% ডব্লিউপি সৈতে একে লগে নন-আয়'নিক চাৰ্ফেক্টেণ্ট (আইচ'-অক্টাইল-ফেন'ক্সিল (এথিলেন-ওক্সৰিডেল- এথেনোকেমিৰি পেণ্টেক্সেমিথেনোল ১২.৫% @ ০.২%) ব্যৱহাৰ কৰিব। ধান খেতিৰ ক্ষেত্ৰত নন-আয়নিক চাৰ্ফেক্টেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰা যুক্ত নহয়।

বতৰৰ অৱস্থা (সাধাৰণতে) : বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নথকা সময়ত, ভাবৰীয়া দিনত যেতিয়া উষ্ণতা মধ্যমীয়া হয় তেতিয়া স্প্ৰে কৰিব লাগে । বতাহ বলি থকাৰ সময়ত কেতিয়াও কীটনাশক নকৰিব যাতে বাসায়নিক পদাৰ্থটো লক্ষ্য নকৰা অঞ্চললৈ ড্ৰিফ্ট্ নহয় ।

ব্যৱহাৰৰ নিৰ্দেশ: প্ৰয়োগ বাবে সঁজুলি: ব্লেট যেন/ব্লাড জেট্ নজল লগাই সোৱা নেপচেক স্প্ৰেয়াৰ।

স্প্ৰে টেংক চ্ছফ কৰাৰ পদ্ধতি : ১) পৰিষ্কাৰ পানী আৰু এমোনিয়া মিহলাই তৈয়াৰ কৰা ১% দ্ৰৱণৰ দ্বাৰা সকলো টেংকাৰ বাহিৰলাকে আৰু ভিতৰকাকে আওধাবি, স্প্ৰে কৰি শেষ হোৱাৰ লগে লগে মিহলাবলৈ যাৰ স্প্ৰে কৰিবলৈ ব্যৱহৃত সকলো সঁজুলি ভালদৰে পৰিষ্কাৰ কৰিব। টেংকটো সম্পূৰ্ণকৈ পূৰ হোৱাকৈ পানী ভৰোৱাৰ পাছত ১৫ মিনিট মান ধৰি জোকাবিব। তাৰপাছত সেই পানী পেলাই পুনৰ পৰিষ্কাৰ পানীৰে আওধাবিব। ২) পৰিবেশ আৰু পানী দূষিত হব নোৱাৰোকৈ টেংক বোৱা-পৰহা কৰা পানী নিষাপনে নষ্ট কৰা উচিত।

ছিটিকনিৰ প্ৰতিবোধ ব্যৱস্থা : লক্ষ্যৰ ঠাইৰ বাহিৰত বা পানীৰ উৎসত ছিটিকনি পৰি যাতে একো ক্ষতি হব নোৱাৰে তাৰবাবে অত্যন্ত সাৱধান হোৱা উচিত।

প্ৰয়োগ পদ্ধতি: হেক্টৰে প্ৰতি ৫০০-৬০০ লিটাৰ পানীত মিহলাই স্প্ৰে কৰি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি।

প্ৰয়োগৰ সময়: ফাবীনু: সিঁচৰ ৩-১০ দিনৰ পাছত (এবাৰ)। ধান: বোৱাৰ ৫-১০ দিনৰ পাছত (এবাৰ)।

সতৰ্কতাসমূহ : ১) ঘাস সাৰুটী, ঘাস সাৰুটী ববা খাদ্য পাত্ৰ আৰু পশুৰ খাদ্য পৃথক ৰাখিব। ২) মুখ, চকু আৰু ছালত লাগিবলৈ নিদিব। ৩) স্প্ৰে কৰিবা উশাহত বাহীলে নিবিব। বতৰৰ সৌতৰ এফে দিশতহে স্প্ৰে কৰিব। ৪) স্প্ৰে কৰাৰ বেলেগ দূষিত হোৱা কাপোৰ-কানি আৰু গাৰ অংশসমূহ ভালদৰে ধুই পেলাব। ৫) স্প্ৰে কৰাৰ সময়ত কোনো ধৰধৰ খোৱা-বোৱা বা ধূমপান নকৰিব। ৬) মিহলোৱাৰ আৰু স্প্ৰে কৰাৰ সময়ত সম্পূৰ্ণ সু

Azziano®

Chlorimuron Ethyl 25% WP

(Herbicide)

Chlorimuron Ethyl is an early post-emergence herbicide belonging to the chemical family of Sulfonyl Urea herbicide. Chlorimuron Ethyl controls broads leaf weeds and sedges with wide a selectively and broad spectrum activily in Soybean and Transplanted Rice crops.

Recommendation :

Crop(s)	Common name of weed	Dosage/HA			Waiting Period between last spray to harvest (in days)
		A.I (gm)	Formul-ations (gm)	Dilution in water (Ltr)	
Rice (Trans-planted)	Echinochloa crusgalli, Eclipta alba, Commelina benghalensis, Chenopodium album, Cyperus rotundus	6	24	500-600	60
Soya-bean	Phyllanthus niruri, Celosia argentia, Cyperus rotundus, Digera arvensis, Cucumis trigonus, Cyperus iria, Parthenium hysterophorus, Acalypha indica, Trianthema portulacastrum, Commelina benghalensis, Caesuila axillaris	9	36	300	45

Re-entry Period : 24 hours.

Direction of Use : For Use Soyabean crop : Use of Iso-octyl Phenoxyl-Polo xethanol 12.5% (Non-ionic surfactant) is approved @ 0.2% with Chlorimuron ethyl 25% WP in soybean crop only, however its use has not approved in rice crop.

Weather Condition(in general): Spray when no rain is expected, on a cloudy day when temperatures are moderate. Never apply pesticide when there is wind to prevent the chemical from drifting to non-target areas.

Plant protection Equipment : Knapsack sprayer fitted with flat fan/flood jet nozzle.

Spray tank clean out : 1. Thoroughly clean all mixing and spray equipment immediately following application by rinsing outside, inside of all the tank with clean water and ammonia to give 1% solution. Agetate for 15 minutes after adding water to fill tank completely. Again rins with clean water. 2. Tank rinsate should be dispose off in a safe manner to prevent environment and water contamination.

Drift management : Extreme care should be taken to avoid damage by drift into broad leaves plants out side the target area or onto water sources.

Mode of application : As spray suspension in 500-600 lit water per hectare.

Time of Application : Soyabean : 3-10 Days after sowing, (once).

Rice: 5-10 Days after transplanting, (once).

Precaution: 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with eyes, mouth and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and part of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Precautions to be taken to avoid harm to the beneficial insects like honey bees and natural enemies of pests.

Symptoms of Poisoning : Tearing or blurring of vision, eye and skin irritation with discomfort or rash.

First Aid : 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient unconscious. 2. If clothing and skin is contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. 5. Incase any sign of poisoning ,immediately consult the doctor.

Antidote : No specific antidote. Treat symptomatically.

Disposal of used container : 1. It shall be the duty of manufactures, formulators of herbicides and operators to dispose packages or surplus materials and washing from the machine and container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2. The used package shall not be left outside to prevent re-use. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions : 1. The package containing the herbicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for stored other articles shall be kept in separate almirahs under lock and key depending on the quantity and nature of herbicide. 2. The rooms or premises meant for storing the herbicide shall be well built, dry and well lit, ventilated and sufficient dimensions to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition :

Chlorimuron Ethyl a.i.	25.00% w/w
Emulsifier : Sodium Lauryl Sulfate	0.50% w/w
Dispersing Agent : A mixture of Napthlene sulfonate formaldehyde polymer sodium salt	3.00% w/w
Ambittering Agent : Sucrose octacetate	0.50% w/w
Diluent : Sucrose	34.00% w/w
Diluent : Barden Clay (Kaolin)	QS % w/w
Total	100.000%w/w

Warnings: 1. Not to be used on crops and pests other than mentioned on label/leaflet. 2. Not to be used for post harvest application. 3. Destroy Container after use as directed on leaflet. 4. **Dangerous to re-use empty containers.**

अजियानो

क्लोरिम्युरोन ईथाइल २५ प्रतिशत घुलनशील चूर्ण

(खरपतवारनाशक)

क्लोरिम्युरोन ईथाइल धान उगने के तुरन्त बाद नाश करने वाला खरपतवार नाशक है जो कि सल्फोनाईल यूरिया खरपतवार नाशी के कैमिकल परिवारका रसायन है। क्लोरिम्युरोन ईथाइल सोयाबीन और रोपित धान की फसलों में उगने वाले चौडे पत्तो के खरपतवारों और अन्य खरपतवारों की रोकथाम करता है साथ ही, इसमें विविध – विशाल तथा बहुआयामी तरीके से चुनिंदा असर की विशिष्ट क्षमता भी है।

उपयोग :

फसल	खरपतवारों के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा			अन्तिम छिडकाव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों में)
		स.तत्व (ग्रा.)	संरचना (ग्रा.)	पानी की मात्रा (ली.)	
रोपित धान	कनकौआ, मौथा, स्वांक सफेद बूटी, चीला, छोटा स्वांक	६	२४	५००–६००	६०
सोयाबीन	हजार दाना,मौथा, छतरी वाला मौथा, कनकौआ, मयूर, शिख ,लहसुनिया, इंद्रायन,अपरागी, खोकली,पत्थरचटा, सिसुलिया	९	३६	३००	४५

पुन: प्रवेश अवधि: २४ घंटे।

उपयोग के लिए निर्देश : नोन आयोनिक सर्फेक्टेन्ट: आइसो–ओक्टाइल फिनाक्सिल–पोलोप्रिधानोल १२.५ प्रतिशत सर्फेक्टेन्ट की संस्तुति ०.२ प्रतिशत की दर से उपरोक्त खरपतवार नाशक के साथ केवल सोयाबिन की फसल में की जाती है। यह नोन–आयोनिक सर्फेक्टेन्ट धान की फसल के लिए के लिए संस्तुत नहीं है।

मौसम की स्थिती: (सामान्य रूप से): जब बारिश की उमीद न हो,बादल वाले दिन जब तापमान मध्यम हो, तब छिडकाव करें। कीटनाशक को गैर–लक्षित क्षेत्रों में जाने से रोकने के लिए हवा चलने पर कभी कीटनाशक का छिडकाव न करें।

छिडकाव यंत्र: नैपसेक स्प्रेयर जिसमे फ्लैट फेन या फ्लड जेट नोजल लगा हो।

छिडकाव टैंक की सफाई : १. छिडकाव के उपरान्त सभी छिडकाव यंत्र व घोलने के टैंक को अंदर व बाहर से पानी से तुरंत साफ करें एंव धोवन को निकाल दें। दुबारा साफ पानी भर कर अमोनिया का १% विलयन बनायें तथा १५ मिनट तक खंगालें। फिर से पानी में धोयें। २. सारी धोवन को एकत्र कर सावधानी से निपटान करें जिससे पर्यावरण व जल का प्रदूषण न हो।

क्रिया विधि: यह ए.एल.एस. को प्रतिरोधित करता है।

क्रिया नियंत्रण : ड्रिफ्ट के द्वारा चौडे पत्ते वाले पौधे जो छिड़काव क्षेत्र के पास हो उन्हे बचाने के लिए समुचित सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही पानी के स्त्रोत का भी ध्यान रखना है।

प्रयोग विधि: छिडकाव ५००–६०० ली. पानी में प्रति हैक्टेयर।

प्रयोग का समय : सोयाबीन : बुवाई के ३–१० दिन बाद, (एक बार)।

धान : रोपण के ५–१० दिन के बाद, (एक बार)।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तनों और पशुओं के चारे से दूर रखे। २. मुंह आँखों, त्वचा को सम्पर्क से बचाये। ३. छिडकाव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचाये। हवा की दिशा में छिडकाव करें। ४. छिडकाव के बाद दूषित कपड़ो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। ५. छिडकाव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नही चाहिए। ६. छिडकाव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहने।

शहद की मक्खियों और कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं जैसे लाभकारी कीडों से नुकसान से बचाने के लिए बरती जाने वाली सावधानियां।

विष के लक्षण : आंसू,आना व धुंधला दिखना, आँखों और त्वचा पर खुजली व परेशानी हो सकती है।

प्राथमिक चिकित्सा : १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उलटी करवाए यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उलटी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपडों को उतार दे दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आँखे दूषित हो जाए तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी में लगभग १०–१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जाये। ५. विषाक्तता का कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

विष नाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नही हैं। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. खरपतवार नाशक निर्माताओं या उपयोग करतां का कर्तव्य है कि डिब्बों या पात्रों को तोडफोडकर आबादी से दूर जमीन में गाड देना चाहिए। २. प्रयोग किये गये डिब्बों को दुबारा प्रयोग के लिये बाहर खुला न छोडें। ३. डिब्बों या बची हुई खरपतवार नाशक या धोवन का निपटारा इस प्रकार करें कि जिससे आसपास की चीजें, पीने का पानी विषैला न हो।

संग्रहण की शर्तें : १. खरपतवार नाशक के डिब्बों को अलग–अलग ऐसे कमरों या आलमारियों से जिनमें अन्य वस्तुएं विशेषकर खाद्य पदार्थ या पशु आहार संग्रहित किए जाते है से दूर अन्य कमरों से दूर अलग–अलग कमरों या आलमारियों में ताला बाँधे में बंद रखे। २. जिस कमरे अथवा आलमारियों में खरपतवार नाशक का भण्डारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, ठंडा, प्रकाश युक्त, हवादार व पर्याप्त लम्बा चौडा होना चाहिए जिससे कि खरपतवार नाशक के भाप से वातावरण प्रदुषण होने का डर न हो।

रासायनिक संरचना :

क्लोरिम्यूरोन ईथाइल स.त.	२५.००% भार/भार
इमल्सीफायर : सोडियम लोराइल सल्फेट	०.५०% भार/भार
डिस्पर्सिंग एजेंट : नेफथलीन सल्फोनेट फोर्माल्डिहाइड पोलिमर सोडियम साल्ट	३.००% भार/भार
एम्बीटरिंग एजेंट : सुक्रोस ऑक्टाएसिटेट	०.५०% भार/भार
डालूयेंट : सुक्रोस	३४.००% भार/भार
डालूयेंट : बार्डन क्ले (काओलिन)	पर्याप्त मात्रा% भार/भार
योग	१००.००% भार/भार

चेतावनी : १. लेबल / लीफलेट में दी गई फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इसका उपयोग करना मना है। २. फसल काटने के बाद इसका उपयोग न करें। ३. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार उपयोग के बाद कंटेनर को नष्ट कर दें। ४. **खाली डिब्बों को दुबारा उपयोग करना खतरनाक है।**

अजियानो

क्लोरिम्यूरॉन ईथाइल २५% डब्ल्यूपी

(तणनाशक)

क्लोरिम्युरॉन ईथाइल हे तण उगवल्यानंतर लगेच वापरात येणारे तणनाशक असून ते सल्फोनिल युरिया या गटात मोडते. क्लोरिम्युरॉन ईथाइल सोयाबीन आणि भात पिकात उगवणाऱ्या बऱ्याच प्रकारची रुंद पानांची तणे आणि सेजस यांचे नियंत्रण करते.

शिफारस :

पीक	तणाचे सामान्य नाव	प्रमाण/हेक्टर.			शेवटची फवारणी ते कापणी मधील वाट पाहण्याचा कालावधी (दिवसात)
		स.त. (ग्रॅ.)	द्रावण (ग्रॅ.)	सौम्य करण्यासाठी पाणी (लि.)	
भात (लावणी केलेले भात)	इक्लिप्टा अल्बा कोमलिना बेंगालेन्सिस चिनपोडीयम अल्बम सायप्रस रोटेन्डस इचिनोक्लोवा क्रुसगली	६	२४	५००–६००	४५
सोयाबीन	सायप्रस रोटुन्डस (लव्हाळा) कॉमिलिना बेंगालेंसीस, सेलोसिया अर्जेंटिआ, डायवेरा अर्वेन्सिस, कुकुमिस ट्रिगोनस, सायप्रस इरिया, पार्थेनअम हिस्ट्रोफोरस (गाजर गवत), अकेलिफा इंडीका फायर्लन्थस निरुरी, ट्राथान्थमा पोर्चुलॅकेस्ट्रम, कॅसुलिया ॲक्सिलीरिस	९	३६	३००	४५

पुन: प्रवेश कालावधी: २४ तासांनंतर

वापर करण्याची पद्धत: सोयाबीनच्या पिकाकरिता ०.२% क्लोरिम्युरॉन इथाइल सोबत नॉन आयोनिक सरफॅक्टन्ट (आयसो–ऑक्टाइल फोनोक्साईल पोलोइन्थोलन १२.५%) वापरा. नॉन आयोनिक सरफेक्टन्ट भात पिकाकरिता वापरू नयें.

हवामानाची स्थिती (सर्वसाधारणपणे): पाऊस अपेक्षित नसताना, तापमान मध्यम असताना ढगाळ दिवशी फवारणी करा. वारा असताना रसायनाला लक्ष्य नसलेल्या भागात वाहून जाण्यापासून रोखण्यासाठी कधीही कीटनाशकाची फवारणी करू नये.

वापरासाठी निर्देश: रोपसुरक्षा उपकरणे: फ्लॅट फॅन/फ्लड जेट नोजल बसविलेले नॅपसॅक स्प्रेयर.

फवारणी टाकीची साफ-सफाई: १) फवारणी झाल्यावर सर्व फवारणी यंत्र व द्रावण बनविण्याची टाकी आतून व बाहेरुन पाण्याने त्वरित साफ करावी व धुव्याचे पाणी काढून टाकावे. पुन्हा स्वच्छ पाणी घेवून अमोनिया १% सोल्यूशन बनवावे, तसेच १५ मिनिटे ढवावे. पुन्हा पाण्याने धुवावे. २) सर्व धुवाचाचे पाणी एका करून सावधानतापूर्वक नष्ट करावे जेणे करून पर्यावरण व पाणी दुषित होणार नाही.

क्रियाविधि: ड्रिफ्टमुळे रुंद, रोपे पानांची रोप जी फवारणी क्षेत्राच्यासवळ असतील त्यांना वाचविण्यासाठी योग्य ती सावधिगिरी घेतली पाहिजे. त्यासह पाण्याचा स्त्रोतही लक्षात असू द्यावा.

फवारणीची पद्धत: फवारणी ५००–६०० ली. पाण्यात प्रति हेक्टर.

फवारणीचा वेळ : सोयाबीन: पेरणीनंतर ३–१० दिवसांनी (एकदाच)

भात: पेरणीनंतर ५–१० दिवसांनी (एकदाच)

खबरदारी: १) अन्नपदार्थ, अन्नपदार्थाचे रिकामी डबे आणि जनावरांच्या चाऱ्यापासून दूर ठेवा. २) तोंड, डोळे आणि त्वचेशी संपर्क होवू देवू नका. ३) फवारणीचे तुषार श्वासाद्वारे आत घेवू नका. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा. ४) फवारणी नंतर दूषित झालेले कपडे आणि शरीराचा भाग स्वच्छ धुवा. ५) फवारणी करताना धुम्रपान, खाणे–पीवू वा चघळू नये. ६) फवारणी द्रावण बनविताना संपूर्ण संरक्षित कपडे वापरावेत.

फायदेशीर कीटक जसे की मधमाश्या आणि कीटकांचे नैसर्गिक शत्रू यांचे नुकसान टाळण्यासाठी घ्यावयाची खबरदारी.

विषबाधेची लक्षणं: अश्रू येणे व धुसर दिसणे, डोळे आणि त्वचेस जळजळ वा त्रास होवू शकतो.

प्रथमोपचार: १) जर गिळले गेले असेल तर, घशात बोट घालून उलटी करवावी हीच क्रिया पुन: पुन: करीत रहावी जो पर्यंत उल्टी साफ होत नाही. जर रूग्ण बेशुद्ध असेल तर उल्टी करवू नये. २) जर कपडे व त्वचा दूषित झाल्यास दूषित कपडे काढा व त्वचा भरपूर साबण व पाण्याने धुवा. ३) जर डोळ्यात गेले तर भरपूर प्रमाणात सलाइन/स्वच्छ पाण्याने जळळ–जवळ १०–१५ मिनीटे धुवा. ४) जर श्वासद्वारे आत गेले तर रूग्णास मोकळ्या हवेत आणा. ५) विषबाधाची कोणतीही चिन्हे आढळल्यास,ताबडतोब डॉक्टरचा सल्ला घ्या.

औषधोपचार: कोणताही खास उपचार ज्ञात नाही. लक्षणानुसार उपचार करा.

वापरलेल्या डब्याची विल्हेवाट: १) निर्माता, उत्पादन बनविणाऱ्याचे आणि हाताळणाऱ्यांचे कर्तव्य आहे की पॅकिंग किंवा उरलेले द्रावण किंवा फवारणी धुतलेले पाणी यांची विल्हेवाट पर्यावरण किंवा पाणी प्रदुषित होणार नही अशा सुरक्षित पद्धतीने लावावी. २) पुन्हा कामासाठी वापरली जाऊ नयेत म्हणून रिकामी पॅकिंगस उघडावार टाकू नयेत. ३) रिकामी पॅकिंगस मोडून–तोडून वस्तीपासून दूर जागी जमिनीत खोल पुरावीत.

साठवण : १. तणनाशक हे डब्बे वेगळ्या जागी किंवा खोलीत आणि अन्न पदार्थापासून दूर वा तणनाशक वेगळ्या कपाटात कडीकुलपात ठेवावे. २. तणनाशक ठेवण्याची खोली सुकी, मजबूत, प्रकाशमय तथा पुरेस्या आकारमानाची पाहिजे सदर जागेतील हवा खेळती असली पाहिजे जेणेकरुन तणनाशकाच्या वाफेने वातावरण दूषित होणार नाही.

रासायनिक संरचना :

क्लोरिम्यूरॉन इथेल स.त.	२५.००% व/व
इमल्सीफायर : सोडियम लॉरिल सल्फेट	०.५०% व/व
डिस्पर्सिंग एजेंट : नेफथलीन सल्फोनेट फोर्माल्डिहाइड पोलीमर सोडियम साल्ट	३.००% व/व
एम्बीटरिंग एजेंट : सुक्रोज-ऑक्टाएसिटेट	०.५०% व/व
डायलेंट : सुक्रोज	३४.००% व/व
डायलेंट : बार्डन क्ले (कोओलिन)	आवश्यकतानुसार % व/व
कुल	१००.००% व/व

चेतावणी: १. लेबल और पत्रक पर जो वर्णित है, उससे भिन्न फसल और नाशकजीव पर उपयोग के लिए नहीं। २. कटाई के बाद के उपयोग के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए ३. पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात आदयान को नष्ट करें। ४. **रिकामी डबे पुन्हा वापरणे धोकादायक.**

ಅಜಿಯಾನೊ

ಕ್ಲೋರಿಮ್ಯೂರಾನ್ ಈಥೈಲ್ ೭೫% ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಪಿ.

(ಗೃಣನಾಶಕ)

ಕ್ಲೋರಿಮ್ಯೂರಿನ ಈಥಾಇಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಲ್ಫೋನಿಲ್ ಯೂರಿಯಾ ಕುಟುಂಬದ ಕಳೆನಾಶಕಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಕ್ಲೋರಿಮ್ಯೂರಾನ್ ಇಥೈಲ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮತ್ತು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೇಕು ಜಾತಿ ಕಳೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತೃತ ಅಯ್ಯವು ಗುಣದೊಂದಿಗೆ ವಿಶಾಲ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಿಫಾರಸು :

ಸಂಬಂಧ	ಕಳುವು ಮಿಶ್ರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಬಿಡಿದ ನೀರು	ಹೆক্টರಿಗು ಸಿಗಾದು		ಸಸಿ ನೆಟ್ಟ ನಂತರ ಕೊಯ್ಲುಮಾಡುವ ಸಮಯದ ನಡುವಿನ ಅಂತರ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
		ಸಾ. ಸಿ. (ಗ್ರಾಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)	ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಗ್ರಾಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಿಲೋಲೀಟರು (ಲೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)	
ಭತ್ತ (ನೇರ ಸಿಡಿದ ಭತ್ತ)	ಪೂರ್ ಗಂಬುಸಮಾನಾ ಬಿಡಿದ ನೀರು	6	24	500-600	60
ಸೋಯಾ ಬೀನ್	ಎಕಿರಾಂಕೊಣ ಕೆಕ್ಕುಸಂಕಲಿ ಈಕಿಲಿಟ್ಟ ಆಕ್ಸಿಪಾ ಪರಿಯಿಲಿಯ ಬೆಣ್ಣಾಗಿಲಂಕೆಶಿಲಿ ಸೆಬೆಂಗಿಯೆಂಬಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಯಂ ಅಕಲಿಪಾಕಲಿ ಗ್ರಾಂಡೆಂಟಲ್ ಎಕಿರಾಂಕೊಣ ಕೆಕ್ಕುಸಂಕಲಿ ಕೊಂಗಾಕಡಿಗುಳುಕ್ಕು. ಕರಿಯಿರಿ ಪುಕುಕಿಯಾಣ, ಗಸಗಸ, ವಿಂಬಿಯಿಯಾರ, ಮೃಡಿಯಿಲಿ ಪ್ರಿಗೆಸಿಸಿ, ನೀಲಿಯಾಂಗ, ಇಯಾಗ್ರಿಯಾಂಗ, ಮುಯಿಲಿಯಾನ, ನೆಂಬ ಬಿಸಿ, ಗಿರಿಕೆಂಬು, ಇಲ್ಲಾಕೆಯಾಂಗ	9	36	300	45

ಕಳುವು ಮಿಶ್ರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಬಿಡಿದ ನೀರು ಕಾರಣ, ಕಳ್ಳು ಲಿಪ್ಪುಸುಮಂದ, ಕಳ್ಳಲೆ ಗಗಗ, ಬಿಳ್ಳಂತು ದುರಿಯ ಸುರಿಯ ರಿಯ್ಯಲು ಸಂಭವಿಂಬಯ್ಯು.

ಪ್ರಯೋಗ ವಿಧಾನ: 1. ಒಪೆಗೆ ಮೊಂಗಿಕ್ಕುವುತೆ, ತಾಂಡ ಬೆಯಿಯರಲು ರೆದಾ ದೆಬೆದ್ದಾಗ ಬಿಡಿದಾ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕು ಇಳ್ಳರಾದು. 2. ಕಳುಬು ಮತ್ತು ಬಿಳ್ಳಂತು ಕಳುಬಿನ್ನಿತ್ತಿಗೆ ಬಳ್ಳುತ್ತಿ ಬಿಗಿನಿಗೆ ನೆಂಬುವೆ ಸಿಂಬುನ್ನು ಇಳ್ಳಂತು ಸ್ಥಾನಂ ಬೆಯಿಯಿ. 3. ಒಪೆಗೆ ಇದಿ ಕಳ್ಳಲೆ ಇದೆಗೆ ಮಾಯಿಯಾ ಸಿಡ್ಲೆಗೆ ನಾಟಬೆಯು 10 ನುಂದಿ 15 ನಿಮಿಷಂ ಸರಿಯಾ ಕಳ್ಳಲೆಗೆ ಕಿಟ್ಟುಬಂದಾ ಕುಡುಬುಯ್ಯಿರೆಂಬಿ. 4. ಒಪೆಗೆ ರೆದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬುಯಿಂತೆ, ನೆಂಬಲೆ ರೆಗಿಂ ಅರಿಯಂಯಿರು ತರಿರಿಂದಿರೆ. 5. ಒಪೆಗೆ ರೆಗಿಕೆ ಬಿಯ್ಯರಿಕಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಾಂತ್ತಿಯಾನುಂಬರೆ, ನೆಂಬಲೆ ಡ್ಯಾರ್‌ಗಿಕ್ಕು ನಂಬ್ರದಿಂದಾಲಿ.

ಡೊಸ್ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಮಯ: ಸಿಂಪಡಿಸುವ ದ್ರಾವಣ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 500-600 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನ ಸಿಂಪಡಣಾ ದ್ರಾವಣ ಮಾಡಿ

ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಸಮಯ: ಸೋಯಾಬೀನ್: (ಒಂದೇ – 3-10 ದಿನಗಳ ಬಿತ್ತನೆಯಂತರ (ಒಮ್ಮೆ)

ಭತ್ತ: ನಾಟಿ – 5-10 ದಿನಗಳ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ (ಒಮ್ಮೆ)

ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು: 1. ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಆಹಾರದ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಪರಿಡಿಗಳು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಪರಿಧಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಿರಿ. 2. ಕಾಯ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಡಿರಿ ಮತ್ತು ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ. 3.ಸಿಂಪರಣೆಯಮೆಗಳನ್ನು ಉಸಿರಾಡಲಿಗೆರೆಯಿಗೆ ಬಿಡಿರಿ. 4. ಸಿಂಪರಣೆಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕೆಂದು. 5. ಸಿಂಪರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೊಗೆಸೂಪಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ, ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನದೆಯೂ, ಕುಡಿಯದೆಯೂ ಜಾಗೂ ಜಗಿಯಬೇಡಿ. 6. ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪೂರ್ಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿರಿ.

ಜೇನು ನೊಣ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವೈರಿಗಳಂತಹ ಉಪಕಾರಿ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ತಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿರಿ.

ವಿಷಪ್ರಾಶನ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಅಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದು ಅಥವಾ ರ‍್ಯಾಶ್ ಉಂಟಾಗುವುದು ಚರ್ಮದ ಉರಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆತ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: 1. ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ, ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಬದಿಯನ್ನು ಕೆರೆದು ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿರಿ. ವಾಂತಿಯ ದ್ರವ ತೆಳುಗಿನ್ನುವ ವರೆಗೆ ಮೆಗೆ ಮಾಡಿರಿ. ರೋಗಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿರಿ. 2. ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಮ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಕಳೆದು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೇರಳ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಬೂನು ಹಾಕಿ ತೊಳೆಯಬೇಕೆಂದು. 3. ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಲಿಗಳಿದ್ದರೆ, 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕನಕ ಸ್ಯಾಲೈನ್/ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಚಿಮ್ಮು. 4. ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ, ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಯಿರಿ. 5. ವಿಷಪ್ರಾಶನದ ಯಾವುದೇ ಸಂಕೇತ ಕಂಡರೂ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ.

ಪ್ರತಿಶಾಮಕ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಶಾಮಕ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಾನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ.

ಖಾಲಿ ಕಂಟೇನರುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ: 1. ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳ ತೊಳೆ ನೀರನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆಯಾದರೂ ಈ ಉತ್ಪನ್ನದ ಕಂಪನಿಗಳು, ಸೂತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದವರು ಹಾಗೂ ಬಳಸಿದ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲಪ್ರದೂಷಣೆಯಾಗದಂತೆ ವಿಸರ್ಜನೆಪಡೆದ್ದು. 2. ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳು ಮರು ಉಪಯೋಗಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಮಾಡಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಗೂ ಒಳಗೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲೆ ಬೆಂಡುಮಾಡಿರಿ. 3. ಪ್ಯಾಕೆಟುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಒಳವೆಗಳಿಗೆ ದೂರದಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಣಿಯಲೆಡಿಸಿ.

ಶೇಖರಣೆಯ ನಿಯಮಗಳು: 1. ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಎಲ್ಲದ ಪ್ಯಾಕೆಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದೂರದಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವದ ಆಧಾರದ ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲಮಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. 2. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದೂರದಾಗಿ ಕೆಟ್ಟಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರದ್ದು ಕಂದಾಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟವು ಹರಿಯಿಂದ ಕೆಲುಷಿತಗಾದಂತಾಗಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ

ಕ್ಲೊರಿಮ್ಯುರಾನ್ ಇಥೈಲ್ ಸ.ಘ.	25.00% ಡ