थियामेथोक्साम 12.6% + लैम्ब्डा–सायहेलोथ्रीन 9.5% झेड.सी. अन्तर्प्रवाही आणि संपर्क किटकनाशक (शेतीसाठी वापर)

थियामेथोक्साम 12.6 प्रतिशत + लैम्ब्डा–सायहेलोथ्रीन 9.5 प्रतिशत जेझ.सी. हे एक संयोगी किटकनाशक असून ते पोटातून आणि संपर्कांद्वारे त्वरित कार्य करते आणि त्याची शिफारस कपासवरील मावा, तुडतुडे, फूलकीड आणि बोंडअळी, मक्यावरील मावा, शेंडेअळी, खोड किड, मुईमुगावरील तुडतुडा, पाने खाणारा सुरवंट, सोयाबीनवरील खोड माशी, सेमीलूपर, गर्डल बीटल, मिर्चीवरील फूलकीड आणि फळे पोखरणारी अळी, चहामधील फूलकीड, सेमीलूपर, टी मॉस्किटो, टोमॅटो पिकावरील फूलकीड, पांढरी माशी, फळ पोखरणारी अळी यांच्या नियंत्रणासाठी केली जाते.

शिफारसः

पीक	कीटकांचे नांव	मात्रा/एचए		पाण्यात पातळ करणे (लि.)	कापणी आणि शेवटच्या फवारणी मधील कालावधी (दिवस)
		ए.आय. (ग्रॅम)	फार्मुलेशन (मि.लि.)		
कापूस	मावा, तुडतुडे, फूलकीड आणि बोंडअळी	44	200	500	26
मका	मावा, शेंडेमाशी, खोड किड	27.5	125	500	42
भुईमूग	पाने गुंडाळणारी अळी, पाने खाणारे सुरवंट	27.5	125	500	28
सोया–बीन	खोड माशी, सेमीलूपर, गर्डल बीटल	27.5	125	500	48
मिर्ची	फूलकीड आणि फळ पोखरणारी अळी	33	150	500	3
चहा	फूलकीड, सेमीलूपर, टी मॉस्किटो बग	33	150	500	1
टोमॅटो	फूलकीड, पांढरी माशी, फळ पोखरणारी अळी	27.5	125	500	5

वापरण्यासाठी निर्देश: आवश्यक प्रमाणात कीटकनाशक घेऊन ते थोडया पाण्यात नीट मिसळून घ्या. निर्देशानुसार उरलेले पाणी मिसळून संपूर्ण पिकावर योग्य स्प्रेयरने फवारणी करा.

पुनर्प्रवेश अवधी: 48 तास.

वापरण्याची वेळ: पिकाला फुले येत असताना कीटकनाशकाची फवारणी करू नका. मधमाशा सक्रीय असलेल्या ठिकाणी फवारणी करू नका. उपचार केलेल्या क्षेत्राजवळच्या वाऱ्, खेड अथवा फुलांवरील पिकांवर आणि झुडपांवर वाऱ्याद्वारे फवाऱ्याचे तुषार उडू देऊ नका. उपचार करायच्या क्षेत्रात एकिद्दसचे मध अत्याधिक प्रमाणात असल्यास तिथे फवारणी करू नका. फुले येत असलेल्या पिकांवर फुले येण्याच्या 5 दिवस आधी पासून फुले पूर्ण वेझ्र्पर्यंत फवारणी करू नका. मधमाशा सक्रिय असताना फवारणी करू नका. हे कीटकनाशक नाशासाठी सुद्धा विषारी आहे.

काळजी: ते तयार करण्यासाठी स्वयंपाकाची भांडी वापरू नका. मिश्रण ढवळण्यासाठी काठी वापरा. त्वचेशी संपर्क होऊ नये म्हणून हातमोजे वापरा. श्वासावाटे आत घेऊ नका आणि डोळयांशी संपर्क होऊ देऊ नका. फवारणी करताना मुखवटा गॉगल्स, बूट यासारखे संरक्षक कपडे घाला आणि अंगावर तुषार उडू देऊ नका. नोझलवर तोंडाने फुंकर मारू नका. फवारणी करताना खाऊपिऊ नका किंवा धूम्रपान करू नका. न वापरलेले मिश्रण साठवून ठेऊ नका. वापरल्यानंतर स्प्रेयर, बादल्या आणि इतर भांडी दररोज पाण्याने धुवा. काम संपल्यानंतर हात साबण आणि भरपूर पाण्याने स्वच्छ धुवा आणि कपडे बदला. दूषित कपडे ही धुवा फवारणीच्या तुषारांचा परिणाम नदी, जलाशय, तलाव आणि इतर पाणी साठवण्याच्या ठिकाणांवर होऊ देऊ नका. उरलेले कीटकनाशक किंवा रिकाम्या डब्यांनी जलाशये दूषित होऊ देऊ नका.

विषबाधेची लक्षणे: उंदरांवर विषबाधेची कोणतीही निश्चित लक्षणे दिसली नाही पण असंलग्न, लाळ गळणे, डोळयातून पाणी येणे आणि श्वास घेण्यात त्रास होण्यासारखी लक्षणे दिसू शकतात.

प्राथमिक चिकित्सा: प्रभावित व्यक्तीला प्रदूषित जागेपासून हवेशीर खोली किंवा मोकळया हवेत घेऊन जाने आणि तापमानापासून बचाव करावा. त्वचेवर लागल्यास: प्रदूषित कपडयांना काढून टाकावे आणि प्रभावित भाग चांगल्या पाण्याने आणि साबणाने धुवून काढावा. डोळयामध्ये गेल्यास: काही वेळ पर्यंत स्वच्छ पाणी मारावे. खाण्यात गेल्यास: पाण्यात मेडिसिनल चारकोलचे भरपूर प्रमाणात द्यावे आणि वैद्यकीय मदत घ्या.

सूचना: मुर्छित रुग्णाला तोंडावाटे काहीही देवू नये. उलटी करण्याचा प्रयत्न करु नये.

रोप विषाक्तता: सर्वसामान्य.

विषनाशक: कोणतेही विष प्रतिरोधक नाही. लक्षणानुसार उपचार करावा.

रिकाम्या डब्यांची विल्हेवाट:

1. पर्यावरणाला प्रदूषणापासून वाचविण्यासाठी डबे, उरलेले मिश्रण/पदार्थ यंत्र धुतल्याचे पाणी आणि रिकामे डबे सुरक्षित ठिकाणी नेतून टाकावे.
2. वापरलेले डबे/पाकिटे तसेच बाहेर टाकू नये.
3. डबे/पाकिटे वस्तीपासून दूर गाडून टाकावे.

संग्रह करण्याच्या अटी:

1. कीटकनाशकांचे डबे हे इतर सामुग्री किंवा खाण्यापिण्याच्या खोलीपासून दूर ठेवावे आणि डबे बंद खोलीमध्ये व कुलुपबंद गोदाम आलमारित ठेवावे.
2. कीटकनाशक तेवलेली खोली हवेशीर असावी त्यात भरपूर प्रकाश यावा, त्यात सूर्यप्रकाश असावा. जागा मोकळी असावी आणि ती हवा प्रदूषणा पासून दूर असावी.

रासायनिक रचना: भार/भार

लेम्बडा–सायहेलोथ्रिन(स.त.)	9.5%
थायमेथोक्साम (स.त.)	12.6%
ऑक्टाडेकॅनोइक एसिड, 12–हायड्रोक्सी–होमोपोलीमर, ऑक्टाडेकॅनोनेट (पोलीमर)	0.8%
स्टायरीलहेप्टानोल पॉलिऐथीलिसेक्स्टर फॉस्फेट	1.17%
सोडियम लिग्नोसल्फोनेटेड इथोक्सिलेटेड	1.17%
अमोनिया	0.25%
सल्फ्युरिक एसिड	0.54%
लिग्नोसल्फेट सोडियम सॉल्ट	1.04%
पॉलिडायमिथाईल सिलोक्सेन	0.10%
कोपॉलिमर बुटानॉल	0.50%
डोडीसाइलबेन्झेन सल्फोनिक एसिड सोडियम सॉल्ट	0.17%
डी एल–प्रॉपेनेडीऑल–(1,2)	0.20%
प्रोपेन–1,2,3–ट्रिओल	5.84%
हिटरोपॉलिसेकाराइड	0.20%
1,2–बेन्झीसोथियाझोलिन–3–वन	0.28%
टिटेनियम डायऑक्साईड	0.99%
आयसोसायनिक एसिड, मिथाईल–एम–फिनायलिन इस्टर	1.58%
मिक्स्चर ऑफ एसेमेटिक हायड्रोकार्बन्स (सॉल्वेंट सी–9)	7.76%
पाणी	पुरेसे प्रमाण%
एकूण:	**100.00%**

दक्षता: 1. लेबल आणि पावतीवर लिहिले नसल्यास प्रयोग पीक आणि रोगावर करू नये. 2. कापणी नंतर वापरू नये. 3. पावतीवर उल्लेख केल्यानुसार प्रयोगानंतर कंटेनर (डबे) नष्ट करून टाकावे. 4. रिकामे डबे पुन्हा वापरणी योग्यतारुक आहे. 5. हे उत्पादन उघडया शेतात वापरण्यासाठी असल्याने पॉलि हाऊसेस/बंदिस्त जागेसाठी निर्देश/मात्रा सुसंगत नाहीत.

थायामेथोक्सॅाम 12.6% + लेम्ब्डा सायहेलोथ्रिन 9.5% झेड.सी. पद्धतिसरनु स्पर्शीय जंतुनाशक (कृषिगत हेतु)

थियामेथोक्साम 12.6% + लेम्ब्डा सायहेलोथ्रिन 9.5% झेड.सी. ये उदरीय आन स्पर्शीय क्रियाशीलता धरावतु भऊ उपयोगी जंतुनाशक मिश्रण हे. तेनी भलामश्र कपासना पाऽमां लागतां ॲफिड, ऱ्हेसिड, थ्रिप्स अने बोलवोर्म्स, मकाऽनी पाऽमां थतां मावो ॲफिड, शूटफ्लाय अने स्टीम बोरर, मगऽणीना पाऽमां थतां ग्रीड होपर अने बीड ऽीटिंग केटरपिलर, सोयाबीनना पाऽमां थतां स्टेम फ्लाय, सेमीलूपर अने गिर्डल बिटल, मरचांना पाऽमां थ्रिप्स अने ऽट बोरर, चाना पाऽमां थ्रिप्स, सेमीलूपर अने टी मोस्क्वितो बग तेमज टमेटांना पाऽमां थ्रिप्स, व्हाईट फ्लाय, ब्लूट बोरर ऱ्हेवां जंतुनाऽ पर अंडुश राभवा माटे ऽरवामां आवे छे.

भलामश्रः

पाऽनुं नाम	ज्यानुं सामान्य नाम	प्रति ऽेक्टर मात्रा		पाणीमां मात्रा (लीटर)	छेल्लो छंटकाव तथा पाऽ कापवा वच्चेनो अंतर (दिवसो)
		स. तत्व (ग्रम)	संरचना (मि.ली.)		
कपास	ॲफिड, ऱ्हेसिड, थ्रिप्स अने बोलवोर्म्स	44	200	500	26
मकाई	ॲफिड, शूटफ्लाय अने स्टीम बोरर	27.5	125	500	42
मगऽणी	लीफ होपर अने लीफ ऽीटिंग केटरपिलर	27.5	125	500	28
सोया-बीन	स्टेम फ्लाय, सेमीलूपर अने गिर्डल बिटल	27.5	125	500	48
मरचां	थ्रिप्स अने ऽट बोरर	33	150	500	3
चा	थ्रिप्स, सेमीलूपर अने टी मोस्क्वितो बग	33	150	500	1
टमेटां	थ्रिप्स, व्हाईट फ्लाय अने ब्लूट बोरर	27.5	125	500	5

उपयोगनी दिशानिर्देश: उत्पादनानी आवश्यक मात्राने मापो अने तेने थोडां प्रमाणमां पाणीथी भेळवी दो. पाणीनी बाकीनी मात्रा उमेरो नेपसाईक स्प्रेअर्के हांथ वोल्यूम स्प्रेयर थी छंटकाव करो.

पुनः प्रवेशनो समयः 48 ऽलाक.

उपयोगनो समयः पाकना हवो दरमियान लागू पाडवुं जोईअे नहीं. जेथां मधमाषीओ सक्रिय होय त्यारे उत्पादननो उपयोग करशो नहीं. साऽवार क्षेत्रनी आसपासना वाऽ, खेड अथवा हवामां पाडने स्प्रे ऽिडेन्टनी मंजूरी आपशो नहीं. जो उपचार विस्तारमां उच्च प्रमाणमां ॲफिड हनीड्यु हाजर होय तो स्प्रे करशो नहीं. हवामां शुऽवात अने हवामां अंत पहेला 5 दिवसनी वच्चे हवामां पाऽ पर स्प्रे करशो नहीं. ज्यारे मध मधमाषी पराग रशनो /क्लिंग्रा लाव त्यारे पाऽ पर उपयोग थवो नहीं. आ उत्पादन माऽवी माटे ऽेरी छे.

काळजी: स्प्रे तैयार करवा माटे स्वयंपाकनी भांडी वापरो नहा. मिश्रण ढवळण्यासाठी काठी वापरा. त्वचेशी संपर्क होऊ नये म्हणून हातमोजे वापरा. श्वासावाटे आत घेऊ नका आणि डोळयांशी संपर्क होऊ देऊ नका. फवारणी करताना मुखवटा गॉगल्स, बूट यांसारखे संरक्षक कपडे घाला आणि अंगावर तुषार उडू देऊ नका. नोझलवर तोंडाने फुंकर मारू नका. फवारणी करताना खाऊपिऊ नका किंवा धूम्रपान करू नका. न वापरलेले मिश्रण साठवून ठेऊ नका. वापरल्यानंतर स्प्रेयर, बादल्या आणि इतर भांडी दररोज पाण्याने धुवा. काम संपल्यानंतर हात साबण आणि भरपूर पाण्याने स्वच्छ धुवा आणि कपडे बदला. दूषित कपडे ही धुवा फवारणीच्या तुषारांचा परिणाम नदी, जलाशय, तलाव आणि इतर पाणी साठवण्याच्या ठिकाणांवर होऊ देऊ नका. उरलेले कीटकनाशक किंवा रिकाम्या डब्यांनी जलाशये दूषित होऊ देऊ नका.

विषबाधेची लक्षणे: उंदरांवर विषबाधेची कोणतीही निश्चित लक्षणे दिसली नाही पण असंलग्न, लाळ गळणे, डोळयातून पाणी येणे आणि श्वास घेण्यात त्रास होण्यासारखी लक्षणे दिसू शकतात.

प्राथमिक चिकित्सा: प्रभावित व्यक्तीला प्रदूषित जागेपासून हवेशीर खोली किंवा मोकळया हवेत घेऊन जाने आणि तापमानापासून बचाव करावा. त्वचेवर लागल्यास: प्रदूषित कपडयांना काढून टाकावे आणि प्रभावित भाग चांगल्या पाण्याने आणि साबणाने धुवून काढावा. डोळयामध्ये गेल्यास: काही वेळ पर्यंत स्वच्छ पाणी मारावे. खाण्यात गेल्यास: पाण्यात मेडिसिनल चारकोलचे भरपूर प्रमाणात द्यावे आणि वैद्यकीय मदत घ्या.

सूचना: मुर्छित रुग्णाला तोंडावाटे काहीही देवू नये. उलटी करण्याचा प्रयत्न करु नये.

रोप विषाक्तता: सर्वसामान्य.

विषनाशक: कोणतेही विष प्रतिरोधक नाही. लक्षणानुसार उपचार करावा.

रिकाम्या डब्यांची विल्हेवाट:

1. पर्यावरणाला प्रदूषणापासी वाचविण्यासाठी डबे, उरलेले मिश्रण/पदाथ यंत्र धुतल्याचे पाणी आणि रिकामे डबे सुरक्षित ठिकाणी नेतून टाकावे.
2. वापरलेले डबे/पाकिटे तसेच बाहेर टाकू नये.
3. डबे/पाकिटे वस्तीपासून दूर गाडून टाकावे.

संग्रह करण्याच्या अटी:

1. कीटकनाशकांचे डबे हे इतर सामुग्री किंवा खाण्यापिण्याच्या खोलीपासून दूर ठेवावे आणि डबे बंद खोलीमध्ये व कुलुपबंद गोदाम आलमारित ठेवावे.
2. कीटकनाशक तेवलेली खोली हवेशीर असावी त्यात भरपूर प्रकाश यावा, त्यात सूर्यप्रकाश असावा. जागा मोकळी असावी आणि ती हवा प्रदूषणा पासून दूर असावी.

रासायनिक रचना: भार/भार

लेम्बडा–सायहेलोथ्रिन(स.त.)	9.5%
थायमेथोक्साम (स.त.)	12.6%
ऑक्टाडेकॅनोइक एसिड, 12–हायड्रोक्सी–होमोपोलीमर, ऑक्टाडेकॅनोनेट (पोलीमर)	0.8%
स्टायरीलहेप्टानोल पॉलिऐथीलिसेक्स्टर फॉस्फेट	1.17%
सोडियम लिग्नोसल्फोनेटेड इथोक्सिलेटेड	1.17%
अमोनिया	0.25%
सल्फ्युरिक एसिड	0.54%
लिग्नोसल्फेट सोडियम सॉल्ट	1.04%
पॉलिडायमिथाईल सिलोक्सेन	0.10%
कोपॉलिमर बुटानॉल	0.50%
डोडीसाइलबेन्झेन सल्फोनिक एसिड सोडियम सॉल्ट	0.17%
डी एल–प्रॉपेनेडीऑल–(1,2)	0.20%
प्रोपेन–1,2,3–ट्रायल	5.84%
हिटरोपॉलिसेकाराइड	0.20%
1,2–बेन्झीसोथियाझोलिन–3–वन	0.28%
टिटेनियम डायऑक्साईड	0.99%
आयसोसायनिक एसिड, मिथाईल–एम–फिनायलिन इस्टर	1.58%
मिक्स्चर ऑफ एसेमेटिक हायड्रोकार्बन्स (सॉल्वेंट सी–9)	7.76%
पाणी	पुरेसे प्रमाण%
एकूण:	**100.00%**

चेतवणी: 1. आ साधेना लीबलेटमां जणाव्या सिवायना पाक अने जंतुओ पर आ प्रोडक्ट वापरवो नहीं. 2. सायली पछी वापरवो नहीं. 3. पावतीमां उल्लेख कर्या मुजब कंटेनर (डबा) नष्ट करवा जोईअे. 4. रिकाम डबाने पुनः वापरवा माटे सुरक्षित जगाए राखवा जोईअे. 5. ए उत्पादन खुला खेतरमां वापरवा माटे छे. आ ऽेपाडनना उपयोग भुरुथ भरेलां मोनरमां ऽेवामां सोबाथी पोली हाऊसोस/ऽ-क्लोज्ड विस्तार माटे सूचनाओ/मात्रा मेऽुरी नथी.

थायामेथोक्साम 12.6 प्रति. + लैम्बडा-सायहेलोथ्रिन 9.5 प्रति. जेड. सी. अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक (कृषि उपयोग के लिए)

थायामेथोक्साम 12.6 प्रति. + लैम्बडा–सायहेलोथ्रिन 9.5 प्रति. जेड. सी. एक बहुपयोगी कीटनाशक मिश्रण है जो तीव्र उदरीय तथा संस्पर्शी क्रियाशीलता रखता है तथा इसकी सिफारिश कपास की फसल पर लगने वाले माहो, तेला, चुरदा, टिड्डों की सुंडियां, मक्का में माहो, तेला, चुरदा, टिड्डों की सुंडियां, मूंगफली में पत्ती का टिड्डा, पत्ता खाने वाली सुंडी, सोयाबीन में स्टेम फ्लाई, अर्द्धकुंडलक, मिर्च में चुरदा, फल छेदक इल्ली, चाय में चुरदा, अर्द्धकुंडलक, चाय का मच्छर कीट, टमाटर में चुरदा, फल छेदक इल्ली, सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए की जाती है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (ली.)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिनों में)
		स. तत्व (ग्रा.)	संरचना (मि.ग्रा.)		
कपास	माहो, तेला, चुरदा, टिड्डों की सुंडिया	44	200	500	26
मक्का	माहो, तेला, चुरदा, टिड्डों की सुंडिया	27.5	125	500	42
मूंगफली	पत्ती का टिड्डा, पत्ता खाने वाली सुंडी	27.5	125	500	28
सोयाबीन	स्टेम फ्लाई, अर्द्धकुंडलक	27.5	125	500	48
मिर्च	चुरदा, फल छेदक इल्ली	33	150	500	3
चाय	चुरदा, अर्द्धकुंडलक, चाय का मच्छर कीट	33	150	500	1
टमाटर	चुरदा, फल छेदक इल्ली, सफेद मक्खी	27.5	125	500	5

उपयोग के लिए मात्रा: उत्पाद की आवश्यक मात्रा मापें और थोड़े से पानी में इसे अच्छे से मिलाएं। निर्देशानुसार हिलाते हुए पानी की शेष निर्दिष्ट मात्रा डालें और नैपसैक स्प्रेयर्स या हाइ वॉल्यूम स्प्रेयर्स से छिड़काव करें।

पुनः प्रवेश अंतराल: 48 घंटे।

प्रयोग का समय: फसल पर फूल आने की अवस्था पर स्से नहीं करें। मधुमक्खियों के सक्रिय समय पर स्से नहीं करें। उपचारित क्षेत्र के नजदीकी फूलवाली फसलें, खरपतवार (फूल की अवस्था) एवं झाड़ियों को हवा द्वारा फैलने वाले छिड़काव के अवशेष से प्रभावित नहीं होने दें। माहू द्वारा विकसित अत्यधिक शहद वाले फसल क्षेत्र को उपचारित नहीं करें। फूल वाली फसलों में फूल आने के 5 दिन पहले से फूल बनने की अवस्था पूरी होने तक स्से नहीं करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ: स्से तैयार करने के लिए खाना पकाने के बर्तनों का इस्तेमाल मत कीजिए। स्से के घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करें। त्वचा, आँख और मुँह को कीटनाशक के संपर्क से बचाये तथा श्वास अंदर जाने से रोकें। सुरक्षात्मक कपड़े जैसे कि ऐप्रन, दस्तानों और गम बूट आदि पहन कर ही इसका प्रयोग करें। कीटनाशक का प्रयोग करते समय, खाना, पीना और धूम्रपान करना नहीं चाहिए। प्रति दिन प्रयोग के बाद, कीटनाशी से प्रभावित हिस्सों को अच्छी तरह धो ले और कपड़ा बदल लें। दूषित कपड़ों को अच्छी तरह धो लें। हवा द्वारा फैलने वाले छिड़काव के अवशेष को नदियों, जलाशय, तालाब एवं अन्य जलसंग्रहण क्षेत्र को प्रभावित नहीं होने दें। शेष बचे पदार्थों के निस्तारण एवं खाली कन्तस्तरों द्वारा जलाशय को दूषित होने से बचाएं।

विष के लक्षण: चूहों पर विष को कोई निश्चित लक्षण दिखाई नहीं दिया, लेकिन असंलग्न, लार टपकना, आँसू आना तथा साँस लेने में कठिनाई, जैसे लक्षण दिख सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा: प्रभावित व्यक्ति को प्रदूषित जगह से हवादार कमरें या खुली हवा में ले जाए और तापमान से बचाए। त्वचा में लगने पर: प्रदूषित कपड़ों को उतार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबून और पानी से अच्छी तरह धोएं। आँखों के चले जाने पर: आँखों को कुछ देर तक साफ पानी से अच्छी तरह छपछपाइए। निगल जाने पर: पानी में सलाईन, चारकोल की काफी मात्रा घोलकर बार–बार दें और डॉक्टर को बुलाइए। 4. सूचनाः यदि मरीज बेहोश हो तो, मुँह से कुछ न दें। उल्टी कराने की कोशिश न करें।

पौधविषाक्तता: कोई खास विष प्रतिहार नहीं है, लक्षण के अनुसार चिकित्सा करें।

खाली डिब्बों का निपटारा: 1. पर्यावरण का प्रदूषण बचाने के लिए खाली डिब्बें, बचा हुआ घोल, मशीनों की धोवन और डिब्बों का निपटारा सुरक्षित स्थान पर करें। 2. खाली डिब्बों का पुनः प्रयोग रोकने के लिए उन्हें बाहर न छोड़ें। 3. डिब्बों को तोड़–मोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए।

संग्रहण की शर्तें: 1. कीटनाशक के डिब्बों को अन्य सामग्री विशेषकर खाद्य पदार्थ के संग्रहण कक्ष या स्थान से दूर किया जाना चाहिए अथवा कीटनाशक की मात्रा तथा स्थाया पर निर्भर करते हुए डिब्बों को अलग अलमारी में ताला–चाबी लगाकर रखें। 2. कीटनाशक का संग्रहण कक्ष या स्थान रोशनीदार, मजबूत बनावट का, हवादार तथा पर्याप्त लम्बाई चौड़ाई का होना चाहिए, जिससे वाष्प द्वारा प्रदूषण न हो।

रासायनिक संरचना: भार/भार

लेम्बडा–सायहेलोथ्रिन (स.त.)	9.5%
थायामेथोक्साम (स.त.)	12.6%
ऑक्टाडेकेनोइक एसिड, 12-हाइड्रोक्सी-होमोपोलीमर, ऑक्टाडेकानोनेट (पोलीमर)	0.8%
स्टायरिलहेप्टोल पोलीऐथोक्सीफ्रेस्टर फोस्फेट	1.17%
सोडियम लिग्नोसल्फोनेटेड इथोक्सीलेटेड	1.17%
अमोनिया	0,25%
सलफ्यूरिक एसिड	0.54%
लिग्नोसल्फोनेट सोडियम साल्ट	1.04%
पॉलीडायमिथाइल सिलोक्सेन	0.10%
कोपलिमर बुटानोल	0.50%
डोडिसाइलबेन्जेनसल्फोनिक एसिड, सोडियम साल्ट	0.17%
डीएल-प्रोपानेडायल-(1,2)	0.20%
प्रोपेन-1,2,3-ट्रायल	5,84%
हेटरोपोलीसेकराईड	0.20%
1,2-बेन्जिसोथियाजोलिन-3-ओन	0,28%
टिटानियम डायऑक्साईड	0,99%
आइसोसायनिक एसिड, मिथाइल-एम-फेनिलिन ईस्टर	1,58%
मिश्रसंरचना ऑफ ऐसेमेटिक हाइड्रोकार्बनस (सोलवेंट सी–9)	7,76%
पानी	पर्याप्त मात्रा %
योग	**100.00%**

सावधानियाँ: 1. लेबल और पर्ची पर उल्लिखित न होने की स्थिति में इसका प्रयोग फसल और पौड़कों पर न करें। 2. फसल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें। 3. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बे) को नष्ट कर दें। 4. खाली कंटेनर (डिब्बे) का पुनः उपयोग करना खतरनाक है। 5. पॉली हाउस/सीमित क्षेत्र के लिए निर्देश/सुझाव नहीं है क्योंकि उत्पाद खुले मैदान में उपयोग के लिए है।

THIAMETHOXAM 12.6% + LAMBDA CYHALOTHRIN 9.5% ZC SYSTEMIC & CONTACT INSECTICIDE (FOR AGRICULTURAL USE)

Thiamethoxam 12.6 + Lambda-cyhalothrin 9.5% ZC is a combination insecticide having quick stomach and contact activity and is recommended to control Aphids, Jassids, Thrips & Bollworms in Cotton, Aphid, Shootfly, Stem borer in Maize, Leaf hopper, Leaf eating caterpillars in Groundnut, Stem fly, Semilooper, Girdle beetle in Soyabean, Thrips & Fruit borer in Chilli, Thrips, Semilooper, Tea mosquito bug in Tea, Thrips, Whiteflies, Fruit borer in Tomato crop.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/Ha		Dilution in water (in Ltr.)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
		AI (gm)	Formulation (ml)		
Cotton	Aphids, Jassids, Thrips & Bollworms	44	200	500	26
Maize	Aphids, Shootfly, Stem borer	27.5	125	500	42
Groundnut	Leaf hopper, leaf eating caterpillar	27.5	125	500	28
Soyabean	Stem fly, Semilooper, Girdle beetle	27.5	125	500	48
Chilli	Thrips & Fruit borer	33	150	500	3
Tea	Thrips, Semi-looper, Tea mosquito bug	33	150	500	1
Tomato	Thrips, White flies, Fruit borer	27.5	125	500	5

Direction of use: Measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified through agitation for total coverage of crop with suitable sprayers.

Re-entry Period: 48 hours.

Time of Application: The product should not be applied during flowering of the crop. DO NOT use the product where bees are actively foraging. DO NOT allow spray drift to flowering weeds, hedges or flowering crops in the vicinity of the treatment area. DO NOT spray if a high amount of aphid honeydew is present in the treatment area. DO NOT spray on flowering crops between 5 days before start of flowering and end of flowering. Not to be used on crops when honey bees are pollinators/foraging. This product is also toxic to fish.

Precautions: Do not use cooking utensils for preparing sprays. Use stick for stirring the spray solution. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Also avoid inhalation and contact with eyes. Wear protective clothing, mask, goggles, boots, while spraying and do not expose yourself to spray drift. Do not blow nozzles with mouth. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. Do not store unused spray solution. Clean sprayers, buckets and other utensils with water daily after use. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Also wash the contaminated clothes. DO NOT allow spray to drift onto rivers, lakes, ponds, ditches or other waterways. DO NOT allow discharging left over material or empty containers to contaminate waterways.

Symptoms of Poisoning: Poisoning symptoms in rodents are non-specific, may cause symptoms of ataxia, salivation, lachrymation and decreased breathing etc.

First Aid: 1. Remove the affected person from the danger zone to a well-ventilated area or to fresh air and protect from extreme cooling. 2. In case of suspected poisoning: immediately call a physician. 3. In case of skin contact: Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. In case of eye contact: Rinse eyes with clean water for several minutes and immediately call a physician. In case of ingestion: Repeatedly administer medicinal charcoal in a large quantity of water. 4. Note: Never give anything by mouth to an unconscious person. Do not induce vomiting.

Phytotoxicity: As in common.

Antidote: No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy.

Disposal of used Container: 1. Packages or surplus materials and washings from the machines and containers should be disposed off in a safe manner as to prevent environmental pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions: 1. The packages containing the insecticides should be stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles, particularly, articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition : w/w

Lambda-Cyhalothrin (a.i.)	9.5%
Thiamethoxam (a.i.)	12.6%
Octadecanoic acid, 12-hydroxy- homopolymer, octadecanoate (Polymer)	0.8%
Styrylphenol polyethoxyester phosphate	1.17%
Sodium lignosulfonate ethoxylated	1.17%
Ammonia	0,25%
Sulfuric acid	0.54%
Lignosulfonate sodium salts	1.04%
Polydimethylsiloxance	0.10%
Copolymer butanol	0.50%
Dodycylbenzenesulfonic acid, sodium salt	0.17%
DL-propanediol-(1,2)	0.20%
Propane- 1,2,3-triol	5,84%
Heteropolysaccharide	0.20%
1,2- benzisothiazolin-3-one	0,28%
Titanium dioxide	0.99%
Isocynic acid, methyl-m-phenylene ester	1.58%
Mixture of aromatic hydrocarbons (Solvent C-9)	7,76%
Water	QS %
Total	100,00%

Warning: 1. Not to be used on crops and diseases other than those mentioned on Label and Leaflets. 2. Not to be used for Post-Harvest application. 3. Destroy the container after use as directed on Leaflet. 4. Dangerous to re-use empty containers. 5. Directions/dosage not relevant for poly houses/confined area as product is meant for use in open field.

READ INSTRUCTION BEFORE USE.
उपयोग से पहले सूचना पत्रिका पढ़े।
FOR AGRICULTURAL USE ONLY.
केवल कृषि उपयोग के लिए।

Thiamethoxam 12.6% + Lambda-Cyhalothrin 9.5% ZC

BELEAF®

(Systemic and Contact Insecticide)

थायामेथोक्साम 12.6 प्रति. + लैम्बडा-सायहेलोथ्रिन 9.5 प्रति. जेड. सी.

बीलीफ

(अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक)

Marketed by :
Godrej Agrovet Limited,
Godrej One, 3rd Floor, Pirojshanagar,
Eastern Express Highway, Vikhroli (East),
Mumbai - 400 079

विपणन कर्ता :
गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड,
गोदरेज वन, तिसरा माला, पिरोजशानगर,
इस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे,
विक्रोली (पूर्व), मुंबई - ४०० ०७९

In case of complaints, please contact our customer service executive at the Registered Office address of the Marketer or email at gavlho@godrejagrovet.com or call us at 022-25194491 website : www.godrejagrovet.com

Manufactured By : BR Agrotech Ltd. Regd. Office: 1505, Vikram Tower, Rajendra Place, New Delhi-110008
निर्माता: बी आर एग्रोटेक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: १५०५, विक्रम टॉवर, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली–११०००८

See first letter of Batch No. for manufacturing unit address.

K : Industrial Area, SIDCO, Kathua-184101 (J&K)
Mfg. Lic. No.: J/M-Pvt/18
क : इण्डस्ट्रियल एरिया, सिडको, कठुआ–१८४१०१ (जे. एण्ड के.)
उत्पा. लाई. नं.: J/M-Pvt/18

P : Plot No. 620/3, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar Dist. Bharuch, Gujarat-394115
Mfg. Lic. No.: GJ-BHA-01043
प : प्लोट नं. ६२०/३, जी.आई.डी.सी. एस्टेट पनोली, अंकलेश्वर जि. भरूच, गुजरात–३९४११५
उत्पा. लाई. नं.: GJ-BHA-01043

Caution :
"Not to be used on Crops other than specified on this Label/Leaflet".

HDPE

Copyright ©, Trademark and all Rights Reserved by Godrej Agrovet Limited 2024.

agrovet

ثیامیاتھوکسام 12.6 + لیمبداسائپا لوتھین 9.5 زیڈ سی اندرگھس کے اور لگتےہی اثرکرنےوالا دود کش (صرف زراعتی استعمال)

ثیامیاتھوکسام 12.6 + لیمبداسائپا لوتھین 9.5 زیڈ سی ایک مرکب ہےجوانڈیگھس کے اور لگتےہی اثرکرنےوالا اثیاتی مولرٹرود کش اور بےحس کےاستعمال کے سفارش کیاگیا ہیں فصل سفر، جسے سیڈ، نیات چوس حشرہ اورگنڈھی سنڈی، مکئی میں فصل سفر، شوٹ فلائی اورلیفےکو چھیدنےوالے کیڑوں، مونگ پھ