

Difenoconazole 25% EC

BENBOW®

Systemic Fungicide

It is a systemic fungicide with excellent action against diseases such as Apple scab sheath blight in Paddy and die back and fruit rot in Chilli. It contains 250 gm Difenoconazole 1-[2-[4-(4-chlorophenoxy)-2-chlorophenyl]-4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl methyl]-2,4-tiazole. per kg of emulsifiable concentrate (EC) formulation.

Recommendation

Crops	Common Name of Pest	Dosages /HA		Dilution in water	Waiting Period between last spray to harvest
		A.I	Formulation		
Paddy	Sheath blight	0.0125% or 12.5g/100L Water	0.05% or 50 ml/100L water	500-1000 (As per size of plant)	25
Chilli	Die back, Fruit rot	-do-	-do-	500	15
Apple	Scab	0.004% or 4g/100L Water	0.015% or 15 ml/100L water	As required depending upon the Size of the plant and plant protection equipment used.	14

Direction of use: Measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with knapsack sprayers for high volume of application through knapsack sprayers of high volume sprayers.

Re-entry Period: 24 hours.

Precautions: Do not use the cooking utensils for preparing sprays solution. Use stick for stirring the spray solution. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Also avoid inhalation and contact with eyes. wear protective clothing masks, goggles, boots while spraying and do not expose yourself to spray drift. Do not blow nozzles with mouth. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. Do not store unused spray solution. Clean sprayer, buckets and other utensils with water daily after use. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Also wash the contaminated clothes. Do not contaminated streams, ponds, waterways etc., by discharging leftover spray materials into them or by cleaning sprayers, contaminated buckets etc., in them. Do not spray when bees are active. When used at recommended dosages, no adverse effect on wild life is expected. In case of any sign of poisoning, immediately consult the doctor.

Symptoms of Poisoning: Poisoning may cause symptoms of sedation, dyspnea & hunched posture.

First Aid: In case of contact with skin and eyes, wash immediately with plenty of water. If inhaled, move to clean air. If swallowed, give a large quantity of medical charcoal in plenty of water. Seek medical attention if a large volume of concentrate was ingested if irritation should persist

Antidote: No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy.

Disposal of used container: 1. Packages or surplus material and washing from the machines and containers should be disposed of in safe manners as to prevent environmental and water pollution. 2. It is dangerous to re-use empty containers. The used packages shall not be left out side to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions: 1. The package containing the fungicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almira's under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicide. 2. The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, airy, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Warning: 1. Not to be used on crops and pests other than those mentioned on label and leaflets. 2. Not to be used for Post – Harvest Application. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly houses and confined area – Refer the leaflet.

Caution: Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet. Read and understand Labellet before use.

Chemical Composition

Difenoconazole a.i.	25.000% m/m
Emulsifiers: Castor oil polyglycol ether 36-40	13.000% m/m
Dodecyl benzene sulfonic acid, calcium salt	2.000% m/m
Solvent C-9	45.000% m/m
Cyclohexanone	15.000% m/m
Total	100.000% w/w

डाइफेनोकोनाझोल 25 इ.सी. प्रतिशत

बेन्बो

अन्तर्प्रवाही फफूंदीनाशक

यह एक अन्तर्वाही फफूंदीनाशक है जो सेब के पामा रोग को नियंत्रित करता है। इस में २५० ग्राम डाइफेनोकोनाझोल १-२-४-४-क्लोरोफेनोक्सी-२-क्लोरोफेनोक्सी-४-मेथिल १,२-डाईक्सोलान-२-वाल इल मेथिल -१ एच, १,२,४- ट्रायझोल प्रति किलोग्राम का इमलसीफाबल कोसेन्ट्रेट ई.सी. संरचना है।

उपयोग :

फसल	रोग के सामान्य नाम	प्रति हेक्टोडॉज मात्रा ग. ल. व. प्रति प्रति हे	पाणी की मात्रा (ली.)	अंतिम छिड़काव तथा फसल कटने के बीच अंतराल (दिने के)	
धान	सेब ब्लाइट	0.0125 प्रति या 12.5 ली. 100 ली. प्रति हे	0.05 प्रति या 50 मिली./ 100 ली. प्रति हे	500-1000 (पानी की संख्या पर आधारित)	25
मिर्च	ब्राउन बॉट, फ्रुट रॉट	उपर के जैसा	उपर के जैसा	500	15
सेब	पामा रोग	0.004 प्रति या 4 ग./ 100 ली. प्रति हे	0.015 प्रति या 15 मिली./ 100 ली. प्रति हे	घोरी की संख्या तथा फसल कटने के लिए इस्तेमाल हो रहे छिड़काव के बाद अंतराल (दिने के)	14

उपयोग के लिये निर्देश: उत्पाद की वांछित मात्रा लिजिए और उसे थोड़े से पानी के साथ अच्छी तरह मिलाइए। पीट पर लधने वाले खंभे को तथा उच्च आमतान वाले छिड़काव यंत्र का प्रयोग करें। बड़ी मात्रा में उपयोग करने के लिये निर्देश मात्रा का बाकी पानी भी अच्छी तरह से हिलाहिलाकर मिला लिजिए।

पुनः प्रवेश का समय : 24 घंटे

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ : छिड़काव तैयार करने के लिए खाना पकाने के बर्तनों का इस्तेमाल न करें। छिड़काव के घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करें। त्वां से स्पर्श से बचाने के लिए दस्ताने पहने। साँस के साथ अन्दर लेने और आँखों से सम्पर्क से भी बचें। छिड़काव करते समय सुरक्षात्मक कपड़े, मास्क वेश्मा, जूते आदी पहने व स्वयं को छिड़काव की फुहार से बचें। जोखम में मूँह से फूँक न मारें। उत्पाद को उठाने, रखने या प्रयोग करने के समय खाना पीना या धूम्रपान न करें। इस्तेमाल न किए गए घोल का संग्रह न करें। प्रतिदिन प्रयोग के बाद छिड़काव यंत्रों, बाँटियों व अन्य बर्तनों को पानी से अच्छी तरह धो लें।

विष के लक्षण: विष बाधा के लक्षणों में बेहोशी, दम घुटना और झुक कर बैठने जैसे लक्षण उभर सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा: यदि त्वां व आँखों में लग जाए तो तुरंत भरपूर पानी से धो डाले। अगर सास द्वारा ले लिया हो तो अच्छी, स्वच्छ हवा में ले जायें। अगर निगल लिया हो तो भरपूर पानी में चारकोल भरपूर मात्रा में दें। अगर अधिक मात्रा में निगला हो या तकलिय ज्वादा देर तक रहे तो तुरंत डाक्टर की उपाय करायें।

विषनाशक: कोई विशेष विषनाशक नहीं है। लक्षणनुसार इलाज करायें।

खाली डिब्बों का निपटारा: १. पर्यावरण प्रदूषण बचाव के लिये डिब्बे, बचा धोल, मशीनों की धोवन, खाली डिब्बों का निपटारा सुरक्षित स्थान पर करें। २. इस्तेमाल किये हुये खाली डिब्बों का दुबारा इस्तेमाल करना खतरनाक है। उपयोग किये गये डिब्बे, पैकेटों को कैसे ही बहर नहीं छोड़ना चाहिए इस प्रकार इनका दुसरा उपयोग बचाया जा सकता है। ३. पैकेटों, डिब्बों को तोड़-फोड़ कर आबादी से दूर फेंकना चाहिए।

संग्रहण की शर्तें: १. फफूंदीनाशक डिब्बों को अन्य सामग्री, विशेषकर खाने के सामान के संग्रहण के लिए प्रयोग किये जा रहे कमरों या इमारतों से दूर अलग कमरों या इमारतों में अथवा अलग से ताला बंद अलमारीयों में फफूंदीनाशक की प्रक्रिया और मात्रा के आधार पर रखना चाहिए। २. फफूंदीनाशकों के संग्रह हेतु उपयोग किये जाने वाले कमरे या इमारतें मजबूत, सूखी, भलीभांति प्रकाशित व हवादार होनी चाहिए ताकि वाष्प से प्रदूषण न हो सके।

वैश्यानी: १. लिफलेट और लेबल में सिफरिश किये हुये फसलों और किट के सिवा अन्य पर इस्तेमाल न करें। २. फसल कटाई के बाद किये जाने वाले अन्य उपचार में शामिल न करें। ३. इस्तेमाल के बाद डिब्बों को लिफलेट में दिये हुये तरीके से नष्ट करें। ४. पंजी लाइज और सिमिल क्षेत्र के लिये इस्तेमाल का तरीका और मात्रा के लिये लिफलेट पढ़ें।

वैश्यानी: लिफलेट और लेबल में सिफरिश किये हुये फसलों और किट के सिवा अन्य पर इस्तेमाल न करें। इस्तेमाल से पहले लिफलेट पढ़ें और समझ लें।

रासायनिक संरचना

डाइफेनोकोनाझोल (सक्रिय तत्व)	२५.०००% व/व
इमलसीफायर: केन्ट्रॉर आयल पॉलिंग्लायकोल इथर ३६-४०	१३.०००% व/व
डोडेसिल बेन्जीन सल्फोयिक एसिड,	२.०००% व/व
केसिलियम सॉल	१५.०००% व/व
सायक्लोहेक्सानोन	१५.०००% व/व
सॉल्वेंट सी-९	४५.०००% व/व
योग	१००.०००% भार/भार

INSTRUCTIONS FOR USE

DIFENOCONAZOLE 25% EC

BENBOW®

SYSTEMIC FUNGICIDE

डाइफेनोकोनाझोल 25 इ.सी. प्रतिशत

बेन्बो

अन्तर्प्रवाही फफूंदीनाशक

डाईफेनोकोनाझोल 25% ई.सी.

बेन्बो

अन्तर्प्रवाही फफूंदीनाशक

سرائیتی پھپھونڈش

Copyright ©, Trademark and all other Rights are Reserved by Godrej Agrovet Limited.

Manufactured & Marketed by: Godrej Agrovet Limited, Regd. Office : Godrej One, 3rd Floor, Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (East), Mumbai-400079, Maharashtra, India. Manufacturing Premises: **Godrej Agrovet Limited,** Lane No, 7, Indl. Growth Centre, Samba, Jammu-184121, J&K, India.

उत्पादक और विपणनकर्ता: गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड, रजि. ऑफिस: गोदरेज वन, तीसरी मंजिल, पिरोजशानगर, इस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, विक्रोली (पूर्व), मुंबई - ४०० ०७९, महाराष्ट्र, इंडिया। उत्पादन परिसर: गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड, लेन नं.७, इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, साम्बा, जम्मू-१८४१२१, जम्मू एन्ड कश्मीर।

In case of complaints, please contact our customer service executive at the Registered Office address of the Manufacturer and Marketer or email at gavilho@godrejagrovet.com or call us at 022-2519 4491. website: www.godrejagrovet.com

Caution : "Not to be used on Crops other than specified on this Label/Leaflet".

Regn. No. रजि. नं./
CIR-112520/2014-Difenoconazole(EC)(345)-17
Mfg. Lic. No. उ.ला.नं./ J/M-Pvt/25



Godrej agrovet
brighter farming

ડીફેનોકોનાઝોલ ૨૫% ઇ.સી.

બેઠબો
પ્રણાલીગત સુનાશક

આ રોક પ્રણાલીગત કૂળનાશક છે, જે સફટવજના પામા રોગ ને નિયંત્રીત કરે છે. એમાં ૨૫૦ ગ્રામ ડાઈફેલોકોગોલ ૧-૨-૪-૪ ક્લોરોડેફેનોક્સી ૨-ક્લોરોડેફેનોક્સી-૪ મેથિલ ૧, ૨ - ડાઈક્સોલાન ૨- વાલ ઇલ મેથિલ-૧ એપ૨, ૪-ટ્રાઇગલ ટટ્ટેક કિલોગ્રામના ઇમલસીફાયરલ કોન્સન્ટ્રેટ ઈ.સી. નું સંયોજન છે.

ଭିତ୍ତିଭାମଣ :

પ્રા.ક	સોનિયુન સંસ્થાના નામ	માસિક રૂ. હેઠળે રહેલું		પાછોડીની સંખ્યા (કોડી)	સોનિયુન પાછોડીના સાથે પાક કરાવેલ પાછોડીની સંખ્યા (કોડીઓમાં)
		૦-૧૦૦૦ (૫૦.૦૦ %)	૧૦૦૦-૧૫૦૦ (૫૦.૦૦ %)		
ડાંગર	સેલે બાબટર	૦.૦૪૯૫૨ % સરવાલ ૧૬.૩૫ ૨૦૦/૧૦૦૦૦ પાછી	૦.૦૦૦૧૧ % સરવાલ ૧૦૦ ૧૦૦૦ રૂ. સેલે/૧૦૦૦ ૧૦૦૦ રૂ. પાછી	૫૦૦-૧૦૦૦ (કોડીની સંખ્યા ખમણે)	૨૫
મરઘા	ડાંગરા મેલે, કોટ રોડ	—	—	૫૦૦	૧૫
સુશરદાન	પામરા	૦.૦૦૦૦૬ % સરવાલ ૩૩/૫૦૦૦૦ પાછી	૦.૦૦૪૯૫ % સરવાલ ૧૫૫/૧૦૦૦૦	કોડીની સંખ્યા તથા કોડીઓની સંખ્યામાં કોડી તુલ્યતા ઉપરથી કોડીમાં કોડી ઉપર સરવાલ કરેલ છે.	૧૪૮

વપરાશ અંગે નિર્દેશ: ઉત્પાદનને જોઈતી માત્રામાં લઈ થોડા પાણીમાં સારી રીતે ભેળવો, બાકી રહેલું પાણી નિર્દેશ પ્રમાણે ઉમેરીને, દ્રવણને પીઠ ઉપર લેવાતા ચંચર તથા ઊંચા વોલ્યુમવાળા ચંચ્રોમાં નાખી છંટકાવ કરો.

પુનઃપ્રવેશ અવધિ : ૨૪ કલાક

વાચારાકાસો માટે સાધનાઓનો : છેલ્લગુરુનું મિશન તૈયાર કરવા માટે ખાસગુરુ નાનાવાનાના વાચકોના ઉપયોગનો ન કરવો. મિશ્રણનો હાલાવા માટે મિશ્રણનો ઉપયોગ કરવો. વચ્ચાનો સંકટ દાવામાં માટે હાથ મોજા હેઢવા. વાચકાશ્રિ શ્રાસ દ્રાસાં અંદર ન જવ સેની સારવેરી લેવી. તેમજ આંખો સાથે સંકટ થવા ન દેવો. છેલ્લાક કરતાં વખતે સંવેશનાલનાં કાંકા, માકલ, ચમગા, મુઠી, હૂંકા અને છેલ્લાકનાં ફવાચરી પોતાનો ખાચા કરવો. નોઝામાં મોઝી પૂડેવા ન મારવી. ઉપચાલનનાં મુદ્દા, મુદ્દા અચવા ઉપયોગો કરવી વખતે ખાતું, પીડું કે કુચાખ ન કરવો. ન વાપરેલાં દ્રવાચોનો સંકટ ન કરવો. સ્વેચ્છા, વાચકોની નાની વાચકોના વાચાર્ણ પછી પાણીથી ચોખા કરવા. હાથ સાબુ અને પુકડા પાણી થી ઘોવા. કામ કર્વા પછી હેઢવાં કર્વાં નવવી નાંખવા અને સારી રીતે ઘોવા નાંખવા. વર્લેલાં દ્રવણોનો નિકાસ અચવા દ્રવાચ વાચકોના ઘોયેલા પાણી નો નિકાલ સ્વચ્છ કે વેલેતાં પાણીમાં ન કરવો.

મેરેનાં લેણો : નેનામ ચલુ, અચરચતા, વાંકાંવાળી બેસુવે જેવા વલણો હોશ શકે છે.

પ્રાથમિક સારવાર : જો ત્વરા તમજ આપીને સપક થયો હોય તો વધારે પાણીથી ઘોઘ નાંખવા, જો શ્વાસ દ્વારા અંદર ગયું હોય તો સ્વચ્છ હવામાં લઇ જવા, જો ગળી જવાયું હોય તો ભરપૂર પાણીમાં ચારકોલ ભરપૂર માત્રામાં આપો, જો વધારે માત્રામાં ગળી જવાયું હોય તો અથવા તડકડી વધારે સમય સુધી રહે તો તરતજ ઓક્સિજન સારવાર લેવી.

ઝેર નાશક : કોઈ વિશેષ ઝેરનાશક નથી, લક્ષણાનુસાર ઉપચાર કરવો.

માર્ગી ડબ્બાઓના નિકાલ : વ.પવાવરહા દુધાત ને ચાલત ને માટે ડબ્બા, વધુલુ દ્રવણ, મશીન ઘોડેલું પાણી એને માલી ડબ્બાઓનો નિકાલ સુરક્ષીત જગ્યાએ કરવો. ૨. વાપરેલાં ડબ્બા, પેકેટને એમજ બહાર ને રાખવા બેઠાએ, જેથી એનો ફરી ઉપયોગ ન થાય. ૩. પેકેટ તેમજ ડબ્બાઓ ને તોડી ને વસ્તીથી દૂર ફેંકવા.

સરનાથના પાત્ર : વૃજનાશનકા ડબ્બાજીના પાત્ર સામગ્રી ખાસ કરી કુળીયા પાતાનો સામળના સંકેત માટે વપરાતો ઓરડો છે મહાબલી પુજા દરમિયાન અથવા પ્રકાશનાં સંક્રવા જુદા દિવાળી ચાવીવાળા કળામતે કુળનાશનકની પ્રકીર્ણ એને માત્રાનાં આઠાદે સાપ્તવા જેવેએ.

સંકેત માટે નિયમ : વ.પ.ખાંધ પદાર્થો સંકેત હોય એ ઓરડી અને વગ્યા એનીથી દૂર દિવાળી ચાવીવાળા કળામતે માત્રા અને ગુણ દ્વાયાનાં લઈને સંકેત કલેવો. ૨. જે વગ્યા અથવા ઓરડીના કુળનાશક નો સંકેત કલવા માટે પસંદગી કરવામાં આવી હોય એ એકદમ મજબુત, સુકી, પ્રકાશવાળી, હવાવાળી અને લાંબી પહોળી હોવી જેવેએ જેથી એની વરાણી વાતાવરણમાંથી થવાનું યોગ્ય ન રહે.

ચેતાવણી : લીફલેટ માં નિર્દેશીત કરેલાં પાકો અને કીટકો શિવાચ બીજા પર એનો ઉપયોગ ન કરવો. ૨. પાક કાપ્યા પછી કરવામાં આવતાં બીજા ઉપચારમાં એનો સમાવેશ ન કરવો. ૩. વાપર્યા પછી ડબ્બાઓનો, લીફલેટમાં જણાવેલ રીતે નાશ કરવો. ૪. પૌલી હાઉસ અને મર્યાદિત ક્ષેત્રમાટે વાપરવાની રીત અને માત્રા માટે લીફલેટ વાંચો.

ચેતાવણી : લીફ્લેટમાં નિર્દેશીત કરેલાં પાકો અને કીટકો શિવાય બીજા પર એનો ઉપયોગ ન કરવો. વાપરવા પહેલાં લીફ્લેટ વાંચો અને સમજી લો.

રાસાયણીક સંયોજન

ਭਾਈਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਸਿਰਫ਼ ਟੱਪ)	₹ ੧,੦੦੦.੦੦ / ਵ/ਵ
ਫੰਮਿਲਿਅਕਾਰਜ: ਕੇਂਟਰ ਆਫ਼ ਪੋਲਿਟੀਕਲਜ਼ ਫਾਰ ੩੬.੪੦	₹ ੧੩,੦੦੦.੦੦ / ਵ/ਵ
ਕੋਟਿਸ਼ਾਹ ਯੋਜਨਾ ਸਟੁਡੀਓ ਕੋਸਿਸ,	
ਕੈਲਿਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ	₹ ੨,੦੦੦.੦੦ / ਵ/ਵ
ਸਾਥਕਰੋਏਕਸ਼ਨਾਨਾ	₹ ੧੧,੦੦੦.੦੦ / ਵ/ਵ
ਸਾਲਵੰਟ ਸੀ ਏ,	₹ ੪੧,੦੦੦.੦੦ / ਵ/ਵ
ਕੁਲ :	₹ ੧੦੦,੦੦੦.੦੦ (ਸਾ/ਸਾ)

डाइफेनोकोनाझोल 25 इ.सी. प्रतिशत

बेन्बो

अर्न्तप्रवाही बूरशीनाशक

हे एक अन्तःप्रवाही ब्रूश्रीनाशक आहे, जे सफरचंदाचा पामा रोग नियंत्रित करते. ह्या मध्ये २५० ग्रॅम डाईफेनोकोनाझोल १-२-४-४-क्लोरोफेनायसी २-क्लोरोफेनायसी -४ मधील १-२-डाईक्लोना २-क्लोना इल मधील १-९ एच, १,२,४- ट्रायझोल प्रति किलोग्रॅमचे डमलसीफायबल कॉन्सन्ट्रेंट पॉम्पट्रेशन आहे.

उपयोग :

रीक	रोगवेग	प्रति ईन्डेक्टर मात्रा	पाथोजेन मात्रा (सी.)	रोसाईटी संख्याएं/अन्य फलक अन्वेषण (रिपोर्ट)
	संवेदनशील मात्रा	सी. 1000 प्रति ईन्डेक्टर		
भाल	प्रति ईन्डेक्टर 0.01-0.05 प्रति किग्रा 12.5 सी. / 100 ली. पाण्यात	0.05 प्रति किग्रा 50 मिली. / 100 ली. पाण्यात	500-1000 (रोसाईटी संख्याएं अन्वेषण)	25
मिर्ची	ड्राय रॉट, फाय बॅक्टेरिया	वरिल प्रमाणे	500	15
साफरचंद	फाय रोग	0.0004 प्रति किग्रा 4 सी. / 100 ली. पाण्यात	0.015 प्रति किग्रा 15 मिली. / 100 ली. पाण्यात	रोसाईटी संख्या किंवा रोसाईटी संख्यांच्या पाण्यात उष्णता प्रमाणे 1000 अन्वेषण
				14

वापरसाठी सुचना : जरुदी प्रमाणे उत्पादनाची मात्रा घ्या, थोड्या पाण्यात चांगल्या प्रकारे मिसळा. पाठिवर घेऊन फवारणी करण्याचे यंत्र जे जास्त क्षमते चे असेल त्याचा उपयोग करण्यासाठी राहिलेले निर्देशित मात्रे मधील पाणी चांगल्या तऱ्हेनी हलवून मिसळा.

पूनः प्रवेश कालावधी: २४ तास.

वापर करणाऱ्यांशी सावधानी : फवारणी द्वय वापर करणाऱ्यांसाठी जेणे करणार्यांशी भंडी वापरू नका. फवारणी व द्रवण हलान्यासाठी लक्षादी कीटने उपयोग करा. त्वंशी संपर्क न होण्यासाठी तलामेजे वापरा. थ्यास दारें आत जाऊन वा डोक्यांशि संपर्क होणे टाळा. फवारणी करताना सुरक्षात्मक कापडे, मास्क, वध्मा, डूट पाल्यादि वापर करा शिवाय फवारणी करताना स्तनः लाला फवारण्या श्वाता पासुन सुचवा . नोझल म्हे तोंडाने फुकरा मारत नका. उत्पादनाला उपलताना, ठेवताना वा त्याचा वापर करतानां आउ, पिशू वा धुम्रपान करू नये. वापर न झालेंतं द्रवण साठवुन ठेऊ नका. प्रत्येक दिवशी वापरा नंतर फवारणी थेंपे. बादली वा अन्य भागांवातून स्वच्छ धवा.

विषबाधेची लक्षणे : विषबाधेची लक्षणे म्हणजे चक्कर येणे, दम लागणे, वाकुन बसणे इत्यादि दिसू शकतात.

પ્રાથમિક ચિકિત્સા જરૂર ત્વા કિંવા ડોક્યાંથી સંપર્ક ફાળ્યાસ ભરપૂર પાળ્યાને ધુવા, જરૂર શ્વાસ દ્વારે આત ગેલે અસલ્યાસ રોગ્યાલા સ્વચ્છ હવેત પેઠ્ઠા જા. જરૂર ગિઠલે ગેલે અસલ્યાસ ભરપૂર પાળ્યાત ભરપૂર ચારકોલ ઘાલુન પ્યાયલા ઘા. જરૂર ખાસ માત્રેત ગિઠલે ગેલે અસેલ આપિ બરાવ વેઠ્ઠ ગ્રાસ હોત અસેલ તર ડૉક્ટરી ડાસત કરા.

विषनाशक : काही विशेष विषनाशक नाही लक्षणानुसार उपाय करा.

रिकाग्या डब्याचा विल्हेवाट : १ पयारिणच प्रदुषण हाय्यापासुन बचाव करण्यासाठी डबे, राहिलेले द्रावण, मशिन धुतलेलेपाणी, रिकामे डबे इत्यादीची विल्हेवाट सुरक्षित जागेवर करा. २. वापरलेल्या रिकाग्या डब्याचा पुन्हा वापर करणे थोकादायक आहे. वापर झालेले डबे, पॉकेट अंशिच बाहेर सोडू नका, ह्यामुळे त्याचा पुन्हा हाणेर दुरुपयोग होणे टळेल. ३. पॉकेटस, डबे ह्याना तोडून फोडून वस्ती पासून लांब फेकणे जरूरी आहे.

साठवणीच्या अटी : १) बुरशीनाशकाचे डबे अन्य सामुग्री पासून विशेष करून खाण्याचे सामान ठेवण्यासाठी असणाऱ्या खोल्या वा इमारती पासून वेगळ्या खोलीत वा इमारती किंवा कडी कुलपाच्या कपाटात, बुरशीनाशकी तिव्रता आणि मात्रेनुसार ठेवणे आवश्यक आहे. २) बुरशीनाशक संग्रह करण्यासाठी वापरण्यात येणारी खोली वा इमारत मजबूत, सुखी आणि दहशिर होणे जरूरी आहे ज्या मळे उत्सर्जन मळे होणाऱ्या प्रदणत ठळे.

सुचना : १. लिफटेअर आणि लेवल मध्ये सुचीत केलेल्या पिक आणि किटकांच्या शिवाय अन्य वर ह्याचा वापर करू नये. २. पिक कापणी नंतर केलेल्या जाण्याच्या शिवाय योजन नंतर ह्याचा समावेश नसावा. ३. वापरानंतर डबे लिफटेअर मध्ये दिसल्या नुसार नष्ट करावे. ४. पॉली हाउस आणि सिमीत क्षेत्रासाठी वापरण्यासाठी व मागेसाठी लिफटेअर वावा. सुचना : लिफटेअर आणि लेवल मध्ये सुचीत केलेल्या पिक आणि किटकांच्या शिवाय अन्य वर ह्याचा वापर करू नये. वापरण्यापूर्वी लिफटेअर वाचा आणि समजून घ्या.

रासायनिक संरचना

डाइफ़ॅनोफोनाइल (संशुद्ध तत्व)	२५.०००% व/व
इमिल्सिफायर : केस्टर ऑयल पोलिग्लायकॉल इथर ३६-४०	१३.०००% व/व
डोडिसिलाल बैजीन सल्फोनिक एसिड,	
केलसियम सॉल्ट	२.०००% व/व
सायक्लोहेक्सानोन	१५.०००% व/व
साल्वेन टी-९	४५.०००% व/व
एकूण	१००.०००% भार/भार

ائفینو کو نازول 25% ای سے

بینو

سرائیتی پھپھوندکش

یہ ایک سرانقائی پھپھوندکش ہے جس میں بے سپیک کے اسکیپ جیسی بیماریوں سے خلاف لڑنے کی بہترین صلاحیت اس میں موجود ہے 250 ملی گرام ڈائفنیکوٹازول 1- [2- 4] کلوروفینکسی) 2- کلوفینا [4] میتھائل 1- ڈائیسیکسولان 2- واے 1- فارموفین [1]، 2، 4 نراژول فسی کیلوگرام ایملسیفائل کنسنٹریٹ (ای سی) فارمیولیٹن۔

پیشکش

فصلیں	پیریڈز کے عالم	مقدار فی ایکڑ		محصول (لیٹر) میں	آبی آرام (روزہ)
		۱۰۰ گالون	۱۰۰ گالون		
سیب	کرٹ	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
جڑ	واپس پینل جڑ	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
تعمیم	اسکیم	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

استعمال کی ہدایت : پروڈکٹ کی درکار مقدار کو حساب سے نکال لیں اور پانی کی تھوڑی سی مقدار میں اسے اچھی طرح ملا لیں، پانی والیوم اسپرٹریس کے نیپ سیک اسپرٹریس کے ذریعے پانی والیوم میں استعمال کیلئے اچھی طرح ایگنیٹیشن کے ساتھ وضاحت کردہ پانی کی باقی مقدار ملا لیں۔

دوبارہ داخل ہونے کا وقت: ۲۴ گھنٹے

[illegible]

ابتدائی تدارک : جلد اور آنکھ کے رابطے میں آجائے تو فوراً خوب پانی سے دھوئیں۔ اگر سانس کے ذریعے اندر چلا جائے تو تازہ ہوا میں چلے جائیں۔ اگر نگوں لیا جائے تو خوب پانی میں میڈیکل چارکول کی بھاری مقدار دیں۔ اگر کسٹرنیٹریٹ کی بھاری مقدار پیٹ میں چلی جائے اور اگر جھنجھاپٹ مستقل رہتی ہے تو طبی توجہ حاصل کریں۔

تدقیق: خوشی مخصوص ضیائی معلوم نہیں ہے۔ علامات کے مطابق علاج کریں۔

استعمال کردہ کنٹینر کو ضائع کرنا: 1. پیکبیجیز یا فاضل مادہ اور مشینوں سے نکلنے والی دھن کو ایسے محفوظ طریقے سے ضائع کرنا چاہئے کہ جس سے ماحول اور پانی کو آلودہ ہونے سے بچایا جائے۔ 2. استعمال کردہ پیکبیجیز کو ان کے دوبارہ استعمال سے بچانے کیلئے باہر نہ رکھ چھوڑیں۔ 3. پیکبیجیز کو آگ یا کسی اور طریقے سے تباہ کرنا چاہئے۔

ذخیرہ اندوزی کی شرائط : 1. پھپھوندکش کی موجودگی والے کیچیز کو دیگر چیزوں خاص طور سے کھاتے پینے کی چیزوں کو رکھے جانے والے کمرے یا مقامات سے دور رکھنا چاہیے تاکہ اس کا انحصار پھپھوندکش کی مقدار اور اس کی قسم پر نہ ہو۔ 2. پھپھوندکش رکھے جانے والے کمرے یا مقامات اچھی طرح تعمیر شدہ، ہوادار، روشن اور خوب کھلے کھلے اور وسیع و عریض ہونے چاہئیں تاکہ

انتباہ: 1. لیبل اور پرچے پر بتائی ہوئی فصول اور کیڑوں کے علاوہ دیگر فصول اور کیڑوں پر قابو کیلئے استعمال نہ کریں۔ 2. کٹائی کے بعد چھڑکائی کیلئے استعمال نہ کریں۔ 3. پرچے میں ہدایت کردہ کے مطابق استعمال کے بعد کنٹینر کو ضائع کریں۔ متعدد گھروں اور تنگ علاقوں میں چھڑکائی کی ہدایات اور مقدار کیلئے پرچے سے حوالہ لیں۔

انتباہ: 2. اس لیبل / پرچے میں بیان کردہ فصول کے علاوہ دیگر فصول پر استعمال نہ کریں۔ استعمال سے پرچے کو بڑھ اور سمجھ لیں۔

25.000% ایم / ایم	ڈائفریکو نازول ہے۔ آئی۔
13.000% ایم / ایم	بائی: ۰: ایمپلس فار سٹریٹس آئل پولی گلائیکول
2.000% ایم / ایم	ایچ 36-40
45.000% ایم / ایم	ڈوڈیکائل بیٹھین سلفو کی ایسڈ،
15.000% ایم / ایم	کیلشیم سالت
100.000% وزن / وزن	سالیوٹ سی 9
	سائیڈلو پیگسٹائٹ
	گٹل