Delete Pretilachlor 50% E.C. (Selective Herbicide)

Pretilachlor 50% EC is a selective pre-emergence broad spectrum herbicide for the control of annual grasses, sedges and broad leaved weeds in Transplant Rice. Recommendation:

Crop(s)		Dosa	ge/HA	Dilution	Traiting
	Name of the Pest	AI (g a.i./ ha)	Formu- lation (ml/ ha)	in water (Liter)	Period between last spray to harvest (days).
Trans- planted Rice	Echinochloa crusgalli, Echinochloa colonum, Cyperus difformis, Cyperus iria, Fimbristylis miliacea, Eclipta alba, Ludwigia parviflora,Leptochloa chinensis, Monochoria vaginalis, Panicum repens	500- 750	1000- 1500	500- 750	75-90

Re-entry Period: After 24 hours

Direction of Use: Measure out required of the product and mix it well with a small quantity of water as specified with thorough agitation for high volume application throught knapsack sprayer with flat fan/flood zet nozzle.

Time of Application: Within 5 days after transplanting. Weather Condition(in general): Do not spray during rainy,

windy and hot sunny period. Crop Stage for application: Apply as pre-emergence

tween 0-5 days after transplanting rice crop. Application Timing: Preferably in the morning and evening

Manner and Time of Application: Measure out the required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation. Adjust the quantity of product in proportion to the water required to cover a hectare and Apply as preemergence application between 0-5 days transplanting using a knapsack sprayer fitted with flat fan nozzle. Do not drain water from rice field after the application of this herbicide. Avoid flooding the field up to 24 hours after application.

Frequency: Apply as pre-emergence application between 0-5 days after transplanting. Maximum no. of applications is

Precaution: 1. Keep away from foodstuffs, empty food stuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eves and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist, spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying, 5. Do not smoke drink, eat and chew anything while spraying, 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Precautions shall be taken to avoid harm to the beneficial insects like honey bees and natural enemies of pests. Symptoms Of Poisoning: Headache, lethergy, giddiness,

nervousness, nausea, vomiting, may occur.

First Aid: 1 If swallowed induce vomiting by tickling the back of throat, repeat it until the vomitus is clear, do not induce vomiting if the nationt is unconscious 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. 5. Incase any sign of poisoning immediately consult the doctor

Antidote: No specific antidote is known. Treat

Disposal Of Used Container:1) The package shall be broken and burried away from inhabitation, 2) The used package shall not be left out side to prevent their re-use. The package or surplus material and washing should be water pollution

Storage Conditions:1) The packages containing the herbicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the herbicide. 2) The rooms or premises meant for storing the herbicide shall be well built dry, well-lit, and ated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition:

Pretilachlor a.i.	
(Min. purity 94% w/w a.i.)	50.00 % w/w
Emulsifing agent	
(ethoxylated vegetable oil)	4.4% w/w
Wetting agent	
(Alkyl aryl sulphonate of calcium salt)	3.6 % w/w
Stabilizer (Epoxidised vegetable oil)	3.00 % w/w
Solvent C-IX	Q.S. %
Total	100 000 % w/w

Warnings: 1. Not to be used on crops and pests other than mentioned on label/leaflet. 2. Not to be used for post harvest application, 3. Destroy Container after use as directed on leaflet. 4. Irritant to skin and eyes and hence, contact to Skin and eyes be avoided.5. Dangerous to re-use empty

डिलीट प्रेटिलाक्लोर ५० प्रतिशत ई.सी. (चयनात्मक खरपतवारनाशक)

पेटिलाक्लोर ५० प्रतिशत र्द सी एक चनिंदा खरपतवार नाशक है जिससे भार /भार के हिसाब से ५० प्रतिशत पेटिलाक्लोर है सी के रूप में मौजूद होता है। यह खरपतवार नाशक जो घास मोथा तथा चो.दे पने वाले खरपतवारों के निरांत्रा। तिए रोपित धान में रस्तेमाल किया जाता है।

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टे	यर मात्रा	पानी की	अन्तिम छिडकाव
		स.तत्त्व (ग्राम स.त. /है.)	संरचना (मि.ली/ है.)	मात्रा (लीटर/है.)	तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)
रोपित धान	सवांघास,सावन/दुजिया घास छत्रीवाला मोथा, वार्षिक मोथा,वोडाकोरा, भंगा, मुन्डावली लेपटोक्लोवा चायनैनसिस,नानका सनवाक (कनकी)	400- 040	9000- 9400	५००- ७५०	७५-९०

पनः प्रवेश अवधि: २४ घंटो के बाट।

खेत में पानी भरने से बचें।

उपयोग के लिए निर्देश: इसका उपयोग रोपाई के ५ दिन के भीतर (उगने से पूर्व) करना चाहिए। पहले उत्पाद की वांछित मात्रा, थोडे से पानी के साथ अच्छी तरह से मिलायें फिर उपर निदिष्ट मात्रा का बाकी पानी मिलाकर अच्छी तरह से मिलायें और नैपसेक स्पर्यर जिस पर फ्लैट फैन /फ्लूड जैट नोजल लगा हो। फिरकात करें।

प्रयोग का समय: रोपाई के बाद ५ दिन के अन्तर।

मौसम की स्थिति: बरसात, हवा और धप की अवधि के दौरान स्प्रे न करें। **आवेदन के लिए फर्मल चरण:** धान की फर्मल की रोपार्ड के 0-4 दिनों के

बीच उभ्दव पर्व आवेदन के रूप में आवेदन करें। **आवेदन का समय:** अधिमानत: सबह और शाम के समय।

आवेदन का तरीका और समय: उत्पाद की आवश्यक मात्रा मापें और इसे थोड़े मात्रा में पानी के साथ अच्छी तरह मिलाएं। निर्देष्ट अनुसार पानी की शेष मात्रा को अच्छी तरह हिलाकर डालें। एक हेक्टेयर को कवर करने के लिए आवश्यक पानी के अनुपात में जत्पाद की मात्रा को समायोजित करें और फ्लैट कैन नोजल के साथ लगे नैपसैक स्प्रेयर का उपयोग करके रोपाई के ०-५ दिनों के बीच प्रिइमर्जेस एप्लिकेशन के रूप में लागू करें। इस शाकनाशी के परागा के बाद धान के खेत से पानी न निकालें। आवेदन के 24 घंटे बाद तक

आवृत्तिः रोपाई के ०-५ दिनों के बीच पूर्व-उभ्द्रव आवेदन के रूप में लागू करें। अधिकतम संख्या अनुप्रयोगों में से एक है।

परागकर्ताओं के लिए सावधानियां- १ खाधसामगी खाध सामगी के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दुर रखें। २. मुंह, त्वचा और आंखों के संम्पर्क से बचायें। ३.छिडकाव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिडकाव करें। ४. छिडकाव के बाद दृषित कपडों और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। ५. छिडकाव के समय धुमुपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६ .छिडकाव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे

शहद की मक्खियों और कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं जैसे लाभकारी कीडों से नुकसान से बचाने के लिए बरती जाने वाली सावधानियां

विष के लक्षण: सिरदर्द, सुस्ती, उल्टी, घबराहट, चक्कर आना हो सकते है। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करारों यह किया तब तक टोहराते रहे जब तक उल्ली दारा निकला पटार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्ही न करायें। २ यदि कपड़े और त्वचा दिषत हो जाए तो कपड़ें उतार दे और दिषत त्वचा को काफी मात्रा में साबन और गनी से धोएं। ३. यदि आँखें दिषत हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन / साफ पानी से लगभग १०–१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जाए। ५. विषाक्तता का कोई भी लक्षण दिखने पर तरंत डॉक्टर से सलाह लें।

विष नाशक: कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणाअनसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा: १.खाली डिब्बों को उपयोग के बाद तोड फोड कर आबादी से दर जमीन में गांड दें। २. उपयोग के बाद खाली डिब्बों को दबारा उपयोग में लाने के लिए बाहर खुला न छोड़े।३. बची हुई खरपतवारनाशक, साधनों के धोवन का योग्य रीति से निपटारा करना चाहिए जिससे पीने का पानी तथा वातावरण दिषत होने का डर न रहे।

संग्रहण की शर्ते: १ खरपतवारनाशक के पैकेटों को अलग कमरों अथवा जगहों में रखे जाने वाले कमरों अथवा जगहों से अलग अलग अलमारियों में ताला चाबी के अन्दर रखना चाहिए। २. जिस कमरे अथवा जगह में खरपतवारनाशक का भंडार करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा हवादार तथा प्रकाश युक्त व काफी लम्बा चौडा होना चाहिए जिससे खरपतवारनाशक की भाप से वातावरण दिषत न होने पाए।

रासायनिक संरचना^{.°}

प्राटलाक्षार साक्रय परव		
(९४ प्रति टेक्नीकल शुद्धता पर आधारित)	५०.००%भार/भार	
इमल्सीफाइग एजेन्ट		
(एथोक्सिलेटेड वेजिटेबिल ऑयल	४.४%भार/भार	
सरफेक्टेन्ट/वेटिंग एजेन्ट		
(एल्काइल एरियल सल्फोनेट आफ केल्शियम साल्ट	३.६%भार/भार	
स्टेबलाईजर		
(इपोक्साईड वेजिटेबल आयल	३.००%भार/भार	
घोलक-सी-९ प	र्याप्त मात्रा%भार/भार	
<u> </u>	0///	

चेतावनी: १. लेबल / लीफलेट में दी गई फसलों के अलावा अन्य फसलों पर दयका उपयोग करना मना है। २ फ्यून काटने के बाद दयका उपयोग न करें। 3. पर्ची पर निर्दिष्टउल्लेख के अनुसार उपयोग के बाद कंटेनर को नष्टकर दें। ४. यह उत्पाद त्वचा तथा आंखों के लिए उत्तेजक है, इसलिए आंखों तथा त्वचा को सम्पर्क से बचायें। ५. खाली डिब्बों को दुबारा उपयोग करना खतरनाक है।

डिलीट फेटिलाक्लोर ५०% ई.सी. (निवडक तणनाशक)

प्रेटिलाक्लोर ५०% ई.सी एक उगवणीपवींचे व्यापक प्रभावी तणनाशक असन ते वार्षित गवत, सेजेस आणि रुंद पानांच्या तणांसाठी खुपच परिणामकारक आहे.

पीक	तणांचे	3	प्रमाण/हेक्त	टर	शेवटची फवारणी
	सामान्य	स. त.	द्रावण	सौम्य	ते काढणी/
	नाव	(ग्रॅ.)	(मि.लि.)		
				साठी	वाट पहाण्याचा
				पाणी	कालावधि
				(लि.)	(दिवसात)
पूर्नरोपित	इचिनोक्लोवा क्रुसगली	400-	9000-	400-	७५ – ९०
भात	इचिनोक्लोवा कोलोनम,	७५०	9400	940	
	सायप्रस डिफॉरमिस,				
	सायप्रस इरिया,				
	फिम्ब्रीस्टलीस				
	मिलीआसिया, इक्लिप्टा				
	अल्बा, लूडविगिया				
	पुलविफ्लोरा,				
	लॅप्टोक्लोहा चिन्हसिस,				
	मोनो कोहोर, वॅगीनालिस,				
	पॅनिकम रिपेन्स				

पुन: प्रवेश कालावधी: २४ तासांनंतर

वापरासाती निर्देश - पाण्याचे पमाण फवारणी यंत्रावर अवलंबन असते नॅपसॅक स्पेयर कम्प्रेशन नॅप्पर्येक स्पेरार फलॅट फॅन आणि फलड जेट नोडाल ब्रंपरिलेले कम्प्रेशन नॅपर्येक

फवारणीची वेळ • पर्नेरोपणीनंतर ५ दिवसांत

हवामानाची स्थिती (सर्वसाधारणपणे): पावसाळी, वादळी आणि कडक उन्हात फवारणी करू

फवारणीसाठी पीकाची अवस्था: उगवणी पूर्व म्हणून फवारणी करा भाताची लावणी केल्यानंतर ० ५ दिवसांच्या दरम्यान फवारणी करा

फवारणी करण्याची वेळ · शक्यतो सकाळी आणि संध्याकाळच्या वेळी

फवारणी करण्याची पद्धत आणि वेक • आवश्यकतेचे मोजमाप करा उत्पादनानी पाना थाणि शोरण प्रणापत ते पाएण स्रोबत राजस्थित प्रिसन्त उरलेल्या पाण्याचे प्रमाण सांगितल्याप्रमाणे पर्ण पणे हलवन उरलेल्या मात्रा मधे टाकावे डेक्टर श्रेनासाठी आवश्यक असलेल्या पाएयाच्या प्रमाणात उत्पादनाचे प्रमाण समायोजित करा आणि फ्लॅट फॅन नोजलसह बसवलेले नॅपसॅक स्प्रेअर वापरून लावणी केल्यानंतर ० ५ दिवसांच्या दरम्यान सगवणी पर्व म्हणन फवारणी करा. फवारणी केल्यानंतर भाताच्या शेतातील पाणी काढन टाक नका. या तणनाशकाची फवारणी केल्यानंतर २४ तासांपर्यंत शेतात पाणी भरु देवू नये.

वारंवास्ता: उगवणी पर्व फवारणी म्हणन फवारणी करा. लावणीच्या ०.५ टिव्यांची फवारणीची अधिकतम् संस्था एक आहे

खबरदारी: १) अन्नपदार्थ अन्नपदार्थांचे रिकामे डब्रे आणि जनावरांच्या चाऱ्यापासन दर वेवा. २) तोंड, डोळे आणि त्वचेशी संपर्क होवू देवू नका. ३) फवारणीचे तुषार श्वांस आत जांवू देवू नका. वाऱ्याच्या दिशेनेच फवारणी करा. ४) संपर्कांत आलेले कपडे आणि शरीराचा भाग फवारणी नंतर स्वच्छ ध्वा. ५) फवारणी करताना काहीही खावू, पिवू, चघळू आणि धमुपान करू नये. ६) ह्याचे मिश्रण बनविताना आणि फवारणी करताना संपर्ण सरक्षित

फायदेशीर कीटक जसे की मधमाश्या आणि कीटकांचे नैसर्गिक शत्र यांचे नकसान टाळण्यासाती ध्यावयाची खबरदारी

विषबाधेची लक्षणे: डोके दुखणे, सुस्ती, चक्कर येणे, अस्वस्थता, मळमळ, उल्टी अशी

प्रथमोपचार: १) जर गिळले गेले तर, गळ्यापाठी गुदगुली करून उल्टी करवावी. हीच क्रिया तो पर्यंत करीत रहावी जो पर्यंत उल्टी द्वारे निघालेला पदार्थ साफ होईल. जर रूग्ण बेशद्ध असेल तर उल्टी करवू नये. २) जर कपडे आणि त्वचा दूषित झाली तर कपडे काढा व दूषित त्वचा भरपूर साबण आणि पाण्याने धूवा. ३) जर डोळे दूषित झाले तर, त्यांना भरपूर प्रमाणात सलाइन/स्वच्छ पाण्याने जवळ-जवळ १०–१५ मिनिटे धुवा. ४) जर श्वासाद्वारे आत गेले तर, रूग्णास शद्ध हवेत आणा. ५) विषबाधाची कोणतीही चिन्हे आढळल्यास, ताबडतोब डॉक्टरचा सल्ला घ्या

विषोपचार: कोणताही खास उपचार माहीत नाहीत. लक्षणानुसार उपचार करा. वापरलेल्या डब्यांची विल्हेवाट: १) रिकामी डबे वापरानंतर मोडन-तोडन मनुष्य वस्तीपासन दूर जिमनीत पूरा. २) वापरानंतर रिकामी डबे बाहेर उघड्यावर सोड्र नयेत जेणे करून त्यांचा पुर्नवापर होणार नाही. ३) पॅकेजिस व उरलेले साहीत्य आणि धवणाचे पाणी ह्यांची विल्हेवाट

अशा सरक्षित प्रकारे लावावी जेणे करून पर्यांवरण वा पाणी प्रदृषित होणार नाही. साठवणीची स्थिती: १) हे साहित्य असणारी पॅकेजिस इतर माल ठेवण्यासाठी असलेल्या जागा वा खोल्या यापासून विशेषतः अन्नपदार्थ ठेवण्यासाठी असलेल्या जागा वा खोल्या यापासन दर जागी वा खोल्यात किंवा साहित्याचा दर्जा व स्वरूप यांचा विचार करून कपाटात कडीकुलपात ठेवावीत. २) हे साहित्य साठा करून ठेवण्याची जागा उत्तम बांधणीची कोरडी, हवा खेळती राहणारी भरपर उजेडाची व परेशी मोठी असावी, त्यामळे वाफांनी

रासायनिक संरचना

मेटिलाक्लोर स.त.	:	५०.०००% व/व
(न्यून. शुद्धता ९४% व/व स.त.)		
इमल्सिफाइंग एजन्ट (इथॉक्सिलेटेड वेजीटेबल ऑइल)	:	४.४००% व/व
वेटिंग एजन्ट (अल्केल अरेल सल्फोनेट	:	३.६००% व/व
ऑफ कॅल्शियम सॉल्ट)		
स्टेबीलाइझर (इपॉक्सीडाइज वेजीटेबल ऑइल)	:	३.०००% व/व
मॉलवन्ट सी−९	: पूरेसे	प्रमाण बनविण्यासाठी
<i>र्</i> कूण	:	१००,०००% व/व

चेतावणी: १. लेबल और पत्रक पर जो वर्णित है. उससे भिन्न फसल और नाशकजीव पर उपयोग के लिए नहीं। २. कटाई के बाद के उपयोग के लिएउ उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।३. पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात आदयान को नष्ट करें। ४.उत्पादन त्वेवर आणि डोळ्यांना त्रासदायक आहे, म्हणनच त्वचेचा आणि डोळ्यांचा संपर्क टाळला पाहिजे ५ रिकामी द्रहे पन्हा

ડિલીટ યેટિલાકલોર ૫૦% ઈસી (युनंड् नींड्लानाशड)

પ્રેરિલાકલોર ૫૦% ઈ.સી., વાર્ષિક ઘાસો, હર્ફ્સ તથા પહોળાં પાંઠડાંવાળાં નીંઠાનો સામે ઉત્ફર્સ્ટ કિયા ધરાવવું યસંદગીકારક, બહુગુણી નીંદણનાશક છે.

યાક	નીંદણોનું		ଧ୍ୟାତା/ <u></u> ଶ୍ୱ	છેલ્લા	
(યાકો)	सामान्य नाम	ਲ.ਬ. (ਗ਼ਮ)	સ્થના (મિ.લી.)	મંદ કરવા માટે યાણી (લી.)	ઇંટકાવ અને લણણી વચ્ચે પ્રતીક્ષાનો ગાળો (દિવસોમાં)
ફેર- રોપણી કરેલી ડાંગર	સામો, બંટ, ચીઢો, દીદેચું, ચોટાલીચું, ભાંગરો, હીંલી, બંહ્ટી, પીલિકમ લાદી સોલોડીઆ, લગવીગીઆ	000- ЭЦО	१०००- १८००	цоо- эцо	૭૫ - ૯૦

પનઃયવેશ સમયગાળોઃ ૨૪ કલાક પછી

. **ઉપયોગની સચના:** પાાગીના પસાાગનો આધાર સ્પેયરના પદાર ઉપર છે. નેંપસંદ સ્પેયર કૉમ્પ્રેશન નેપાસેંક સ્પ્રેયર, કૉમ્પ્રેશન નેપાસેંક પાવર સ્પ્રેયર, કૉમ્પ્રેશન નેપાસેંક બેંટરી સ્પ્રેયર્ટ बेमां इतंट इंग भगे इतंड बेट गोअस पेसाडेल्ं होय.

ઉપયોગનો સમયઃ કેરરોયાણી પછી પ દિવસની અંદર.

હવામાનની સ્થિતિ (સામાન્ય): વસ્ત્રાદ રાવન અને ગરમીના સમરાગાળામાં ભેરકાવ

ต่อรเด มเล้าขนรดม ดิงรณ: รม่อยคม ขนรด์ไ ย้านาอีโ ขายใ ด-ข โรดย વચ્ચે ઊભરવા પૂર્વે છંટકાવ તરીકે ઉપયોગ કરવો જોઈ'એ.

છંટકાવતી રીત અતે સમય: આવશ્યક માત્રામાં ઉત્પાદન લો અને શોર્ડ માત્રામાં યાણી સાથે સારી રીતે હલાવો. સતત હલાવતા રહી હવે બાકી યાણીની માત્રા યણ ઉમેરી હો. એક હેક્ટરને આવરી લેવા માટે આવશ્ચક याागीना यभागमां उत्याहननी भाग सभागोबित हरो सने हतेर हेन नोऊतथी डिट हरेला नेपसेह स्प्रेयरनो ઉपयोग हरीने रोपाणी पर्छी ०-प હિવસ વચ્ચે ઊભરવા- પૂર્વે છંટકાવ તરીકે છંટકાવ કરો. આ નિંહણનાશકન છંટકાવ યછી ડાંગરના એેવરમાંથી યાાગી નિવારશો નહીં. છંટકાવ યછી ૨૪ કલાક સધી એવરમાં પર નહીં આવે તેને ધ્યાન રાખો.

ભાવત્થવાઃ રોયાગી યછી ૦-૫ દિવસે ઊભરવા પર્વે છંટકાવ તરીકે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. મહત્તમ છેટકાવની સંખ્યા એક છે

સાવચેતીઓ: ૧) ખાદાયહાર્થો, ખાદા યહાર્થોના ખાલી યાત્રો અને પશુઆહારથી દૂર રાખો ર) મોં, આંબો અને ત્વયાથી દુર રાખો. ૩) છંટકાવનું ધુમ્મસ શ્વાસમાં લેવાનું ટાળો. นน์ดด์ โธยาล่า ฮ่ะราน ระโ. ช้ โ ฮ่ะราน รัสโ นซ์โ ธุ์นิด ขลัตา์ ธนร์ ผล้ ยะใยดา ભાગો સંપૂર્ણ ધોઈ નાંખો. ય ે છાંટતી વખતે ધૂસપાન ન કરો, કંઈપણ પીઓ, ખાઓ અને યાવો નહીં. ૬) મિશ્રણ કરતી અને છાંટતી વખતે સંયૂર્ણ રક્ષણકારક કયકાં યહેરો.

મધમાખીઓ અને જંતુના નૈસર્ગિક શત્રુઓ જેવા લાભદાયી જંતુઓને હાનિ ટાળવા માટે નેવાથી ક્ષાવકૃપીઓ જેર યહ્યાનાં લક્ષણો: માથાનો દુખાવો, સરતી, યક્કર, ઢીલાશ, ઉબકા, ઉલટી થઈ

યા**થમિક સારવારઃ** ૧) જો ગળવામાં આવે, તો ગળામાં આંગળાં નાંખી ઉલટી કરાવો. જ્યાં સધી ઉલટીને પૂર્વાદી સાફ ન આવે ત્યાં સધી આમ કરતા રહો. જો હરદી બેભાન હોય, તો ઉલટી કરાવવા પ્રયાસ ન કરો. ર)દૂષિત થયેલાં કપડાં કાઢી નાંખો અને દૂષિત થયેલી ત્વથા યુષ્કળ યાણી અને સાબુવર્ડ ધોઈ નાંખો ૩) ને આંખો દૂષિત થવા ્રામે, તો આશરે ૧૦ થી ૧૫ મિનિટ સુધી પ્રષ્કળ મીઠાના/ચોંગ્ઝન યાણી વેડે છાલક મારીને ધુઓ. ૪) પેટમાં ગયું હોતો, હરહીને તાજી હવામાં ખસેડો.૫) જો ઝેરનાં કોઈ

ઝેટનું મારણઃ કોઈ યોક્કસ મારણ જાણમાં નથી. લક્ષણો અનુસાર સારવાર આયો. પાત્રોનો નિકાલઃ ૧ે પૅકેજીસ ભાંગી નાંખવાં અને વસતીથી હર હાટી દેવાં. ર) વપરાચેલાં પૅકેજીસ તેમનો ફરીથી ઉપયોગ થતો અટકાવવા માટે બહાર રાખવાં નહીં. 3 ે પૅકેન્ટ્રસ અથવા વધારાની સામગ્રી અને ધોવાાગોનો એવી સલામત રીતમાં નિકાલ કરવો જેથી પર્યાવરણીય અથવા જળપ્રદૂષણ થવું અટકે.

ચિહ્ન દેખાય તો તુરંત ડોક્ટરની સલાહ લો.

ומובר שלווצובו

સંગ્રહઃ ૧) નીંહણનાશક ધરાવતાં પૅકેજીસ બીજી ચીજવસ્ત્વઓ સંગ્રહવા માટે વપરાતા ઓરડા અર્થવા જગ્યાથી હર અલગ જગ્યા અથવા ઓરડામાં સંગ્રહવાં અથવા નીંહણનાશકના જશ્યા અને પ્રકાર ઉપર આધાર રાખીને અલગ કબાટોમાં તાળાંચાવીમાં બંધ કરીને રાખવાં. ર ો નીંદણનાશક સંગ્રહવા માટેના ઓરડા અથવા જગ્યા સારી બાંધણીનાં, સૂકાં, સારો પ્રકાશ ધરાવતાં અને પુરતી મોકળાશ ધરાવતાં હોવાં જોઈએ જેથી વરાળથી દૃષ્ટિત થવાનું ટાળી 위되기

cidialisio casii.				
પ્રેટિલાક્લોર સ.ઘ.	(अधिम श्रेष्ट्रा ६४%व/व अ.ध.)	:	U0.000% 4/4	
ઈમલ્સિફાઇંગ એજન્ટ	(ઇથોક્સિલેટેડ વનસ્પતિ તેલ)	:	V.Y00% 4/4	
લકીઇ ડર્સ્ટક્રિલ	(કૅલ્સિયમ સૉલ્ટનું અલ્કાઈલ			
એજન્ટ	નારાઇલ સલ્ફોનેટ)	:	3.500% 4/4	
ક્ટેબિલાઈઝર	(એયોક્સિડાઇઝડ વનસ્પતિ તેલ)	:	3.000% 4/4	
કોલ્વન્ટ સી-૯	પૂરતું પ્રમાણ જેથી બને			

चेतवार्शी : १. आ यत्रह अने लीइलेट यर ઉल्लेफ सिवायना याह अने જંતુઓ પર ઉપયોગ નહીં કરવું જોઈએ, ર. લણાણી પશ્ચાત છંટકાવ માટે ઉપયોગ નહીં કરવો જોઈએ. ૩. ૫ત્રક પર નિર્દેશ અનુસાર ઉપયોગ પછી કન્ટેઈ નરનો નાશ કરો. ૪.આ ત્વયા અને આંખોમાં બળતરા પેઠા કરી શકે છે, આની ત્વયા અને આંખોને સ્પર્શે નહીં તેની કાળજી લેવી**. ય. ખાલી** કન્ટેઈ નર ઉપયોગ કરવાનું અતરનાક છે.

డిలీట్ పెటిలాకోర్ 50% ఇసి (కలుపు మొక్కల నాశని)

(పెటిలాకోరో 50% ఇ.సి. అనేది విపుత చర్చగల కలుపునాశని. ఇది వారిక గడిజాతి, తుంగజాతి కలుపు ຮາດນອງ ໝ່ຽວໝາ ລີຂອງພີ ఆຮາຍາກອ ຮອນລົງ ລີນຮຸ້ງຍາ ລີນອດຮຽນນວດີ ສາພິດ ລີດນາຍືວລີ ెంసిక చేయబడిన కలుపునాశని.

పంట	కలుపుపు	್ ಪ	క్వారుకు మోతా!	చివరి ప్రే మండి కోత	
	సామాస్తంగా	ప.ప.	సూత్రీకరణ	కరిగించుటకు	కాలం పరకు పేవి
	పిలివే పేరు	(గ్రాముల్తో)	(మి.లీ.లలో)	వీరు	పుండాల్సిన సమయం
		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	<u> </u>	<u> లీటర్లలో</u>	(ව්සචූ
నాటబడిన	తేంద	500-750	1000-1500	500-750	75-90
పరి	దొంగపరి				
	బ్రహ్మతుంగ				
	నీటి తుంగ				
	ರ್ತಾ∛ ಕುಂಗ				
	గుంట గలిజేరు				
	ఉడ్విగా పుర్విస్టోరా				
	రిప్రోక్షోవా				
	చిన్న గుర్రపుడెక్క				
	SONG				

తిరిగి సమేశక్తు పచిచి: 24 గంటల తరాంక

వాడులకు మాచనలు: దీన్ని కలుపుకోడానికి వాడాల్సిన నీరు వాడే పిచికారి పరికరాని,బటి ఆధారపడి పుంటుంది. పోతే, వ్యాప్స్ స్టాయర్, కంస్ట్రాఫ్ స్టాప్స్ స్ట్రీయర్ మరియు ఫ్ల్వాట్ ఫ్యాప్ మరియు ఫ్లడ్జెట్ నాజిల్ బిగించబడిన కంస్తిషన్ వ్యాపేస్తాక్ బ్యాటరీ స్ప్రేయర్లను వాడవచ్చు. వాడే సమయము: నాటు వేసిన 5 రోజులు లోపలే.

బాతావరణ పరిస్థితులు (సాధారణంగా) : వర్గంపడేటప్పుడు మరియు బాగా గాలిసీపే సమయంలోనూ అలాగా ఎండ్ తీవ్రత ఎక్కువగా మన్నప్పుడు దీన్ని సిచికారిపేయరాదు.

దీన్సి వాడుటకు అనుపైన పంట దశ: వరి నాట్లు వేసిన తర్వాత,0–5 రోజుల మధ్యలో ఎమరెస్ (కలుపుమొక లు మొలవకముందే) నాడకంగా స్పేచేసుకోనాలి వాడాలిన సమయం: పీలెనంతవరకూ ఉదయం పూట లేదా సాయంకాల వేళలలోనే

నాడాల్లిన విదానము మరియు సమయము : కానల్లినంత పరిమాణంలో ఈ ້ ຮຸບກ່າວກາສຸຄຸຄຸ ລາຕິດນາ ຄໍຄຸຄ ຮູບຄຸຄາ ລີລີ ຄູ່ສາຮູ້ລາຄູ ఈ ຮຸບກ່າວກາສຸຄຸຮູ້ ຮູບຄຸກ ్ద్రీ పీరు కలిపి బాగా కలియపెట్టి చిక్కని ద్రావకాన్ని తయారుచేసుకోవాలి.దానిలో మిగల సీటి పరిమాణాన్ని కూడా పోసీ బాగా కలియబెట్లుకోవాలి. ఒక హెక్టారుకు ఎంట పరిమాణంలో దావకం అవసరమవుతుందో చూసుకొబ ఈ ఉత్పాదన మరియు బీటి పరిమాణాలను సర్మబాటు చేసుకుంటూ, ఈ కలుపునాశనిని వరి నాట్లువాసిన తర్వాత 0-5 రోజుల మధ్మలో దీస్మి [ప్ ఎమర్జెస్స్ (కలుపుమొక్కలు మొలవకముందే) వాడకంగా, ఫ్రేట్ ప్లాన్నాజిల్ బిగించబడిన న్యాప్ఫ్యాక్ స్పేయర్ తో పివికారి చేసుకోవాలి. ఈ కలువునాశనిని స్ట్రీ చేసుకున్న సమయంలో వరి పాలంలోనున్న నీటిని బయటకు వొదలరాదు మరియు , దీన్ని పేచికారి చేసుకున్న 24

గంటల వరకూ పాలంలో నీరు పెట్టరాదన్న విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి. ఎన్ని తడవలు వాడాలి: ఈ కలుపునాశనిని స్ట్రీఎమిర్గెస్స్ వాడకంగా వరి నాట్లు వేసిన తర్వత,0-5 రోజుల మధ్యలో వాడాలి.గరిష్టంగా ఒకసారి కంటే ఎక్కువ సార్లు వాడాలిన అవసరతమండదు

ముందు జాగ్రత్తలు: 1. ఆహార పదార్వాలు, ఖాళీ వంట సామగ్రి మరియు పశువుల దాణాలకు, మేతకు దూరంగా దీన్ని పుంచండి. 2. దీన్ని నోటికి, చర్మానికి అంటకుండా, కళ్ళలో పడకుండా జాగత్ర మొంచాలి. 3. (ప్రే ద్రావకపు పాగమంచును పీల్చరాదు. పిచికారిని గాలివాటం చూసుకొనే పివికారి చేసుకోవాలి. 4. కలుషితమైన బట్టల్ని, శరీరాన్ని శుభంగా కడుక్కోవాలి. 5. దీన్ని పివికారి చేసుకొనేటప్పుడు ఏదైనా తివడం, పాగ పీల్పడం, పాగాకు నమండం లాంటి పమలేమీ చేయరాదు. 6. మిశ్రమాన్ని కలుపుకునేటప్పుడు మరియు పివికారి చేసుకునేటప్పుడు పూర్తిగా రక్షత దుస్తుల్పి

పంటలకు స్పేహపూర్వకమైన తేనెటీగలు, మరియు ద్రకృతిసిద్ధంగా కీటకాలకు శక్రుపులైన కేటకాలకు హాని కలుగకుండా ముందుజాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.

విషంక్షణాలు: తలనోప్పి, నీరసం, తలతిరగడం, వరాల బలహీనత, వికారము, వాంతులవడం, ఇలాంటివి

డ్రుడ్డు వికిత్ప: 1. ఒకవేళ మింగినట్టయితే, వాంతి పేయించరాదు లేదా నోటిద్వారా ఏరైనా ద్రవసదార్థం ఇవ్వరాదు. 2. బట్టలు మరియు చర్మం కలుషిత్రమైతే బట్టల్ని తీసివేసి పెంటనే సబ్బు వాడుతూ శుభంగా స్వావం చేయాలి. 3. ఒకవేళ ఇది కర్నలో పడితే మామూలు సెలైవ్ వాటర్ను 10 మంచి 15 నిమిషాల వరకూ కళ్ళలో కొట్టుకుంటూ శుభ్రపర్సుకోవాలి. 4. ఒకవేళ లోనికి పీల్చినట్లయితే, పెంటనే రోగిని ఆరుబయటకు తరలించాలి.5.ఒకవేళ రోగికి విషప్పారితమైన లక్షణాలేవైనావుంటే, వెంటనే డాకర్గారి. సంపదించాలి.

విరుగుడు: సరేంకించి పలానా విరుగుడు ఏమీలేదు. విపలకణాలనుబటి చికితం జరిసించాలి. ఖాళీ డబ్బాలు పారవేయు విధానము: 1) ఈ స్వాకేజీలను సగులకొట్టి, మనుష్మ సంచారానికి దూరంగా పాతిపెట్టాలి. 2) ఖాళీ ప్యాకేజీలను తిరిగి ఏవిధంగానూ వాడరాదు గనుక వాటీనలా బయట వదిలేయరాదు. 3) స్వాకేజీలు, మిగిలిపోయిన మందును, పరికరాలు కడుగగా వచ్చిన వీటిని కడుజాగ్రత్త వహిస్తూ అంటే పరిసరాలు, వీరు కలుపీతం కాకుండా పారవేసుకోవాలి.

విల్వ: 1) ఈ కలుపువాశవిగల స్వాకేజీలను యితర పదార్ధాలు విల్వ చేసే గదులు లేదా ಆವರಣಂಠೆಗ್ ತುಂಡ್ ವೆರುನೆರುಗ್ ಶಾಟಿ ಯುತ್ತು ಪರಿಮಣಮು ಮರಿಯು ನಾಜಾನ್ನಿಬಟ್ಟಿ ವೆರುನೆರು ఆలమారాలలో పెట్టి తాళం వేసి బిగించి మాత్రమే నిల్వ చేయాలి. 2) ఈ కలుపునాశనిని నిల్వ చేసే గదులు లేదా ఆవరణలు గట్టి కట్టడములై, పాడిగా, మంచి గాలీ, పెలుతురు ద్రవరించేలా, విశాలంగా వుండాలి. తదానా దీని ఆవిరివలన పరిసరాలు కలుపితంకావు.

on one more			
ప్రెటిలాక్టోర్ స.ప.	(కవీస శుద్ధత 94% బ/బ స.ప.)	50.000%	ත/ත
ఎమల్పిఫయింగ్ ఏజెంట్	(ఎథోగ్జిలేటెడ్ పెజిటబుల్ ఆయిల్)	4.400%	బ/బ
పెట్టింగ్ ఏజెంట్	(පවු,ව් පවුව් තවාරීඩ් පරි පමුගා එවු්)	3.600%	బ/బ
දි.එචුසර්	(ఎపోక్బిడైజ్డ్ పెజిటబుల్ ఆయిల్)	3.000%	ත/ත
పాల్వెంట్ C-IX	తయారీకి చాలిసంత		
3,,,%,		100.000%	ra /ra

హెచ్చరిక: 1. ఇందివ్వబడిన లేబుల్ లేదా కరప్రతంలో సూచించబడిన పంటలకు చ్చి బరియు వాటినాశించే క్రిమికీటకాదులకు తప్ప, మరే ఇతర పంటలకు మరియు క్రిమికీటకాదులకు దీన్ని వాడరాదు. 2. దీన్ని కోతకాలం తర్వాత వాడకంగా మాత్రం వాడగారు. 3. కగపుతంలో మాచించబడిన చిరంగా ఖాలీ డబాలను పగులకొటి నాశనం చేయాలి. 4. ఈ ఉత్పాదన చర్యానికి మరియు కళ్ళకు బాగా ఇబ్బంట ంది గనుక చర్మానికి మరియు కళ్ళకు అంటకుండా కాపాడుకోవాలి 5 అనేది మిక్కిలి బ్రమాదకరమైనది గుర్తించాలి.

હિલ્**ી**લ્ફ્રફ ಪ್ಪೆಟಲಾಕೋರ್ 50% ಇಸಿ (ಆಯ್ಕೆಯ ಗುಣವುಳ ಕಳೆನಾಶಕ)

ಪ್ರೆಟಿಲಾಕ್ಟೊರ್ 50% ಇಸಿಯು. ಆಯ್ಕೆಯ ಗುಣವುಳ್ಳ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು ದೊರಬರುವ ಮೊದಲೇ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವ್ಯಸಗುವ ವಿಶಾಲ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕ್ರಿಯೆಯುಳ್ಳ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿದು ವಾರ್ಷಿಕ ಹುಲುಗಳು, ಗರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆತ್ತುತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬೆಳೆ(ಗಳು)	क्षेत्रपं		ಪ್ರಮಾಣ/ಹೆಕ್ಕೇರಿಗೆ	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆ	
	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಸ.ಘ. (ಗ್ರಾ.)		ತೆಳುಗೊಳಿಸಲು ನೀರು (ಲೀ.)	ಆದ ಬಳಿಕ ಕಟಾವಿಗೆ ಕಾಯ ಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
ನಾಟಿಮಾಡಿದ ಭತ್ತ	ಗಂಡುಭತ್ತ ಭಕ್ತದ ಜಾತಿಯ ಕಳೆ ದದ್ದೆ ಹುಲ್ಲು ಜೇಕು, ನೀರು ಸಬ್ಬಸಿಗೆ, ಅರದಲಿಕಸ, ಲುಡ್ಡಿ ಗಿಂಬಾ ಪಲ್ಲಿ ಫ್ಲೊರಾ, ಲೆಪ್ಪೊಕ್ಕೊವಾ ಚೈನೆನ್ಗಳ, ಮೊನೋಕೊಂಯಾವಜೈನಾಲಿಸ್ ಸಿಂಪಿಗನ ಹುಲ್ಲು	500-750	1000-1500	500-750	75-90

ಮರು-ಪ್ರವೇಶಕೆ ಅವಧಿ: 24 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ.

ಉಪಯೋಗಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ: ನೀರಿನ ವಸಗುವ ಬಳಸುವ ಸೇಯರನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ತೇಯರ್ಗಳು: ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಶನ್ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ತೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಶನ್ ನ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಟೇಯರ್, ಫ್ಲಾಟ್ ಫ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಡ್ ಜಟ್

ಬಳಸುವ ಸಮಯ: ನಾಟಿಯಾದ 5 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ

ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ (ಅನ್ವಯಿಸುವಲ್ಲಿ) : ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿರುವ, ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನ ಸಮಯ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಡಿ.

ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಫಸಲಿನ ಸೂಕ್ತ ಹಂತ: ಭತ್ತದ ನಾಟಿಯಾದ ದಿನದಿಂದ ಐದು ದಿನದೊಳಗಾಗಿ ಉತ್ಹಾನ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.

ಅಳವಡಿಕೆಯ ವೇಲೆ: ಬೆಳಗಿನ ಅಥವಾ ಸಂಜೆಯ ವೇಲೆಗೆ ಆದ ತೆನೀಡಬೇಕು

ಅಳವಡಿಕೆಯ ಪದತಿ ಮತ್ತು ಸಮಯ: ಅವಶ್ಯಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಸನವನ್ನು ಅಳೆದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆರೆಸುತ್ತಾ. ಚಿನ್ನಾಗಿ ಥೊಳಿಸಿರಿ. ಒಂದು ಹೆಕೇರ್ ವಿಸಿರ್ಣಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕ ಪ್ರಮಾಣದ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಉತ್ಸರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಮತ್ತು ಚಪಟೆ ಬೀಸುಳ್ಳ ಮೂತಿ ಇರುವ ಬೆನ್ನುಚೀಲದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಭತ್ತದ ನಾಟಿಯಾದ ದಿನದಿಂದ ಐದು ದಿನದೊಳಗಾಗಿ ಇದನು ಉತ್ತಾನ ಪೂರ್ವೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿರಿ. स प्रमुक्तार्यसम्बद्धाः स्टब्स् स्टब्स स प्रमुक्तार्यसम्बद्धाः स्टब्स् ಬಿಡಬೇಡಿ. ಇದರ ಅಳವಡಿಕೆಯ 24 ಘಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಗದ್ದೆ ತುಂಬಿ ಹರಿಯದಂತೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿದಿ

ಪುನರಾವರ್ತನೆ: ನಾಟಿಯಾದ ದಿನದಿಂದ ಐದು ದಿನದೊಳಗಾಗಿ ಇದನ ಉತ್ತಾನ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಗರಿಷ್ಠ ಅಳವಡಿಕೆ

ಮುಂಜಾಗ್ಯತೆಗಳು: 1. ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ಗಿ ಆಹಾರದ ಖಾಲಿ ಪಾತೆ ಹಾಗೂ ಪಶುಗಳ ಮೇವಿನಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿ 2. ಬಾಯಿ, ಕಣುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಜಾಗತೆ ವಹಿಸಿ. 3. ಸಿಂಪರಣೆಯ ಹನಿಗಳನ್ನು ಉಸಿರಿನಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. 4. ಸಿಂಪರಣೆಯಾದ ಬಳಕ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಬಟೆಬರೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ 5. ಸಿಂಪರಣೆ ಕೆಗೊಳುವಾಗ ಹೊಗೆಬತಿ ಸೇದಬೇಡಿ. ಏನನೂ ತಿನಬೇಡಿ. ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಹಾಗೂ ಜಗಿಯಬೇಡಿ. 6. ಮಿಶ್ವಣ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಫೂರ್ತಿ ಸಂರಕಣಾ ಉಡುಪ್ಪ ಧರಿಸಿರಿ.

ಜೇನು ನೊಣ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವೈರಿಗಳಂಥ ಉಪಕಾರಿ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯೊದಗದಂತೆ ಎಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿರಿ.

ವಿಷತಗಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ತಲೆನೋವು, ಆಲಸ್ತ, ತಲೆಸುತ್ತು ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತೆ: 1. ಹೊಟೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಬದಿಯನ್ನು ಕೆರೆದು ವಾಂತಿ ವಾಡಲು ಪೇರೇತಿಸಿರಿ ವಾಂತಿಯ ರವ ತಿಲಿಗೊಳುವ ವರೆಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ ರೋಗಿಯು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನವಾಗಿದಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ. 2. ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಮ ಕಲುಷ್ಠಿಕಗೊಂಡಿದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಕಳಚಿ ಕಲುಷ್ಠಿಕಗೊಂಡ ಚರ್ಮವನು ಹೇರಳ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಬೂನು ಹಾಕಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 3. ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಲಿನಗೊಂಡಲ್ಲಿ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ತನಕ ಸ್ಕಾಲೈನ್/ಸ್ಪಚ್ನ ನೀರನು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ರಾಚಿರಿ. 4. ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಹವೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಯಿರಿ. 5. ವಿಷಪ್ರಾಶನದ ಯಾವುದೇ ಸಂಕೇತ ಕಂಡರೂ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಾನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ. ಕಂಟೇನರುಗಳ ವಿಶರ್ಜನೆ: 1 ಪಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಜನನಪತಿಗೆ ದೂರವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಗಿಯಬೇಕು 2. ಖಾಲಿ ಪ್ರಾಕೇಜುಗಳು ಮರು ಉಪಯೋಗಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಮಾಡಲು, ಅವುಗಳನ ಹೊರಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಖಾಲಿ ಪಾಕೇಜುಗಳು, ಮಿಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥ ಮತು ತೊಳೆ ನೀರು- ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲಪ್ರದೂಷಣೆಗೆ ಆಸದವಿಲ್ಲದಂತೆ ಸುರಕ್ತಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು

ಶೇಖರಣೆ: 1. ಕಳೆನಾಶಕವಿರುವ ಪ್ರಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಸಾಮಗಿಗಳನ್ನು ಸೇಖಗಿಸಿಡುವ ಕೋಣೆ ಆಥವಾ ಕಟಡಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಗಿ ಪತ್ರೇಕ ಕೋಣೆ ಆಥವಾ ಕಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ- ಇಲ್ಲವೇ ಕಳೆನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲಮಾರಿನಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಇರಿಸಿ. 2. ಕಳೆನಾಶಕವನು ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಟ್ಟು ಅದು ಶುಷ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳಕು ಇದ್ದು, ಹವೆಯಿಂದ ಮಲಿನಗೊಳ್ಳದಂತಾಗಲು ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು.

ಪ್ರೆಟಿಲಾಕ್ಲೊರ್ ಸಘ.	(ಕನಿಷ್ಠಶುದ್ಧತೆ 94% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸ.ಫ.)	50.000% ಡಬ್ಲೂ/ಡಬ್ಲೂ
ಇಮಲ್ಲಿಫಾಯಿಂಗ್ ಏಜಂಟ್	(ಇಥಾಕ್ತಿಲೇಟೆಡ್ ವೆಜಿಟೀಬಲ್ ಆಯಿಲ್)	4.400% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ವೆಟ್ರಿಗ್ ಏಜಂಟ್	(ಆಲ್ಟೈಲ್ ಎರೈಲ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ ನಕ್ಯಾಲ್ಷಿಯಂಸಾಲ್)	3.600% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಸ್ತಿಬಿಲ್ಬಾಸರ್	(ಇಪಾಕ್ಷಿಡೈಸ್ಡ್ ವೆಜಿಟೀಬಲ್ ಆಯಿಲ್)	3.000% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯ
ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ C-IX		ಕ್ಯೂ.ಎಸ್. ಮಾಡಲು
LAD		100.000% ಡಬ್ಲ್ರೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ

ಎಚರಿಕೆ: 1. ಲೇಬಲ್ ಮತು ಲೀಪ್ ಲೆಟ್ ನಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಬೆಳೆಗಳು ಮತು ಕೀಟಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆಯಲುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಾರದು. 2. ಕೊಯ್ನಿ ನಂತರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಬಳಸಬಾರದು. 3. ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಧಾರಕಗಳನ ಲೀಪ್ ಲೇಷ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಲಿಸಿರುವ ವಿರೇಕ್ ಕಾನುಕಾರ ವಾಶಪಡಿಸಲೇಕು 4 **ಈ** ಉತ್ಪನ್ನವು ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳಿ ಗೆಕಿರಿ ಕಿರಿಯುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದುದರಿಂದ ಚರ್ಮಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಇದರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. 5. ಬರಿದಾದ ಧಾರಕಗಳ ಮರುಬಳಕೆ ಅಪಾಯಕರ.

டிலீட்

பிரெடிலாகுளோர் 50% ஈசி

(தோ்ந்தெடுத்து செயல்படும் களைக்கொல்லி) ப்ரெடிலாக்ளோர் 50% இ சி களை முளைக்கும் முன்பே தேர்ந்கெடுக்கு விரிவாக ஊடுருவிச் செயல்படும் களைக்கொல்லி. இது வருடம் முழுதும் காணப்படும் புல்கள்,கோரைப் புல்கள் மற்றும் அகலமான இலைகள் உள்ள களைகள் மீது நன்கு

செயல்படுகிறது. பரிந்துரை:

	H & 41	ଏ ଲା)க்டெருக்	@ ञ्राबाध्य	கடைசுத
(கள்)	பொது பெயர்		மருந்து (மி.வி.)		தெளிப்புக்கும் அறுவடைக்கும் இடையே காத்திருப்பு
					காலம் காலம்
					(நாட்கள்)
БШОЦ	க்ருஸ்கல்லி,	500	1000-	500-	75-90
செய்ய-	எக்னோக்ளா	750	1500	750	
عثالث	கோலோனம், சைபரஸ்				
Gjjái	டி. போர்மிஸ், சைபரஸ்				
	இர்யா,				
	ஃபிம்ப்ரிஸ்டைலிஸ்				
	மிலியேசி, எக்லிப்டா				
	அல்பா, லுட்விஜியா				
	шітеЯ.°.:ப்ளோரா,				
	வெப்டோக்ளேவா				
	तम् विताकां मीकं ।				
	GurGamGamhur				
	வஜினாலிஸ், பானிகம்				
	fi Duarian				

மருந்து தெளித்த பிறகு நடமாட்டம்: 24 மணி நேரத்திற்குப் பிறகு

பமிர் பாங்காப்ப உபகாணங்கள்: ஃப்ளாட் ஃபேன் மற்றம் ஃப்ளட் மேட் வகை முக்க Garrain Britania Gazilli unin arici Grossin ami ana Gazilli unin arici Grossin ami ana Gui u fi Gazilli ள் போன்ற தெளிப்பான்களைப் பொறுத்தது தண்ணீர் அளவு.

தெளிப்பு வேளை: நடவுக்கு, பிறகு, 5 நாட்களுக்குள்,

வானிலை நிலவரம் (பொதுவாக): மழைக் காலத்தில், காற்று வீசிக் கொண்டிருக்கும் போது அல்லது வெயில் தீனிரம் அதிகமாக இருக்கும்

மருந்து தெளிப்பும் பயிர் பருவம்: நாற்று நடவுக்கு 0-5 நாட்களுக்குப் பிறகு, களைகள் ளைவிடும் ன்னர் மருந்தைத் தெளிக்க வேண்டும். **பயன்படுத்தும் காலம்**: களைக்கொல்லி மருந்தை பெரும்பாலும் அதிகாலை அல்லது மாலை வேளையில்

தெளிக்கும் றையும் காலம்: சிறிதளவு தண்ணீரில் தேவையான அளவு மருந்தை சேர்த்து நன்றாகக் கலக்க வேண்டும். மீதமிருக்கும் நீரைச் சேர்க்கும் போது, தொடர்ந்து கலக்கிக் கோடுக்க வேண்டும். ஒரு ஹெக்டேருக்குத் தேவைப்படும் மருந்து மற்றும் தண்ணீர் அளவு அடிப்படையில் மருந்தையும் படுந்து பற்றும் தணையா அடிப்படையல் மருந்தையும் தண்ணீர் அளவையும் டிவு செய்துகொள்ள வேண்டும், நாற்று நடவுக்கு 0-5 நாட்களுக்குப் பிறகு, களைகள் ளைவிடும் எனர் நாப்சாக் ஸ்பிரேயரில் தட்டை விசிரி கூம்பு ஹையப் பொருத்தி நாப்சாக வைப்புளால் தட்டையை வளர்களும் பெரிந்தத் மருந்தைத் தெளிக்க வேண்டும். இக்களைக்கொல்லியைத் தெளித்த பிறகு வயலிலிருந்து தண்ணீரை வடிய விடக் கூடாது. மருந்து தெளித்த 24 மணி நேரம் வரையில் வயிலில் நீர் பாய்ச்சக்

அடிக்கடி பயன்பாடு: நாற்று நடவுக்கு 0-5 நாட்களுக்குப் பிறகு, களைகள் ளைவிடும் ன்னர் மருந்தைத் தெளிக்க வேண்டும் அதிகபட்சமருந்து தெளிப்பு எண்ணிக்கை : ஒன்று மட்டும்

ு மன்னெச்சரிக்கை: 1. உணவு பண்டங்கள், வெற்று உணவு பாத்திரங்கள் மற்றும் கால் நடைகளுக்கு அப்பால் வைக்கவும். 2. வாமிலும், கண்களிலும் மற்றும் சருமத்திலும் படுவதை தவிர்க்கவும். 3. தெளிப்பு சாறலை உட்சுவாசிக்கக் கூடாது. காற்று லீசும் திசைப்(லேயே தெளிக்கவும். 4. தெளிப்பு முடிந்த பின் மாசுபட்ட жая ваханній ен антиванська при на прображницій в до на видення виден பருகவோ, உண்ணவோ மற்றும் மெல்லவோ கூடாது. 6. கலவை தயாரிக்கும் போதும், தெளிக்கும்போதும் முழு பாதுகாப்பான ஆடைகளை அணியவும்.

நன்மை பயக்கும் பூச்சிகள் மற்றும் தீம்பூச்சிகளை வேட்டையாடும் உயிளினங்கள் மற்றும் தேனீக்களுக்கு தீங்கு ஏற்படாதிருக்க தேவைப்படும்

விஷம் தாக்கிய அறிகுறிகள்: தலைவலி, வேளைகளில் தளர்ச்சி, தலைச்சுற்றல், பதட்டம், குமட்டல்,

். **முதல் உதவி :** 1. விழுங்கிவிட்டால், தொண்டையில் விரலைவிட்டு வாந்தி எடுக்கத் துண்டவும். வாந்தி திரவம் நீங்கும் வரை அப்படி செய்யவும். தாக்குண்டவர் மயக்கத்தில் இருந்தால் வாந்தி எடுக்கச் செய்ய கடாது. 2. ஆடைகளும் சருமமும் மாசுபட்டால், ஆடைகளை நீக்கி, சோப்பு மற்றும் அதிக நீரினாலும் சருமத்தை கழுவவும். 3. கண்கள் மாசபட்டால், 10-15 நிமிடங்களுக்கு உப்பு/சுத்தமான நீரினால் கழுவவு 4. p. i. souréféarroi, unaféariu i. L. ougor séaronar arrifonni L. cogran Qu. éafrica Garrein Quedosou 5. நச்சுபட்ட அறிகுறிகள் ஏதேனும் தெரியவந்தால், தாமதிக்காமல்

ருச்சு முறிவு: குறிப்பிட்ட நச்சு முறிவு எதுவும் கிடையது. அறிகுறிகளுக்கேற்ப சிகிச்சை அளிக்கவும் ாள்கலன்களை அப்புறப்படுத்தல்: (1) பேக்கேஜ்களை உடைத்து வசிப்பிடங்களுக்கு அப்பால் புதைக்கவும். (2) உபயோகித்த பேக்கேஜ்களை மறுமுறை பயன்படுத்தும்படி வெளியில் விட்டு வைக்கக் கூடாகு. (3) பேக்கேற்கள் அவ்வது என்கிய பொருட்கள் மற்றும் எந்திரக்கின் கமுவ நீர் முகலியவற்றை கற்றப்புற சூழல் அல்லது நீர் நிலைகளுக்கு மாக ஏற்படாதவாறு பாதுகாப்பான முறையில்

மாக்குவ உகவியைப் பொ வேண்டும்.

சே**மிப்பு :** (1) களைச்சொல்லி அடங்கிய பேச்சேஜ்களை அதன் தன்மை மற்றும் அளவை பொருத்து பிறப் பொருட்களை சேமிக்கும் அறைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட தனி அறையில் அல்லது அலமாரியில் சேமித்து பூட்டி வைக்கவும். (2) சேமிப்பு அறை நன்கு கட்டப்பட்டதாக, உலர்ந்ததாக, நல்ல வெளிச்சமூம், ஆவியினால் மாக ஏற்படுவகை கவிர்க்கரும் வண்ணம் போகுமான பரப்பளவு கொண்டகாக இருக்க வேண்டும்.

ப்ரெடிலாக்ளோர் தீ. மூ	(குறைந்தபட்ச தூய்மை 94%எ/எ தீ.மு)	50.000% (
எமல்சிஃபையிங் ஏஜெண்ட்	(எதோக்சிலேடெட் வெஜிடபிள் ஆயில்)	4.400%
வெட்டிங் ஏஜென்ட்	(அல்கைல் அரைல் சல்ஃபோனேட் ஆஃப்	
	கா ல்சியம் சால்ட்)	3.600%
ஸ்டெடிலைசர்	(இபோக்ஸிடைஸ்ட் வெறிடபிள் ஆயில்)	3.000%
சால்வென்ட் சி-IX		guni
		தேவைக்கே
மொக்கம்	_	100.000 %

எச்சரிக்கை: 1. இந்க லேபில் மற்றும் கையேட்டில் குறிப்பிட்டிருக்கும் அமிக்குவிடவும். 4. இக் கயாரிப்ப கண்கள் மற்றும் சருமக்சை அழ்த்துவட்கும். + ஆத் தமார்ப்பு கண்களில் மற்றும் சருமத்தில் உறுத்தும் என்பதால், மருந்து கண்களில் மற்றும் சருமத்தில் தெளிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். 5. காலி கொள்கலன்களை மறுஉபயோகம் செய்வது ஆபத்தானது

ਡਿਲੀਟ

ਪੇਟੀਲਾਕਲੋਰ ੫੦% ਈ ਸੀ (ਚੋਣਾਤਮਕ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ)

ਪੇਟੀਲਾਕਲੋਰ ੫੦% ਈ.ਸੀ. ਇਕ ਚੋਣਕਾਰ ਉਂਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਹੳਪਯੋਗੀ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਹਾਂ, ਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦਾ

ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ

ਫ਼ਸਲ	ਨਦੀਨ ਦਾ	ਮਾਤਰਾ/ਹੈ.			ਆਖਰੀ ਸਪ੍ਰੇ ਤੋਂ
	ਆਮ ਨਾਂ	ਕਿ.ਤ.	ਫ਼ਾਰਮੂ.	ਘੋਲ ਦਾ	ਕਟਾਈ ਵਿਚਕਾਰ
		(ग्.)	(ਮਿਲੀ.)	ਪਾਣੀ (ਲੀ.)	ਉਡੀਕ (ਦਿਨ)
ਰੋਪਿਤ	ਸਵਾਂਕ	400-	9000-	400-	94 -
ਝੋਨਾ	ਛੋਟਾ ਸਵਾਂਕ	240	9400	240	ťo
	ਝੌਨੇ ਦਾ ਮੋਥਾ				
	ਛਤਰੀ ਵਾਲਾ ਮੋਥਾ				
	ਮਿਰਚ ਬੂਟੀ				
	ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬੂਟੀ				
	ਲਡਵਿਜੀਆ ਪਲਵੀਫ਼ਲੋਰਾ				
	ਲੇਪਟੋਕਲੋਆ ਚੀਨੇਂਸਿਸ				
	ਨਾਨਕਾ				
	ਕਣਕੀ				

ਵਾਪਸੀ ਪਵੇਸ਼ ਅਰਸਾ· ੨੪ ਘੱਟੇ ਬਾਅਦ

ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ: ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੈਪਸੈਕ ਬੈਟਰੀ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਫ਼ਲੈਂਟ ਫ਼ੈਨ ਅਤੇ ਫ਼ਲੱਡ ਜੈਟ ਨੌਜ਼ਲ ਲਗਾ ਕੇ ਵਰਤੋ।

ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਖੇਤ ਵਿਚ ਰੋਪਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ੫ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।

ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਤ (ਆਮ ਕਰਕੇ): ਮੀਂਹ-ਕਣੀ.ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਕਤਕਦੀ ਹੱਪ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਵਜ**ੋ**। **ਵਰਤਣ ਲਈ ਫਸਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ** ਤੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਰੋਪਣ ਤੇ ਬਾਅਦ o-ਪ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਗਣੋ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋ।

ਵਰਨ ਦਾ ਧਮਾਂ ਸਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਬਵੇਰ ਅਤੇ ਬਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਰਤਿਆ ਹਾਏ। **ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ**: ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿਓ । ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇਕ ਹੈਕਟਰ ਭੂਮੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ ੂ ਅਤੇ ਫ਼ਲੈਟ ਫ਼ੈਨ ਨੋਜ਼ਲ ਲਗਾ ਕੇ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਨਾਲ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰੋਪਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ o-੫ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਗਣੋਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪ੍ਰੇ ਕਰੋ । ਇਹ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਕਰੋ । ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ੨੪ ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਖੇਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ ।

ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ: ਰੋਪਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ੦–੫ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਗਣੋ–ਪੂਰਬ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋ। ਅਧਿਕਤਮ ਇਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਵਰਤੋ ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: ੧) ਭੋਜਨ, ਭੋਜਨ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੁ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ੨) ਮੂੰਹ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ੩) ਸਪ੍ਰੇ ਫਹਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਖਿੱਚੋ। ਸਪ੍ਰੇ ਹਵ ਵਗਣ ਦੇ ਰੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰੋ। ੪) ਸਪੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਤ ਹੋਏ ਕਪੜੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਗ ਧੋ ਲਓ। ੫) ਸਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਨਾ ਧੁਮਰਪਾਨ ਕਰੋ। ੬) ਸਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਜ਼ਾਅਕਾਰੀ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ।

ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਅਸਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ: ਸਿਰਦਰਦ, ਸਸਤੀ, ਚੱਕਰ, ਘਬਰਾਹਟ, ਮਤਲੀ,

ਫ਼ਸਟ ਏਡ: ੧) ਨਿਗਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠਕੋਰ ਕਰਕੇ ਉਲਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਸ਼ਾਓ। ਉਲਟੀ ਦਾ ਤਰਲ ਸ਼ਾਟ ਹੋਣ ਤਰ ਇਹ ਅਮਲ ਦਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਰੋਗੀ ਸੇਹੋਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਉਕਸਾਓ। ੨) ਜੇ ਕਪਤੇ ਅਤੇ ਜਮਤੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਪਤੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਲੀਤ ਹੋਈ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ੩) ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜਾਂ ਸੈਲਾਈਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ੧੦-੧੫ ਮਿੰਟਾਂ ਤਕ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ। ੪) ਦਵਾਈ ਸੁੰਘੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਓ।੫) ਜੇ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ. ਤਾਂ ਫ਼ੌਰਨ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ ।

ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ: ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਕਰੋ।

ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: ੧) ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੇ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਦਰ ਦਬਾ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ੨) ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ੩) ਪੈਕੇਟਾਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਬਚੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਧੋਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਪਦਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਟੋਰੇਜ: ੧) ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿਚ ਤਾਲਾ ਮਾਰਕੇ ਰੱਖੋ। ੨) ਇਹ ਕਮਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਸੁੱਕੇ, ਚੰਗੇ ਰੋਸ਼ਨੀਦਾਰ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਡਲ੍ਹੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾੜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਫੈਲੇ।

ਰਸਾਇਣਕ ਮਿਸਰਨ

ਪ੍ਰੇਟੀਲਾਕਲੋਰ ਕਿ.ਤ.	(ਘੱਟੋ. ਸ਼ੁਧਤਾ ੯੪% ਵ/ਵ ਕਿ.ਤ.)	੫੦.੦੦੦% ਵ/ਵ
ਇਮਲਸੀਫ਼ਾਈਂਗ ਏਜੰਟ	(ਈਥੌਕਸੀਲੇਟਿਡ ਵਨਸਪਤੀ ਤੇਲ)	8.800% ₹/₹
ਵੈਟਿੰਗ ਏਜੰਟ	(ਅਲਕਾਈਲ ਅਰਾਈਲ ਸਲਫ਼ੋਨੇਟ	
	ਆਫ਼ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਾਲਟ)	੩.੬੦੦% ਵ/ਵ
ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਰ	(ਈਪੈਕਸੀਡਾਈਜ਼ਡ ਵਨਸਪਤੀ ਤੇਲ)	੩.000%ਵ/ਵ
ਘੋਲਕ ਸੀ- ੯	ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ	
ਕੁੱਲ		900.000% ₹/₹

ਕੇਗਵਨੀ-੧ ਲੇਚਲ ਅਤੇ ਮਰਕੇ ਇਹ ਹੁੱਚੇ ਹੀਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਚਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿਨਾ ਹਿਦੇ ਹੋਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ੨ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੋ। ੩. ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਮਤਾਬਿਕ, ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ੪.ੳਤਪਾਦ ਤਵਚਾ ਅਤੇ ਅੰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਵੰਚਾ ਤੇ ਅਤੇ ਅੰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੰਗਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ੫. **ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ** ਦਬਾਰਾ ਵਰਤਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ডিলীট প্রেটিল্যাক্লোর ৫০% ই সি (নির্বাচিত আগাছানাশক)

প্রেটিলাক্লোর ৫০% ই.সি. হচ্ছে একবর্ষী ঘাস, হোগলা এবং চওড়া পাতাযুক্ত আগাছা দমনের জন্যে দর্দন্তি ক্রিয়াযুক্ত গজানো-পর্বক বহুমখী আগাছানাশক।

স্থানিশ

ফসল	আগাছার		মাত্রা/হে	শেষ স্প্রে থেকে	
	চলতি নাম	সঃ উঃ (গ্রাম)	ফর্লেশন (মিঃলিঃ)	জলে তরলীকরণ (লিটার)	ফসল কাটা পর্যন্ত মধ্যের অপেক্ষাকাল (দিন)
রোপণ	শ্যামা ঘাস (বড়)	600-	\$000-	(200-	96 -
করা	শ্যামা ঘাস (ছোট)	960	2600	960	20
ধান	ছোট মোথা,				
	চওড়া মোথা,				
	বিন্দিমোথা কেণ্ডত,				
	লবঙ্গফুল,				
	লেপ্টোক্লোয়া চিনেনসিস,				
	পাণাড়ী,				
	প্যানিকাম রিপেন্স				

পুনঃ প্রবেশ সময়কাল: ২৪ ঘণ্টা পরে

वावद्यात्वव निर्दर्भ : क्यांने कान अवर क्रांप (को नकल लाशात्मा नाश्रियाक स्थाया কম্প্রেশন ন্যাপস্যাক স্প্রেয়াব, কম্প্রেশন ন্যাপস্যাক ব্যাটারী স্প্রেয়াবের মতো স্প্রেয়াবের ধরণের ওপর জলের পরিমাণ নির্ভর করবে।

প্রযোগের সময়: রোপণের পরে ৫ দিনের মধ্যে

আবহাওয়া পরিস্থিতি (সাধারণত): বৃষ্টির দিনগুলিতে, প্রবল হাওয়ায় এবং উষ্ণ রোদ্রজ্জবল দিনে স্প্রে করবেন না।

প্রয়োগের জন্য ফসলের দশাঃ ধান ফসল রোপণের পরে ০ - ৫ দিনের মধ্যে প্রাক-উত্থান আগাছানাশক হিসাবে প্রয়োগ করুন। প্রয়োগের সময় : বিশেষ করে সকালে এবং বিকেলে প্রয়োগ ককন।

পদ্ধতি এবং প্রয়োগের সময় প্রণার প্রয়োজনীয় মানা মেপে নিন এবং অল জলে ভালো করে গুলে নিন। এই মিশ্রণে অবশিষ্ট জল মিশিয়ে ভালো করে নেদে দ্বন তৈবি ককন। সম্পর্ণ কভাবেজ নিশ্চিত কবতে এক হেক্টবে প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় জলের পরিমাণের সঙ্গে সুপারিশ করা পণ্যের পরিমাণ মেশান এবং ফ্র্যাট ফ্রান নজল লাগিয়ে ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ারের সাহায্যে ফসল রোপণের পরে ০ - ৫ দিনের মধ্যে প্রাক-উত্থান আগাছানাশক তিসাবে প্রযোগ ককন। এই আগাছানাশক প্রযোগ্যব পরে ধানের জমি প্রবেক জল নিস্তাসন কববেন না। পণ্য প্রযোগের ১ ৪ ঘণ্টা পরে পর্যন্ত চাম জমিতে জল

প্রয়োগের সংখ্যা ব প্রয়োগ পুনরাবৃত্তি : এই আগাছানাশকটি ফসল রোপণের পরে ০ - ৫ দিনের মধ্যে প্রাক - উত্থান আগাছানাশক হিসাবে প্রয়োগ করুন। সর্বাধিক একবার প্রয়োগ করবেন।

সতর্কতা: ১) খাদাপদার্থ, খালি খাদাপাত্র এবং পশুখাদা থেকে দরে রাখন। ১) মখ, চোখ ल उटकट प्रश्म्मा (ग्रामा । ०) त्म्म-क्यांव भारत्र शायश । ग्रामा । वाजाराव यमकटल त्म्मा করুন। ৪) স্প্রে করার পর দ্বিত পোশাক ও দেহাংশ ভালোভাবে ধয়ে নিন। ৫) স্প্রে করার সময় কোনকিছু ধুমপান, পানীয় পান, খাওয়া ও চেবানো নিমেধ। ৬) মেশানো এবং ম্প্রে করার সময় সম্পর্ণ সরক্ষামলক পোশাক পরুন।

বন্ধুকীট যেমন মৌমাছি এবং কীটের প্রাকৃতিক শক্রুর ক্ষতি থেকে বিরত থাকতে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বিষাক্ততার লক্ষণ: মাথাধরা, অবসাদ, বিমনিভাব, স্নায়দৌর্বল্যতা, গাবমি, বমি করার লক্ষণ

প্রাথমিক চিকিৎসা: ১. গিলে ফেললে টাগড়ায় আঙুল ঢুকিয়ে বমি করান। বমির তরল ব্যক্ত না ক্রথমা পর্যন্ত বাবংবার ককন। বোগী আঁসনেনা থাকলে বমি করাবেন না। ১) পোশাক ও ত্বক সংক্রামিত হ'লে, পোশাক বদলে দিন এবং সাবান ও প্রচর জল দিয়ে দ্বিত ত্বক ধয়ে দিন। ৩) চোখ দ্যিত হ'লে পচর স্যালাইন/পরিষ্কার জল দিয়ে পায় ১০ থেকে ১৫ মিনিট ঝাপটা দিন। ৪) শ্বাসে গেলে রোগীকে মুক্তবায়তে সরিয়ে দিন।৫) বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা গেলে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

প্রতিষেধক: সুনির্দিষ্ট কোনও প্রতিষেধক জানা নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা।

খালি প্যাকের বিনষ্টিকরণ: ১) প্যাক ভেঙ্গে জনবসতী থেকে দূরে পুঁতে ফেলতে হবে। ২) ব্যবহৃত প্যাকের পুনর্ব্যবহার রোধ করতে উহা যত্রতত্ত্ব ফেলে রাখবেন না। ৩) প্যাক বা উদ্বন্ত পদার্থ ও ধোয়ানি এমন নিরাপদ উপায়ে বিনষ্ট করতে হবে, যাতে পরিবেশ বা

মজতকরণ: ১) আগাছানাশক সম্বলিত প্যাক অন্যান্য পদার্থ মজতের জন্যে ব্যবহৃত ঘর বা স্থান থেকে দরে পথক ঘর বা স্থানে মজত করতে হবে অথবা আগাচানাশকেব পবিমাণ ও প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে পৃথক আলমারিতে তালা বন্ধ ক'রে রাখতে হবে। ২) আগাছানাশক মজতের জন্যে বাবহৃত ঘর বা স্থানটি হ'তে হবে সুনির্মিত, শুকনো, স্মাচ্ছাদিত এবং বাষ্পতার দ্বারা হওয়া সংক্রমণ এডাতে পর্য্যাপ্ত পরিসরযুক্ত।

तात्राघतिक शर्रतः

প্রেটিলাক্লোর সঃ উঃ	(ন্যুনতম বিশুদ্ধতা ১৪% ও/ও সঃ উঃ)	e0.000% g/g
অবদ্রবীয় পদার্থ	(ইথক্সিলেটেড বনস্পতি তেল)	8.800% 9/9
সিক্তকারী পদার্থ	(ক্যালসিয়াম লবণের অ্যালকাইল	
	व्यातीन সानस्मात्नि)	o.৬00% <mark>%</mark> /9
<i>ছিতি</i> স্থাপক	(ইপক্সিডাইজড বনস্পতি তেল)	o.ooo% g/g
দ্রাবক সি-১		বানাতে যথেষ্ট পরিমাণ
মোট		\$00.000% હੁਕੁ

সতর্কতা: ১ লেবেল এবং লিফলেটে উল্লিখিত ফসল এবং কীট বাতীত অন্যান্য ফসল এবং কীশ্টের উপর ব্যবহার করা যাবে না। ১ ফসল কাটার পর तात्रवात करा शास्त्र ज्ञा। 🤊 लिखस्लराहेत जिस्में अज्ञयाशी भालि शाज जिस्स्रिक করুন। ৪. এই পণ্যটি থেকে স্বক ও চোখে দ্বালা হতে পারে, অতএব স্বক ও চোখের সঙ্গে এটির সংস্পর্শ থেকে বিরত থাকুন। ৫. খালি পাত্রের পনর্ব্যবহার বিপজ্জনক।

ডিলীট প্ৰিটিলাক্ল'ৰ ৫০% ই.চি. (বাছনিক্ষম অপতণনাশক)

প্রিটিলাক্র'ৰ ৫০% ইচি হ'ল অপতণ ওলোৱাৰ আগতে প্রয়োগযোগ্য, ব্যাপক প্রভারশালী, বাছনিক্ষম অপতৃণনাশক যি সকলো প্ৰকাৰৰ অপকাৰী ঘাঁহ-বনৰ বিৰুদ্ধে অত্যন্তম সুফল দিয়ে।

শস্য	অপতৃণৰ		মাত্রা/হে	ক্টৰ	শেষ স্প্ৰে আৰ
উট্ট	উদ্ভিদিক নাম	স.উ.	ফর্মেশ্যন	মিহলাবৰ	চপোৱাৰ মাজ
		(গ্রাম)	(মিলি)	বাবে পানী	ৰব লগা সময়
				(লিটাৰ)	(দিন)
শালি	একিন'ক্ল'ৱা	600-	2000-	600-	90 -
ধান	ক্রাচগল্লি,	960	7600	960	20
	একিন'ক্ল'ৱা				
	ক'ল'নাম,				
	চাইপেৰাচ ডিফৰ্মিচ,				
	চাইপেৰাচ আইৰিয়া,				
	ফিমব্রিষ্ট ইেলিচ মিলিয়েচিয়া,				
	এক্লিপ্টা অল্বা,				
	লুডউইজিয়া পালৱিফ্ল'ৰা,				
	লেপ্ট'ক্ল'ৱা চিনেনচিচ,				
	ম'ন'কোৰিয়া ভেগিনেলিচ,				
	পনিকাম ৰিপেন্স				

পনৰ প্ৰেশৰ সময় : ১৪ ঘন্টাৰ পিছত ।

নাবহাৰৰ নিৰ্দেশ: পানীৰ পৰিমাণ স্প্ৰেয়াৰৰ প্ৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। ফ্লেট ফেন আৰু ফ্লাড জেট ন'জল লগাই লোৱা নেপচেক স্প্রেয়াৰ, কম্প্রেশান নেপচেক স্প্রেয়াৰ বা কম্প্রেশান নেপচেক বোঁটাৰী স্প্ৰেয়াৰ আদিৰ দ্বাৰা পযোগ কৰিব।

প্ৰযোগৰ সময় : বোৱাৰ পাছতে ৫ দিনৰ ভিতৰত।

বতৰৰ পৰিস্থিতি(সাধাৰণভাবে): বৰ্ষন হোৱা, বতাহ বলি থকা আৰু গ্ৰম ৰঐদ দি থকা সময়দোৱাকে স্পেনক্রবির।

প্ৰযোগৰ বাবে শস্যৰ প্ৰয়ায় : ধানৰ শস্য ৰোপণৰ ০-৫ দিনৰ ভিতৰত পি-ইমার্লেন্স প্রযোগ হিচাপে ব্যৱহার করিব লাগে ।

প্ৰযোগৰ সময় : বাতিপৱা আৰু গুধলি হঐলে ভাল হয় ।

প্রয়োগৰ ধৰণ আৰু সময় : প্রয়োজনীয় পৰিমাণৰ সামগ্রী জখি অলপ পানীৰ সৈতে ভালদৰে মিহলাই লওক । বাকী থকা পৰিমাণৰ পানী নিৰ্দিষ্ট কৰি ভালদৰে জোকাৰি দিব । এক হেক্টৰ ঢাকিবলৈ প্ৰয়োজনী য পানীৰ অনপাতে উৎপাদনৰ পৰিমাণ সামঞ্জস্য কৰক আৰু ৰোপণৰ ০-৫ দিনৰ ভিতৰত ফোঁই ফেনৰ নজেল লগোৱা নেপচেক স্প্ৰেয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰি পি-ইয়াৰ্জেন্স প্ৰযোগ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰক । এই ঘাঁহনিনাশক প্ৰযোগ কৰাৰ পিছত ধাননি পথাৰত পানী নিষ্কাশন নকৰিব । প্ৰয়োগ কৰাৰ ২ ৪ ঘণ্টাৰ পিছত পথাৰখন বানপানীত ডবি যোৱাটো পৰিহাৰ কৰিব লাগে।

ফ্রিকোরেনি: প্রতিস্থাপনৰ ০-৫ দিনৰ ভিতৰত প্রি-ইমার্জেন্স প্রয়োগ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে । প্ৰয়োগৰ সৰ্বোচ্চ সংখ্যা হঐল এটা ।

সতৰ্কতাসমূহ: ১) খাদ্য সামগ্ৰী, খাদ্য সামগ্ৰী ৰখা খালী পাত্ৰ আৰু পশু খাদ্যৰ পৰা দূৰত ৰাখিব। ২) মুখ, চকু আৰু ছালত লাগিবলৈ নিদিব। ৩) স্প্ৰে কণিকা উশাহত যাবলৈ নিদিব। বতাহৰ সোঁতৰ একে দিশততে স্প্রে কবিব। ৪) স্প্রে কামব শেষত দয়িত হোৱা কাপোর-কানি আৰু গার অংশসমত ভালদৰে খুই পেলাব। ৫) স্প্ৰে কৰাৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ খোৱা-বোৱা বা ধূমপান নকবিব। ७) মিহলোৱাৰ আৰু স্প্ৰে কৰাৰ সময়ত সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত সাজ-পোছাক পিন্ধি লব।

উপকাৰী কীট-পতঙ্গ যেনে. মৌমাখি আৰু কীটসমূহৰ প্ৰাকৃতিক শক্ৰবোৰৰ ক্ষতি পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ অৱলম্বন কৰা সতৰ্কতাসমহ

বিষক্রিয়াৰ লক্ষণসমূহ: মূবকামোরণি, তন্দ্রাচ্ছন্নতা, মূবস্থরণি, তর বিহুলতা, ওকালি, বমি আদিয়ে

প্রাথমিক সাহায্য: ১) যদিহে পেটলৈ গৈছে, ডিঙিৰ ভিতৰত সুৰসুৰাই দি বমি কৰোৱাব। বমিৰ তৰলখিনি পৰিস্থাৰ নোহোৱালৈকে এনেকৈ বমি কৰোৱাই থাকিব। ৰোগী অচেতন হৈ পৰি থাকিলে বমি কৰোৱাবলৈ চেষ্টা নকৰিব। ২) যদিহে কাপোৰ-কানি আৰু গাৰ ছাল দুষিত হৈছে, কাপোৰ-কানি খলি পেলাব আৰু দ্বিত অংশসমহ প্ৰচৰ পানীৰে চাবোন ঘঁহি থই পেলাব। ৩) চকত লাগিলে. প্ৰায় ১০-১৫ মিনিট সময় ধৰি প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ নিমখীয়া/পৰিষ্কাৰ পানী চকুলৈ ছটিয়াই চকু ধুব। ৪) উশাহত যদিহে গৈছে, ৰোগীক মুকলিৰ বিশুদ্ধ বতাহলৈ লৈ যাব।৫) বিষক্ৰিয়াৰ কোনো লক্ষণ দেখা দিলে, তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লঐব ।

বিষয় • কোনো বিশেষ বিষয়ৰ বিষয়ে জনা নায়ায়। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা চলাব।

খালী পেকেজৰ নষ্ট কৰণ: ১) খালী পেকেজবিলাক ভাঙি-চিঙি নষ্ট কৰি জনবসতিৰ পৰা আঁতৰত মাটিৰ তলত পতি পেলাব। ২) ব্যৱহৃত পেকেজবিলাক পনৰ যাতে ব্যৱহাৰ হব নোৱাৰে সেয়ে সেইবিলাক বাহিৰতে এৰি থৈ নাহিব। ৩) পেকেজবিলাক অৱশিষ্ট দব্য আৰু ধোৱা-পখলা কৰা পানী আদি এনেভাবে নিৰাপদে নষ্ট কৰিব যাতে তাৰ দ্বাৰা পৰিবেশ বা পানীৰ প্ৰদৰ্য ঘটিব

মজনকরণ • ১) অপন্ননাশক থকা পেকেন্সবিলাক অন্যান্য সামগী মন্ত্রত রখা কোঠা বা ঠাইর পৰা আঁতৰত পথক কোঠা বা ঠাইত মজত ৰখা উচিত অথবা অপতদনাশকৰ পৰিমাণ আৰু বৈশিষ্টাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পৃথক আলমাৰিত তলা মাৰি ৰখা উচিত। ২) অপতৃণনাশক মজুত ৰাখিব বিচৰা কোঠা বা ঠাইডোখৰ মজবুত, শুকান, পোহৰ থকা আৰু বাষ্পৰ দ্বাৰা দৃষিত হব নোৱৰাকৈ য়থেই আহল-বহল হোৱা উচিত

नाप्राप्रचिक श्रीच •

বাশারাণক গঠন:		
প্ৰিটিলাক্ল'ৰ স.উ.	(ন্যনতম বিশুদ্ধতা ১৪% ও/ও স.উ.)	80.000% 9/8
ইমালচিফাইং এজেন্ট	(ইথক্সিলেটেড ভেজিটেবল অইল)	8.800% 9/9
<i>বেটিং এজেন্ট</i>	(এলকিল এৰিল চালফ'নেট	
	অব কেলচিয়াম চল্ট)	0.600% 9/8
ষ্টে বিলাইজাৰ	(ইপক্সিডাইজ্ড ভেজিটেবল অইল)	0.000% 9/8
দ্রারক চি- ১		বাকী পৰিমাণ
মুঠ		\$00.000% 6/6

সারধানতা:১ লেবেল আৰু লিফলোটত থকা নির্দেশনাত উল্লেখিতর বাহিৰে অন্য উদ্দেশ্যত ব্যৱহাৰ নকৰিব । ২. চপোৱাৰ পিছৰ প্ৰয়োগৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে । ৩. লিফ লেটত দিয়া নিৰ্দেশনা অনুসৰি পাত্ৰসমূহ ব্যৱহাৰৰ পিছত নষ্ট কৰি পেলাব । ৪. এই উৎপাদক ছাল আৰু চকুৰ বাবে যন্ত্ৰণাদায়ক, সেয়েহে ছাল আৰু চকুৰ সংস্পৰ্শৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা উচিত। ৫**.খালী পাত্ৰবোৰ পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো বিপদজনক।**

ഡിലീറ്

പ്രെട്ടിലാകോർ 50% ഇസി (കളകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നശിപ്പിക്കുന്ന കളനാശിനി)

പ്രീതിലാക്ളോർ 50% ഇസി വാർഷിക പു ക്രർ, കോരപ്പു ക്രർ, പരന്ന ഇലകളുള്ള കളകൾ എന്നിവക്കെതിരെ ഒന്നാന്തരം പ്രവർത്തനമുള്ളതും, കളകളെ തിഞ്ഞെടുത്തു നശിപ്പിക്കുന്നതും, കളകൾ മുളു പൊന്തുന്നതിനു മുമ്പ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതുമായ ഒരു പയോഗ കലനാശിനിയാണ്.

tervingtewig.

വിളകൾ	കളകളുടെ	gn	ധാസ്/ഹായ്	∌o [™]	അവസാന തളിക്കും വിള വെടുപ്പിനും ഇടയ്ക്ക് കാത്തിരുപ്പ് സമയം (ദിവസം)
-	സാധാരണ പേര്	സ.ഘ. ഗ്രാം	ഫോർ മുലേഷൻ (മി.ലി.)		
	എക്കിനോ വേ ക്രസ്ത് ?! എക്കി നോ വേ കൊട്ടോണം, തെപൊന്ന് യൂക്കി നോ നെപോണ് യൂരിയ, എക്ക്ലിപ്റ്റ് അർബ, ല്യസ്വീജിയ പരീവീജയ പരീവീജയ പരീനർജ്ഞിന്, മോട്രോ വേ ചരിനെർത്തിന്, മോട്രോട്രോ	500- 750	1000- 1500	500 - 750	75-90

. **പുനപ്രവേശന കാലയളവ്** : 24 മണിക്കൂർ.

ഉപയോഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ: വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് സ്പ്രെയറിന്റെ അം അനുസരി " ഇരിക്കുന്ന സ്പ്രെയരറുകൾ -നാപ്സാക് സ്പ്രെയർ, കസ്രഷൻ നാപ്സാക് സ്പ്രെയർ, കസ്രഷർ നാപ്സാക് ബാമറി സ്പെയർ. ഫാമ് ഫാനാം ഫഡ്ജമ് നോസിലാം ജൈത്.

രംവസത്ത വാറ്ററ്റ സ്വേധത്ത് ക്ലാറ്റ് ചാവും ബ്ലയക്ക് സോഗ്വര്യ ഉള്ളത. പ്രതോഗ അതോ പറി നൂട്ട് 5 ദിവനത്തികം കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങൾ (പൊതുവെ): മഴയും കാറ്റും ഉള്ളപ്പോഴും നല്ല ചുടും വെയിലും ഉള്ളപ്പോഴും തളി നടത്തരുത്.

പ്രായോഗ സമയത്തുളള വിളയുടെ ഘട്ടം : നെൽക്കൂഷ് പറിച്ചുനട്ടതിന് ശേഷം 0-5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കളകൾ മുളച്ച് പൊന്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള തളി ആയി ഉപയോഗിക്കുക.

പ്രയോഗ സമയം: രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അണ് നലത്. പ്രയോഗ രീതിയും സമയവും : ഉൽപന്നത്തിന്റെ ആവശ്യമായ അളവ് അളന്നെടുക്കുക. ഒരു ചെറിയ അളവ് വെള്ളത്തിൽ നന്നായി കലർത്തുക. നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ട് നിർദിഷ്ട അളവിൽ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം ചേർക്കുക. ഒരു ഹെക്ടറിന് ആവശ്യമാ വേളളത്തിന് ആനുപാതികമായി ഉൽപന്നത്തിന്റെ അളവ ക്രമീകരിക്കുക, പറിച്ചുനട്ടതിന് ശേഷം 0 -5 ദിവസത്തിനുള്ളിര കളകൾ മുളച്ച് പൊന്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള തളി ആയി ഫ്ലാറ്റ് ഫാൻ നോസൽ ഘടിപ്പിച്ച നാപ്സാക്ക് സ്പ്രേയർ ഉപയോഗിച്ച് തളിക്കുക. ഈ കളനാശിനി പ്രയോഗത്തിന് ശേഷം നെൽവയലിലെ വെളളം ഒലിച്ചു പോകാൻ അനുവദിക്കരുത്. പ്രയോഗത്തിന് ശേഷം 24 മണിക്കൂർ വരെ വയലിൽ വെളെം കയവുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

ആവൃത്തി: പറിച്ചുനട്ടതിന് ശേഷം 0-5 ദിവസങ്ങൾക്കിടയിർ കളക്ൾ മുളച്ച് പൊന്തുന്നതിന് മുമ്പുളള തളി ആയി പ്രയോഗിക്കുക. പരമാവധി തളിയുടെ എണ്ണം ഒന്ന് ആണ്

മുൻകരുതൽ: 1. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ, ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ കാലിത്തീറ എന്നിവയിൽനിന്നും ദുരെ മാറി സുക്ഷിക്കണം. 2, വായ, കണുകൾ, ചർമ്മം എന്നീ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ ആകാതെ സൂക്ഷിക്കണം. 3. തളി ബാഷ്പം ശ്വസിക്കുന്നത ഒഴിവാക്കാക. 4. തടികഴിഞ്ഞ ശേഷം മലിനമായ വസ്തങ്ങളെം ശരീര ഭാഗങ്ങളെം ന വണം കഴുകണം. 5. തളി നടക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നിന്നുകയോ, കുടിക്കുകയോ മുറുക്കുകയോ, പുകവലിക്കുകയോ അരുത്. 6. തളിദ്രാവകം ചേർക്കുമ്പോഴും

ത്തനീച്ചുകൾ പോലെ മിത്രകീടങ്ങൾക്കും കീടങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ശത്രുക്കൾക്കും ഹാനി ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ:

വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ: തലവേദന, മന്ദത, തലകറക്കം, പകപ്പ്, ഓക്കാനം, ചാർദി

പ്രഥമ ശുശ്യഷ: 1) അകന്നുപോയാൻ തൊണ്ടയിൽ ഇക്കിളിയിട്ട് ചമർദ്ദിപ്പിക്കുക. ചമർദ്ദി വെള്ളം പ്രമാര ആന്യക്ക് 1) അക്ക്യവായത്ത താരത്തിൽ ഇതിത്രത്ത്വ മാർട്ടിപ്പിലുകൾ ചാർട്ട് വേളം അത്രിയുന്നതുടെ ഉത് ആവർത്തിക്കുകൾ താർട്ടിൽ തോടെക്ക് തനായിട്ടിളുടെങ്കില് മാർട്ടിക്കാർ പ്രവീദ്ധിക്കാര്യൻ . 2) വന്ത്രത്ത്വോ ചിത്രമാര്യം മിന്ന്മായൻ വന്ത്രത്തിൽ മാറ്റുക, കാടിനായായ പര്യമാര്യൻ പ്രത്യാക്ക് പരിച്ച് കണ്ണുകൾ 1) പ്രത്യാക്ക് ആരം 4) ത്യെയ്ക്ക് അയൻ വാത്യോ നടര്ക്കില്ലെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ണുകൾ 10-15 വന്റിട്ട് കുറുകം 4) വുന്നിക്കാൻ (ഉത്തായർ രോഗിക്ക് വുന്നുകൾ) പ്രവീദ്ധവായുടെ എത്തെങ്കില്ലാം ഉത്തായർ രോഗിക്ക് വ്യവസാവര് എത്തിക്ക് പരിച്ച് പരിച്ച് പരിച്ചുകൾ (വിഷവായവാരുകൾ) പ്രവീദ്ധവായുടെ എത്തെങ്കില്ലാം പ്രവീദ്ധവായുടെ എത്തെങ്കില്ലാം പരിച്ച് പരിച്ചായുന്ന് പരിച് പരിച്ച് പരവരിച്ച് പരിച്ച് പരിച്ച് പരിച്ച് പരിച്ച് പരിച്ച് പരിച് പരിച്ച് പരിച്ച് പരിച്ച് പരിച്ച് പരിച്ച് പരവരിച്ച് പരവരിച്ച് പരവരിച്ച് പരിച്ച് പരവരിച്ച് പരവരിച്ച് പരവരിച്ച് പരിച്ച് പരിച്ച് പരവരിച്ച് പരിച്ച് പരിച്ച് പരവരിച്ച് പരവരിച്ച് പരവരിച്ച് പരവര്യ പരവരിച്ച് പരിച്ച് പരവരിച്ച് പരവര്യ പരിച്ച് പരവരിച്ച് പരിച്ച് പരവരിച് പരവരിച്ച് പരവരിച്ച് പരവരിച്ച് പരവര്യ പരവരിച്ച് പരിച്ച് പരിച്ച് പരവര്യ പരിച്ച് പരവര്യ പരിച്ച് പരിച്ച് പരവര്യ പരവര്യ പരിച്ക് പരവര്യ പരവര്യ പരവര്യ പരിച്യ പരിച്ച് പരവര്യ പരിച്ക് പരവര്യ പരവര്യ പരവര

മറുമരുന്ന്: പ്രത്യേകം മറുമരുന്ന് അറിവിലി . ലക്ഷണമനുസരി " ചികിത്സിക്കുക

കണ്ടെയ്നറുകൾ കളയുന്ന വിധം: 1) പാക്കേജുകൾ പൊട്ടി ്ജനവാസമി തെതിടത്ത് കാഴി 1ടണം. 2) വീണ്ടാം പെയോഗിക്കാൻ ടെവരത്തക്ക വിധത്തിൽ പെയോഗം കഴിഞ്ഞ പാക്കേജുകൾ വെളിയിൽ ഇടരുത്. 3) പാക്കേജുകൾ, അധികം വന്ന വസ്തുക്കൾ, കഴുകിയ വെള്ളം തുടങ്ങിയവ പരിസ്ഥിതിക്കും ജല വിഭവങ്ങൾക്കും മലിനീകരണം സംഭവിക്കാന്ന മീതിയിൽ വേണം കളയുവാൻ.

സൂക്ഷിച്ച്: 1) കളനാശിനി അടങ്ങിയ പാക്കേജുകൾ, മറ്റു സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന a. (റികളിൽനിന്നും കെട്ടിടങ്ങളിൽനിന്നും ദുരെ മാറി പ്രത്യേകം മുറികളിലോ കെട്ടിടങ്ങളില തുക്ഷിക്കണം. അടെ ങ്കിൽ കളനാശിനിയുടെ അളവും അവും അനുന്നരി ് പ്രത്യേക അലമാരകളിൽ അട പ്രവട്ടി സൂക്ഷിക്കുകയും ആകാം. 2) കളനാശിനി സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുറികളും കെട്ടിടങ്ങളും ന കെട്ടുറപ്പുള്ളവയും ഈർപ്പം ഇ ത്തവയും . വാഷ്പം മൂലമുള്ള മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വെളി വും ആവശ്യത്തിന് വലിപ്പവും ഉള്ളവയും ആയിരിക്കണം. മാസഘടന

പ്രീതിലാക്ളോർ	(മിനിമം പ്യൂരിറ്റി 94% W/W സ.ഘ.)	50.000% W/W	2
ഇമൾസിഫയിംഗ് ഏജന്റ്	(എത്തോക്സിലേറ്റഡ്		
	വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ)	4.400% W/W	7
വെറ്റിംഗ് ഏജന്റ്	(കാൻഷ്യം സാൾട്ടിന്റെ		0
	ആൽകൈൽ അഹൈൻ സാൾട്ട്)	3.600% w/w	6(
സ്റ്റെബിലൈസർ	(എപോക്സിഡൈസ്ഡ്		
	വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ)	3.000% W/W	ą
ലായകം C-IX		ആവശ്യത്തിന്	
® ල බෙක		100.000% w/w	9
ജാഗത : 1. ലേബലി	ിലും ലഘുലേഖകളിലും നാറിപ്	ി ചിടുളെവയിൽ	69

അല്ലാതെ മറ്റു. ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത് 2. വിളവെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത് 3. ലഘുലേഖയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുളളത് പോലെ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം കണ്ടെയ്നർ നശിപ്പിക്കുക. 4. ഈ ഉല്പന്നംചർമ്മത്തിനും കണ്ണുകൾക്കുംഅസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. അത് കൊണ്ട് ചർമ്മത്തിലും കണ്ണുകളിലും ആകുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. 5. **ഒഴി** കണ്ടെയ്നറുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്.



ପ୍ରିଟିଲାକ୍ଟୋର୍ ୫୦% ଇ.ସି. ହେଉଛି ଏକ ବଛା ବଛା ଗଳେଇବା-ପୂର୍ବ ବ୍ୟାପକ କ୍ରିୟାଶୀନ କ୍ଷୁପନାଶକ, ଯାହା ବାରମାସିଆ ଘାସ, ବୃଦା ଆଉ ଚଉଡ଼ାପତ୍ତିଆ ବାଳୁଙ୍ଗା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରେ।

ଶସ୍ୟ	ବାକୁଙ୍ଗାର		ହେକ୍ଟର / ମାତ୍ର	1	ଶେଷ ସିଞ୍ଚନ
	ଜଣାଶୁଣା ନାମ	ସ.ଭ.	ଫର୍ମୁଲେଶନ୍	ମିଶାଇବା	ପରଠୁ ଅମଳ
		(ଗ୍ରାମ୍)	(ମି.ଲି.)	(ଲିଟର)	ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର
					(ହିତସ)
ତୁଆଯାଇଥିବା	ଏକିନୋକ୍ଲୋଆ କ୍ରସ୍ଗାଲି,	800-	6000-	800-	98-
위8	ଏକିନୋହୋଆ କୋଲୋନମ୍,	980	6800	980	(%)
	ସାଇପେରସ୍ ଡିଫମିସ୍,				
	ସାଇପେରସ୍ ଇରିଆ,				
	ଫିୟିଷାଇଲିଶ୍ ମିଲିଆସିଆ,				
	ଏହିପ୍ଟା ଆଲ୍ବା,				
	କୁଡ଼ିଡ଼ିଗିଆ ପର୍ଜିଫ୍ଲୋରା,				
	ଳେପ୍ଟୋକୋଆ କିନେନ୍ସିସ,				
	ମୋନୋକୋରିଆ ଭାଜିନାଳିୟ,				
	ପାନିକମ୍ ରିପେନ୍ସ				

ପନଃପବେଶ ଅବଧ : ୨୪ ଘଣା

ପ୍ରୟୋଗ ବିଧ: ସେୟର ଉପରେ ମିଶାଇବା ପାଣି ପରିମାଣ ନିର୍ଭର କରେ। ପାଟ ଫ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରତ ଜେଟ ନୋଳକ୍ ଲଗା ନାପ୍ସାକ୍ ୟେଉର, କଣ୍ପେଶନ୍ ନାପ୍ସାକ୍ ୟେଉର, କଣ୍ପେଶନ୍ ନାପ୍ସାକ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ୟେଉର ଏଥ୍ପାଇଁ

ମସୋଗ ମମସ - ରଚି ରୋଇଚାର % ନିଜ ଲିଉରେ ।

ପାଣିପାଗ ହିଡି (ସାଧାରଣ ରୂପେ) : ବର୍ଷା, ପବନ ଏବଂ ଟାଣ ଖରାରେ ଏହାର ସିଞ୍ଚନ

ପ୍ରଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଫସଲର ଅବସା : ଧାନ ତଳି ରୋଇବାର ୦-୫ ଦିନ ଭିତରେ ଗଳେଇବା ପର୍ବ ପୟୋଗ ରପେ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତ ।

ପ୍ରୟୋଗ ସମୟ : ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଅନୁକୃକ ଅଟେ ।

ପ୍ରୟୋଗ ସମୟ ଏବଂ ପଦ୍ଧତି : ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଉତ୍ପାଦକୁ ମାପି ଅଳ ପରିମାଣର ପାଣିରେ ଇଲଭାତେ ମିଶାନ୍ତ । ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମାତାର ଚଳଳା ପାଣି ମିଶେଇ ଭଲଭାବେ ଗୋଳାନ୍ତୁ । ଏକ ଏକର ଜମିକୁ ସମ୍ପଶ୍ ରୂପେ ଆବରଣ କରିବା ନିମତ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣି ଅନୁପାତରେ ଉତ୍ପାଦର ପରିମାଣକୁ ଆଡ୍କଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଟ ଫ୍ୟାନ ନୋଳଲ ଲାଗିଥିବା ନାପସାଳ ଷେୟର ଉପଯୋଗ କରି ଧାନ ରୋଇବାର ୦ - ୫ ଦିନ ଭିତରେ ଗଳେଇବା ପର୍ବ ପୟୋଗ ରପେ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତ ତ୍ଶନାଶକ ପ୍ୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା ଧାନ ଜିମିର ପାଣି ନିଷାସନ କରନ୍ତ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଗ ପରେ ୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିକୁ ଜଳସେଚିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ବାରୟାରତା : ରୋଇବାର ୦-୫ ଦିନ ଭିତରେ ଗଳେଇବା ପୂର୍ବ ପ୍ରୟୋଗ ରୂପେ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରୟୋଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଏକ ।

ସଚକିତା : ୧) ଏହାକୁ ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ, ରିକ୍ତ ଖାଦ୍ୟପାତ୍ର ଓ ପ୍ରାଣୀଚରା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ମହକୃଦ କରଲୁ । ୨) ତୁଶରେ, ଆଖ୍ରେ କି ଦେହରେ ଲାଗିବା ଏଡ଼ାଲୁ । ୩) ସିଅନକଶ ଶ୍ୱାସରେ ଯିବା ଏଡ଼ାଲୁ । ପବନ ବୋହିବା ପଟରୁ ହିଁ ସିଅନ କରକୁ । ୪) ସିଅନ ପରେ ସଂକ୍ରମିତ ଭୂଗାପଟା ଓ ଅଙ୍ଗପ୍ତବଙ୍କ ଭଲକରି ଧୂଅକୁ । ୫) ସିଥିବା ବେଳେ ଖାନ-ପାନ, ଧୂମପାନ କି କିଛି ଚୋବାଇବା ଏଡ଼ାହୁ। ୬) ମିଶାଇବା ବେଳେ ଓ ସିଥିବା ବେଳେ ସରକ୍ଷାସକ ପରିଛବ ପିହତ। ମହମାଛି ଏବଂ କୀଟପୋକଙ୍କ ପାକ୍ତିକ ଶତ୍ର ଭଳି ଉପକାରୀ କୀଟପତଙ୍ଗଙ୍କ୍ କ୍ଷତି ନପହଁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲନ୍ଧ୍ୱନ କରନ୍ତ୍ରି ।

ବିଷାଭଚାର ଲକ୍ଷଣ : ମୁଣବିହା, ଅଳସୁଆଭାବ, ମୁଣସୂରା, ନର୍ଭସ୍ ଲାଗିବା, ଅଈ ଉଠିବା, ବାଞି ହେବା। ପ୍ରାଥମିକ ଉପଚାର : ୧) ପେଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତ୍ୟି ସାଉଁଳାଇ ବାହି କରାହୁ । ବାହି ସଫା ଦିଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଦୋହରାଡୁ । ରୋଗୀ ଅଚେତ ଥିଲେ, ବାଡି କରାଡୁ ନାହିଁ । ୨) କୁଗାପଟା ଓ ଦେହ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କୁଗାପଟା ଏହାଇଦେଇ ସାବୁନରେ ଦେହକୁ ଭଲରୂପେ ସଫାକରି ଧୂଅନୁ । ୩) ଆଖ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲେ କି ଲାଗିଗଲେ, ତ୍ରତ ଆଖ୍ଳ ୧୦-୧୫ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ ସାଲାଇନ୍/ସ୍ଥ ପାଣିରେ ଧୂଅନୁ । ୪) ଶ୍ୱାସରେ ଯାଇଥିଲେ, ସେହି ବ୍ୟକିଙ୍ ଖୋଳାପବନକୁ ନେଇଯାଆକୁ । ୫. ବିଷାଭତାର ଯେକୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ, ତୁରନ୍ତ ଡାଭରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତ ।

ବିଷୟ : କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ ବିଷ-ନିବାରକ ଜଣାନାହିଁ । ଲକ୍ଷଣାନୁସାରେ ଉପଚାର କରାଡ଼ ।

ରିକ୍ତ ପାତ୍ର ବିଧ୍ୟ'ସିକରଣ : ୧) ପ୍ୟାବେଜ୍ୱ ଭାଜିଭୂଜି ଲୋକବ୍ତି ଠାରୁ ଡ଼ରରେ ପୋଡିବେବା ଦରକାର । ୨) ବ୍ୟବହତ ପ୍ୟାକେଇ'ର ଅନ୍ୟ କାମରେ ଭଲରେ ଉପଯୋଗ ନହେବା ଲାଗି, ତାକୁ ବାହାରେ ଛାଡଡ /ଫୋପାଡଡ ନାହିଁ । ୩) ପ୍ୟାକେଳ୍, ବଳକା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଓ ଧୂଆଧୁଇ ପାଣିକୁ ନିରାପଦ ଭାବେ ନଷ କରିଦେବା ବରକାର, ଯେପରି ବାଚାବରଣ ବା ପାଣି ପଦଷଣ ଘଟିବ ନାହିଁ।

ମହକୃଦକରଣ: ୧) ଯୁପନାଶକ ଥିବା ପ୍ୟାକେନ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଅଲଗା ଏକ ସାନ ବା କୋଠରୀରେ ମହକୃଦ କରିବା ଜରୁରୀ, କିୟା ଏହାର ଗୁଣ ଓ ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏକ ଖଲି ଆଲମାରୀରେ ତାଲା ପକାଇ ରଖ୍ବା ଜରୁରୀ । ୨) ଷୁପନାଶକ ରଖ୍ବାକୁ ଥିବା ସାନ / କୋଠରୀଟି ମଜବୃତ, ଶୁଖ୍ଲା, ଆଲୋକିତ ଏବଂ ପଣ୍ଡୟ ହୋଇଥବା ବରଳାର, ଯେପରି ଏହାର ବାଷ ଯୋଗେ ସଂକମଣ ଘଟିବ ନାହିଁ ।

ରାସାୟକିଳ ସଂରଚନା

ପ୍ରଟଲାକ୍ଲୋର୍ ସ.ଭ.	(ଅନ୍ୟୁନ ଶୁଦ୍ଧତା	
	୯୪% ଓଳନ/ଓଳନ ସ.ଭ.)	୫୦.୦୦୦% ଓଜନ/ଓଜନ
ଅବଦ୍ରବକାରୀ ଘଟକ	(ଇଥୋକ୍ସିଲେଟେଡ୍ ଭେଜିଟେବଲ୍ ଅଏଲ୍)	୪.୪୦୦% ଓଜନ/ଓଜନ
ର୍ଗ୍ରେଣ ଏଜେଶ	(ଅଲ୍କାଇଲ୍ ଏରିଲ୍ ସଲ୍ଫୋନେଟ୍ ଅଫ କାଲ୍ସିଅମ ସଲ୍ଟ)	୩.୬୦୦% ଓଡ଼ନ/ଓଜନ
ଷାବିଲାଇଡର୍	(ଇପୋକ୍ସିଡାଇକ୍ଡ ଭେଜିଟେବଲ୍ ଅଏଲ୍)	୩.୦୦୦% ଓଜନ/ଓଜନ
ଦ୍ରାବକ ସି-ଆଇଏକ୍		ଶତାଂଶର ବାକି ମାତ୍ରା
ମୋଟ:	_	୧୦୦.୦୦% ଓଜନ/ଓଜନ
	_	

ସତର୍କ ସଚନା : ୧. ପତ୍ତିକାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫସଲ ଏବଂ କୀଟପୋକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଫସଲ କିୟା କୀଟପୋକ ଉପରେ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରିତା ଅନ୍ତିତ । ୨. ଅମକ ପର ପୟୋଗ ନିମନ୍ତେ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରିତା ଅନ୍ତିତ । ୩. ପତିକାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଅନସାରେ ପାତକ ନଷକରତ୍ତ । ୪.ଏହି ଉପାଦ ତତା ଏବଂ ଚକ୍ଷ ସଂସର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଜଳାପୋଡ଼ା କରେ, ତେଣୁ ତୃତା ଏବଂ ଚକ୍ଷ ସଂସର୍ଶରେ ଆସିବା ଏଡ଼ାନ୍ତ । ୫.ଖାଲି ପାତ୍ରର ପୁନଃର୍ବ୍ୟବହାର ବିପଦଜନକ ଅଟେ ।

ىرىتىلا كلور%♦۵اىس (گهاس پهوس مار دوا)

پریٹے لاکلور بز • ۵ای ک ایک چننے والی ،اگنے سے پہلے کثیر الاستعال جڑی بوٹی کش دواہے جوسالانہ گھاس چھوں، کائی اور چوڑے کے والی جڑی بوٹیوں پر قابو پانے میں شاندار کار کردگی دکھاتی ہے۔

	سمارسین.				
أخرى حيمر كاؤاور كثائي	مقدار/بهيكر			جڑی یوٹی کا	فصل
كەرميان انتظار	محلول كا	فامويش	اے۔آئی۔	عامنام	
(ولن)	يانی(ايثر)	(ایجایل)	(گرام)		
9+_40	200	101	200	اليحينو كلووا كروسككي	اصل کھیت
				اليحيية كلووا كولونم	میں دھان
				سائيرس ڈيفارمس	
				سائيرس امريا	
				فمبرى شائلس مليسي	
				ايكلينااليا	
				لڈویچیا بلوی فلورا	
				ليپو کلووا چينس	
				مونو چوريا ويحبينالس	
				پینکیم رینس	
			h. #	1- 1-1	

دوبارہ داخلہ کا وقفہ: چوبیس گھنٹے کے بعد

استعمال كيلئر هدايات: ياني كى مقداراسرير كي تم ير مخصر بي سيك ا سپریئز، کامپریش نیپ سیک امپریئز، کامپریش نیپ سیک بیژی اسپریئز جن کے ساتھ فلیٹ فین اور فلڈ جیٹ نوزل لگا ہو۔

استعمال کا وقت: اصل کیت میں فصل اگانے کے بعد ۵ دن کے اندر۔ موسمی حالت (با لعموم): بارش،تیز بوا اور تیز گرمی کے دوران استعمال نہ کریں۔ دوا کے جهڑکاؤ کے لئے فصل کا مرحله: دهان کی فصل میں پودوں کی منتقلی کے 5-0 دن کے درمیان حشرات کے ظاہر ہونے سے پہلے دوا کا چھڑکاؤ کرس۔

دوا کے چھڑکاؤ کا وقت: ترجیحی طور پر صبح اور شام کے وقت دوا کا چھڑکاؤ کرس۔ **چھڑکاؤ کا طریقہ اوروقت:** دوا کی مطلوبہ مقدار کی پیمائش کریں اور اسے تھوڑی مقدار میں پانی کے ساتھ اچھی طرح مکس کریں۔ بقیه پانی کی مقدار کو اچھی طرح بلا کر شامل کریں۔ ایک ہیکٹر کو کور کرنے کے لیے مطلوبہ پانی کے تناسب میں دواکی مقدا کو ایڈجسٹ کریں۔ چپٹے پنکھ کی ٹونٹی سے لیس نیپ سیک اسپریٹر کا استعمال کرتے ہوئے پودوں کی منتقلی کے 5-0 دن کے درمیان حشرات کے ظاہر ہونے سے پہلے دوا کا چھڑکاؤ کریں۔ اس ہربیسائیڈ کے چھڑکاؤ کے بعد دھان کے کھیت سے پانی نہ نکالیں۔ چھڑکاؤ کے 24 گھنٹوں تک کھیت میں زبادہ پانی نه بھرس۔

تو اتر: یودوں کی منتقلی کے 5-0 دن کے درمیان حشرات کے ظاہر ہونے سے پہلے دوا کا چهژگاؤ کریں۔ زیادہ سے زیادہ ایک مرتبه دوا کاچهڑکاؤ کریں۔ احتياط: الحماني اشياء، كهاني كفالى برتنول اورجانورول كے جارے سے دور ركيس ۲_ دواکومنه ، آنکھوں اور جلد برند گلنے دیں۔ ۳_ چیٹر کاؤ کی بوندوں میں سانس نہ لیں ۔ ہوا جلنے کی طرف ہی چیٹر کاؤ کریں۔ ۴۔ چیٹر کاؤ کرنے کے بعد آلودہ ہوئے کیٹروں اورجیم کے حصول کو اچھی طرح دھوئیں۔ ۵۔چھڑ کا ؤ کرتے وقت نہ کچھ کھا ئیں پیٹیں اور نہ ہی سگریٹ نوثی کریں۔

۲ _ ملاتے اور چیٹر کا ؤ کرتے وقت تمام حفاظتی لباس پہنیں _ احتیاط سے کام لیں تاکہ مفید کیڑے مکوڑے جیسے شہد کی مکھیوں اور مضر کیڑوں کے نشمن کیڑے محفوظ رہ سکیں۔

زهریلر اثر کی علامات: سردردستی، چکر،گسراك، تلی،ق بونتی ہے۔ فوست اید: انگاجانے رحلق کے اندر گدگدی کرے تے کرنے کیلئے مت اکسائیں. ایبا کرنا دوہراتے رہیں جب تک کہ تے کا یانی صاف نہ ہوجائے۔اگر مریض ہے ہوش ہے تو قے کرنے کیلئے اکسائیں۔۲۔ کپڑے اور جلد آلودہ ہوجائے تو کپڑے اتار کر جلد اور کپڑوں کو ڈ حیروں بیانی وصابن سے دھوڈ الیس۔ ۳۔ اگر آنگھول پراٹر ہوا ہوتو ۱۰ سے ۱۵ منٹول تک صاف یانی سے دھوتے رہیں۔ ۴۔ دواکوسونگھ لیا ہوتو مریض کوتازہ ہوامیں لے جائیں۔ ۵۔ زمبر خوراکی کی کسی بھی علامت ظاہر ہونے کی صورت میں، فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرس۔

ترياق: كى مخصوص ترياق كے بارے ميں علمنبيں ہے۔علاماتی علاج كرائيں۔ خالى كىنىتىدوں كوضائع كرنا: ١-خالىكنىترولكور چوركرسى دور ز مین میں گا ژ کرضائع کردیں۔ ۲۔خالی کنٹینروں کو باہر نہ پڑے رہنے دیں تا کہ دوبارہ استعمال نہ ہوں۔ ۳۔ پیکیوں اور فالتونی رہی دوااور مثینوں سے فکلے دھونے کے گندے پانی کا نیٹارااس طرح حفاظت ہے کریں کہ ماحولیات اور یانی کی آلودگی نہ ہو۔

است وريج كى حالت: جرى بوئى ش دواك يكون كوديكراشياء خاص كرك كهاني ك اشیاءر کھنے والے کمرے سے دوریا دوا کی قتم اور مقدار کے حساب سے الگ الماری میں تالا لگا لررکیس - ۲- بیمقام مضبوط ہے ہوئے ، انچھروثنی دار ، ہوادار ، محفد کے اور سو کھے و بڑے سائز کے ہوں تا کہ بھاف ہے آلودگی نہ پھیلے۔

> كيمياوي مركب: ىرىيىلا كلورا ___ آئى _ (کم از کم نفاست بر ۹۴ وزن/ وزن اے۔ آئی۔)

ايملسي فائتك ايجنث بر ۲۰۰۰م یم وزن/ وزن (ایتھاکسی لیڈیڈ بنسپتی تیل) وبثننگ! يجنث (الكائل ارائل سلفونىية آف كيلثيم سالث) × ۲۰۰۰ وزن/وزن

× ۰ ۰ ۰ ، ۵ وزن/ وزن

اسٹیبلائزر (لەپىكاكىي ۋائز ۋېنىپتى تىل) برور در سروز ن/وزن • • ابنانے کیلئے کیؤ ۔ ایس۔ سالونىپەى -IX بروزن/وزن/وزن

خمرداریان: البیل راغافه شی دی گی خوان و رسین کا دود بگرخون براس کا استعال کرنامختا ہے۔ فیصل کا ٹے کے بعدان کا استعال نہ کریں۔ 3. ير في يردن بيان ك مطالق استعال كے بعد كانتيز كو برياد كرديں - 4 ميرود كس جلدوات تكون كيليم كرك ب،اسليم التكون وجلدكور اطے کا کیں۔ 5 دوا کے خالی ڈبوں کو دوبارہ استعمال کرنا خطرناک ہے۔

Read the instructions before use

उपयोग से पहले सुचना पत्रिका पढें For Agricultural use only केवल कृषि उपयोग के लिए

Delete Pretilachlor 50% E.C. (Selective Herbicide)

डिलीट

प्रेटिलाक्लोर ५० प्रतिशत ई.सी. (चयनात्मक खरपतवारनाशक)



Copyright ©, Trademark and all Rights Reserved by Godrej Agrovet Limited 2024.

Manufactured and Marketed by : Godrei Agrovet Limited, Read, Office Godrej One, 3rd Floor, Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (East), Mumbai-400079, Maharashtra, India. Manufacturing Premises: Lane No, 7, Indl. Growth Centre, Samba, Jammu-184121, J&K, India.

निर्माता और विपणनकर्ता: गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड, रजि. ऑफिस: गोदरेज वन, तीसरी मंजिल, पिरोजशाह नगर, इर्स्टन एक्सप्रेस हाइवे, विक्रोली (प्), मुंबई - ४०० ०७९, महाराष्ट्र, इंडिया। उत्पादन परिसर: लेन नं.७, इन्डस्टीयल ग्रोथ सेन्टर, साम्बा, जम्मू-१८४१२१, जम्मू एन्ड कश्मीर, भारत ।

In case of complaints, please contact our customer service executive at the Registered Office address of the Manufacturer and Marketer or email at gavlho@godrejagrovet.com or call us at 022 -2519 4491 (Call between 9:30 am - 5:30 pm, Mon - Fri, Business days) Website: www.godrejagrovet.com

शिकायतों के मामले में, कृपया निर्माता और विपणनकर्ता के पंजीकृत कार्यालय के पते पर हमारे ग्राहक सेवा कार्यकारी से संपर्क करें या ईमेल करें gavlho@godrejagrovet.com या हमें ०२२ –२५१९ ४४९१ पर कॉल करें (सबह ९:३० से शाम ५:३० बजे के बीच सोमवार से शुक्रवार. व्यावसायिक दिनों, में संपर्क करें) वेबसाइट: www.godrejagrovet.com











