READ LEAFLET BEFORE USE.

GRACIA

FLUXAMETAMIDE 10% w/w EC
CONTACT INSECTICIDE

Fluxametamide 10% w/w EC is a novel Isoxazoline insecticide effective against a cross spectrum of chewing and sucking pests. It is a gamma-aminobutyric acid (GABA) - gated chloride channels (GABACIs) antagonist. It is contact insecticide and effective through ingestion and contact.

Application and dosage recommendations:

Crop	Common Name of Pest	Dosage per Hectare			Waiting period (Days)
		a.i (g)	Formu-lation (ml)	Dilution in Water (Litre)	
Brinjal	Leaf hopper - Amrasca biguttula Biguttula, Thrips - Thrips palmi, Fruit & shoot Borer – Leucinodes orbonalis	40	400	500	5
Cab-bage	Diamond back moth- Plutella xylostella Tobacco caterpillar - Spodoptera litura Semilooper - Thysanoplusia orichalcea	40	400	500	5
Chilli	Thrips- Scirtothrips dorsalis, Fruit borer- Helicovepra armigera Tobacco caterpillar- Spodoptera litura	40	400	500	5
Okra	Leaf hopper — Amrasca biguttula biguttula, Thrips - Scirtothrips dorsalis Fruit Borer - Helicovepa armigera	40	400	500	5
Red gram	Spotted pod borer- Maruca testulalis Pod borer - Helicoverpa armigera	40	400	500	28
Tomato	Thrips - Thrips tabaci Fruit borer - Helicovepra armigera	40	400	500	5

Direction for use: Measure out the required quantity of Fluxametamide 10% w/w EC and mix well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as per the spray volume required with thorough agitation.

Time of Application: Apply Fluxametamide 10% w/w EC when pest reaches economic threshold level.

Application Techniques: Should be applied as foliar spray.

Spray Equipment: Use high volume spraying equipment, such as knapsack sprayer, Taiwan sprayer and foot sprayer etc. ensuring thorough and uniform coverage.

Purpose: For Agricultural use only.

Dosages: Refer to the recommendation table.

Instructions for mixing: Measure out required quantity of the insecticide and mix it well with small quantity of Water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crop with suitable sprayer.

Application Timing: No restriction. Avoid application under high wind, before rain.

Crop Stage: Insecticide should be sprayed at any stage of crop growth when pest reached economic threshold level.

Frequency including Maximum Number of sprays: Refer to the above recommendation 2-3 sprays are required at the interval of 7-14 days depending upon the pest infestation.

Stages during which pesticide should not be applied for on any crop: Refer to the above recommendation only.

Phytotoxicity: Not- phytotoxic when used as recommended dosage.

Re-entry Period: 24 hours after spray.

Pre- harvest Index (PHI): Refer to the above recommendation only.

Weather Condition: Weather should be clear, calm, no rains and no strong winds. Avoid applications hot weather and moisture stress conditions:

Soil & Water: No specific soil conditions are prescribed. Cleam water to be used for spray.

Spraying Instuction: Spray uniformly in direction of wind. Ensure thorough coverage of the weeds.

Disposal of Empty Containers: 1. The packages shall be broken and buried away from habitation. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re- use. 3. It shall be the duty of manufacturer / formulators and operators to dispose packages or surplus material & washings from the machine and container shall be disposed-off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution

Storage Condition: 1. The packages containing the insecticide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles, away from the reach of children and livestock, animal feed or shall be kept in a separate almirah under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well-lit, and ventilated and of sufficient dimensions so as to avoid contamination with vapors.

Symptoms of Poisoning: Vomiting, Decreased appetite, Itching, Diarrhea, Excessive thirst, lethargy, Muscle Tremors and mild Ataxia like symptoms may occur.

Safety Precautions: 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes, and skin. 3. Avoid inhaling the insecticide spray mist. 4. Wear full protective clothing, while handling. 5. Wash thoroughly the contaminated clothes and body parts after handling. 6. Do not eat, drink or smoke while applying.

First Aid: 1. **Inhalation:** Remove casualty for fresh air and keep at rest. 2. **Skin Contact:** Clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. If skin irritation occurs: Get medical advice. 3. **Eye Contact:** In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical attention. If eye irritation persists: Get medical advice. 4. **Ingestion:** Rinse mouth. Give 1or 2 glasses of water if patient is alert and conscious seek medical advice immediately and show this container or label.

Antidote: Treat based on judgment by physician in response to symptoms of patient. No specific antidote is known, treat symptomatically.

Cautionary Statement: Not to be used on crops other than mentioned on this label/leaflets. Not to be used for post-harvest applications. Hazards to humans and domestic animals. Destroy the container after use as directed on leaflet. This product is very toxic to aquatic invertebrates and fishes, thus the product containing the molecule may be avoided near the aquaculture.

Chemical Composition:

CONSTITUENTS :	% w/ w
Fluxametamide a.i.	10.00
3-methoxy-N, N-dimethyl propionamide	40.00
Polyoxy ethylene alkylphenyl ether, Alkylaryl sulfonate	5.00
Aromatic Solvent (C10 – C13)	Q.S.
Total	**100.0**

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें.

ग्रासिया

फ्लूक्सामेटामाईड १०% भा./ भा. ई.सी.
(स्पर्शीय कीटनाशक)

फ्लूक्सामेटामाईड१० % भा./ भा. ई.सी. एक अनूठा इसोक्साजोलाइन कीटनाशक है जो चबाने एवं चूसने वाले कीटों के प्रति प्रभावी है। यह एमिनों ब्यूटारिक एसिड (GABA) एवं क्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चेनेल्स (GABACIs) का एक प्रतिपक्षि है। यह एक स्पर्शीय कीट नाशक है जो उदर विष व स्पर्श प्रभाव से असर करता है।

प्रयोग के लिए सिफारिशे :

फसल	कीट का नाम	मात्रा प्रति हेक्टर			आखिरी छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन मे)
		स.त. (ग्रा.)	संरचना (मि.ली.)	पानी की मात्रा (ली.)	
बैंगन	तेला–अमरास्का बिगुटुला, चुरदा– थ्रिप्स पालमी, तना व फल छेदक इल्ली– ल्यूसिनोडिस ओरबोनेलिस	४०	४००	५००	५
पत्ता गोबी	हीरक पतंगा– प्लुटेला जायलोस्टेला तंबाकू पत्ता भक्षक इल्ली– स्पोडोप्टेरा लिटुरा सेमू लूपर– थाईसानोपलूसिआ ओरीचालसीई	४०	४००	५००	५
मिर्च	चूरदा–स्क्रीटोथ्रीप्स डोरसेलिस, फल छेदक– हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा तंबाकू पत्ता भक्षक ईलली– स्पोडोप्टेरा लिटुरा	४०	४००	५००	५
भिण्डी	तेला–अमरास्का बिगुटुला चुरदा– थ्रिप्स टेबेकी फल छेदक – हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा	४०	४००	५००	५
अरहर	चित्तिदार फली छेदक – मारुका टेस्टुलेलिस फली छेदक – हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा	४०	४००	५००	२८
टमाटर	चूरदा– थ्रिप्स टेबेकी फल छेदक– हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा	४०	४००	५००	५

उपयोग के लिए निर्देश: छिड़काव के घोल की आवश्याक मात्रा लीजिए, ओर उसे थोड़े पानी के साथ अच्छी तरह मिलाईए। फिर छिड़काव घोल की आवश्याक मात्रा के अनुसार बाकी पानी की मात्रा को अच्छी तरह हिलाकर घोल बनाईए।

प्रयोजन: कृषि उपयोग के लिए।

आवेदन का समय: कीट की संख्या हानि स्तर के ऊपर जाने पर फ्लूक्सामेटामाईड १०%भा/भा ई.सी. का प्रयोग करें।

छिड़काव यंत्र: हाई वाल्यूम स्प्रेयर जैसे नैपसेक स्प्रेयर, ताइवान स्प्रेयर और फुट स्प्रेयर आदि के प्रयोग करें जिससे पूर्णतया एवं एक समान छिड़काव सुनिश्चित हो।

आवेदन तकनीक: छिडकाव ही करना चाहिए।

खुराक : ऊपर दिए गए परामर्श का पालन करें।

मिश्रण संबंधी निर्देश : निश्चित मात्रा में लीं हुई कीटनाशक को पहले थोडे पानी में डाल कर घोल लें तत्पश्चात आवश्यक पानी डालकर पूरा घोल बना लें व अच्छी तरह हिला लें।

छिडकाव संबंधी निर्देश: छिड़काव करते समय ध्यान रखें की हवा का रूख सामने से अपनी तरफ नहीं हो।

उपयोग का समय निर्धारित: निर्धारित नहीं है। तेज हवा व बारिश होने की संभावना हो तो छिडकाव नहीं करना चाहिए।

फसल की अवस्था: फसल वृधि के किसी भी स्तर पर जब कीट की संख्या आर्थिक हानी स्तर के उपर जाने कीटनाशक का पर्णीय छिडकाव करें।

प्रस्थिति जिसके दौरान कीटनाशक किसी फसल पर अनुपयुक्त नहीं होंगें: ऊपर दिए गए परामर्श का पालन करें।

आवृत्ति जिसके अंतर्गत छिडकाव की अधिकतम संख्या: उपरोक्त अनुशंसा का संदर्भ से २ से ३ बार आवेदन ७ से १४ दिनों के अन्दर कीटों की संख्या आधार पर करें।

मौसम की स्थिति : कीटनाशक का छिडकाव के समय मौसम साफ, शांत हो तथा बारिश व तेज हवा ना हों।

मृदा व जल: मिट्टी की कोई विशिष्ट स्थिति निर्धारित नहीं है। छिडकाव के लिए साफ पानी का उपयोग किया जाना चाहिए।

पौध विषाक्तता : सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह पौध विषाक्त नही है।

पुन: प्रवेश अवधि: छिडकाव के २४ घंटे बाद।

पादप विषता: फ्लूक्सामेटमईड १०% भा./ भा. ई.सी.का सुझाव के अनुसार प्रयोग करने से फसल को कोई हानी नही पहुँचती है।

खाली डिब्बों का निपटारा: . १.खाली डिब्बों को उपयोग के बाद तोड़ कर आबादी से दूर जमीन में गाढ़ दें। २. उपयोग के बाद खाली डिब्बों को दुबारा उपयोग में न आए अत: बाहर खुला न छोड़ो। ३. यह कीटनाशक निर्माता,विपणनकर्ता व उपयोग करने वाले सभी महानुभाओ का कर्तव्य है वे उपयोग किए हुए डिब्बों का या बचे हुए कीटनाशक तथा साधनों के धोवन का निपटारा सुरक्षित ढंग से करें जिससे वातावरण या पानी प्रदूषित न हो।

भंडारण: कीटनाशक के डिब्बों का भंडारण खाद्य पदार्थों, आहार, पेय, बीज भंडारण हेतू प्रयुक्त किए जाने वाले कमरों या परिसरों से अलग कमरों या परिसर में किया जाना चाहिए अथवा कीटनाशकों की मात्रा एवं प्रकृति के अनुसार इन्हे अलग अलमारियों मे ताला बंद करके रखना चाहिए। कीटनाशकों के भंडारण के कमरे या परिसर अच्छी तरह बने हुए, सूखे, अच्छी रोशनी व हवा वाले तथा पर्याप्त बड़े आकार के होने चाहिए ताकि कीटनाशक की भाप से प्रदूषण न हो।

विष के लक्षण : उल्टी,भूख में कमी, खुजली, दस्त,अत्यधिक प्यास,सुस्ती,मांसपेशियों में कंपन,हल्का गतिविभ्रम आदि जहर के लक्षण हो सकते हैं।

सुरक्षा सावधानियां : १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तनों और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुँह, त्वचा और आंखों के सम्पर्क से बचाये। ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचाये। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नही चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहने।

प्राथमिक उपचार: (अ) **सूंघे जाने पर :** मरीज को ताजी हवा मे ले जाये व आराम कारायें। (ब) **त्वचा के सम्पर्क मे आने पर :** यदि कपड़े एवं त्वचा दूषित हो जाये तो दूषित कपड़ो को अलग करें एवं दूषित त्वचा को साबुन एवं पानी की भरपूर मात्रा से धोयें। यदि त्वचा मे जलन हो तो चिकित्सक की सलाह ले। (स) **आंखों के सम्पर्क मे आने पर :** काफी मात्रा मे पानी से धोयें। यदि दर्द, जलन आदि लंबे समय तक रहे तो चिकित्सक की सलाह लें (द) **निगले जाने पर :** पानी से मुहँ मे कुल्ला करायें। यदि व्यक्ति सजग एवं सतर्क हो तो १ या २ गिलास पानी पीने के लिये दें। चिकित्सक को बुलायें और कीट नाशक का डिब्बा या लेबल को दिखायें।

विषनाशक: चिकित्सक रोगी के लक्षणों के आधार पर उपचार का निर्णय लें। कोई विशिष्ट विषनाशक नही है।

सावधानी कथन: कीटनाशक का प्रयोग केवल इस पत्रिका मे निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर न करें। फसल–कटाई के उपरांत अनुप्रयोग हेतु उपयोग नहीं। मनुष्य और घरेलु पशुओं के लिए खतरनाक है। पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात आदयान को नष्ट करें। इस उत्पाद से त्वचा और आंखों मे ओसत दर्जे की जलन होती है। यह उत्पाद जलीय अकशेरूकीय और मछलियों के लिए बहुत विषैला है, मत्स्य पालन के आस पास इस का उपयोग नहीं करना चाहिए।

रासायनिक संरचना :

घटक	% भा/ भा
फ्लूक्सामेटामाईड स.त.	१०.००
३–मेथोक्सी – एन, एन – डाईमिथाईल प्रोपिओनमाईड	४०.००
पोलोक्सीइथाइलीन अल्काईफिनाइल ईथर	
अल्काईलआराईल सफोनेट	५.००
एरोमेटिक सोलवेंट (सी१० – सी१३)	प्रर्याप्त मात्रा
कुल	१००.००

वापरण्यापूर्वी जोडलेली लिफलेट वाचा.

ग्रासिया

फ्लूक्सामेटामाईड १०% व/व ईसी
(स्पर्शिय कीटकनाशक)

फ्लूक्सामेटामाईड १०% व/व ईसी एक अत्याधुनिक आईसोक्साझोलिन कीटकनाशक आहे. पाने खाणाऱ्या आणि रस शोषण करणाऱ्या कीटकांच्या प्रति प्रभावी आहे. हे गामा–अमिनोब्यूट्रिक ॲसिड (जीएबीए) गेटेड क्लोराइड चॅनल्स (जी ए बी ए सी आइ एस) चा एक प्रतिपक्षी आहे. हे एक स्पर्शिय कीटकनाशक आहे जे पोट विष आणि स्पर्शाने परिणाम करणारे आहे.

फवारणी आणि प्रमाण साठी शिफारस:

पीक	कीटकाचे सामान्य नाव	प्रमाण प्रति हेक्टर			वाट–पाहण्याचा कालावधी (दिवस)
		सक्रिय घटक (ग्रॅ.)	संरचना (मिली)	पाण्याचे प्रमाण (लिटर)	
वांगी	पानावरील तुडतुडे–अमरास्का बिगुटुला, फुलकिडे– थ्रिप्स पालमी, फळ आणि शेंडा पोखरणारी अळी– ल्यूसिनोडिस ऑरबोनेलिस	४०	४००	५००	५
कोबी	त्रिकोणी ठिपक्यांचा पतंग– प्लुटेला झायलोस्टेला तंबाखू सुरवंट–स्पोडोप्टेरा लिटयूरा उंटअळी–थाईसानोपलूसिया ओरीचालसीई	४०	४००	५००	५
मिरची	फुलकिडे–स्किटोथ्रिप्स डोरसेलिस, फळ पोखरणारी– हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा तंबाखू सुरवंट–स्पोडोप्टेरा लिटयूरा	४०	४००	५००	५
भेंडी	पानावरील टोळ–अमरास्का बिगुटुला फुलकिडे–स्किटोथ्रिप्स डोरसेलिसफळ पोखरणारी– हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा	४०	४००	५००	५
तूर	ठिपकेदार शेंग पोखरणारी अळी– मारुका टेस्टुलेलिस, शेंग पोखरणारीअळी–हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा	४०	४००	५००	२८
टोमॅटो	फुलकिडे– थ्रिप्स टबाकी फळ पोखरणारी अळी– हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा	४०	४००	५००	५

वापरासाठी निर्देश: आवश्यक प्रमाणात फ्लूक्सामेटामाईड १०% व/व ईसी मोजा आणि थोडे पाणी टाकून व्यवस्थित पणे मिसळा. स्प्रेच्या प्रमाणानुसार उर्वरित पाणी घालून द्रावण बनवा.

फवारणीचा कालावधि: कीटकांची संख्या पिकांचे आर्थिक नुकसान करण्या आधी फ्लूक्सामेटामाईड १०% व/व ईसी चा वापर करा.

वापरण्याची पद्धत: पाना द्वारे फवारणीसाठी याचा वापर करा.

फवारणी उपकरण : हाई वॉल्यूम स्प्रेयर जसे नॅपसॅक स्प्रेयर, तैवान स्प्रेयर आणि फुट स्प्रेयर इ. चा वापर करा ज्यामुळे पुर्णत: आणि एकसमान फवारणी सुनिश्चित होईल.

उद्देश : कृषि वापरासाठी.

प्रमाण: शिफारस सारणी पहा.

मिश्रण बनविण्यासाठी सुचना: कीटकनाशकाची आवश्यक प्रमाणात मात्रा मोजा आणि थोड्याशा पाण्यात चांगले मिसळा. योग्य फवारणीसह पिकांच्या संपूर्ण कव्हरेजसाठी पूर्णपणे निर्दिष्ट केलेले उर्वरित प्रमाण मिसळा.

वापरण्याचा कालावधि: कोणतेही बंधन नही. पावसापूर्वी, जोरदार वाऱ्याची संभावना फवारणी असल्यास टाळा.

पीकाचा टप्पा: कीटकांची संख्या पिकांचे आर्थिक नुकसान करण्याआधी फ्लूक्सामेटामाईड १०% व/व ईसी चा वापर करा.

जास्तीत जास्त फवारण्यांची वारंवारता: वरील शिफारसीनुसार कीटकांचा प्रादुर्भाव लक्षात घेवून ७–१४ दिवसांच्या अंतराने २–३ फवारण्या आवश्यक आहेत.

साठवणी दरम्यान कोणत्याही पीकासाठी कीटकनाशक वापरू नये.: केवळ वरील शिफारसीचा संदर्भ घ्या.

रोप विषक्तता : शिफारस केलेल्या प्रमाणानुसार वापर केल्यास हे कीटकनाशक रोपविषकारक नाही.

पुन: प्रवेशाचा कालावधि: फवारणीच्या २४ तासांनी.

पूर्व पीक अनुक्रमाणिका(पीएचआई): केवळ वरील शिफारसीचा संदर्भ घ्या.

हवामानची स्थिति: कीटकनाशकाच्या फवारणीच्या वेळी हवामान स्वच्छ, शांत असावे आणि पाऊस व जोरदार वारा असू नये. गरम हवामान आणि दमटपणा ताण स्थितित्च्या हवामानात फवारणी करू नये.

माती आणि पाणी: मातीची कोणतीही विशिष्ट स्थिति निर्धारित नाही. फवारणीसाठी स्वच्छ पाण्याचा वापर केला पाहिजे.

फवारणीच्या सुचना: वाऱ्याच्या दिशेने एकसमान फवारणी करा.

वापरलेल्या डब्यांची विल्हेवाट: १. रिकामी पॅकेजिस मोडून–तोडून वस्तीपासून दूर जागी जमिनीत खोल पुरावीत. २. पुन्हा कामासाठी वापरली जाऊ नयेत म्हणून रिकामी पॅकेजिस उघड्यावर टाकू नयेत. ३. निर्माता, उत्पादन बनविणाऱ्याचे आणि हाताळणाऱ्याचे कर्तव्य आहे की पॅकेजिस किंवा उरलेले द्रावण किंवा फवारणी धुतलेले पाणी यांची विल्हेवाट पर्यावरण किंवा पाणी प्रदुषित होणार नाही अशा सुरक्षित पद्धतीने लावावी.

साठवण : १. कीटकनाशक असलेली पॅकेजिस इतर वस्तूं पासून वेगळ्या खोलीत, मुलांपासून व जनावरांपासून, जनावरांच्या चाऱ्यापासून दूर वेगळ्या खोलीत कुलूप चावी लावून ठेवले पाहिले. २. कीटकनाशक साठवणीची खोली मजबूत बांधणीची, कोरडी, भरपूर उजेड असलेली, हवेशिर व पूरेशी लांब रूंद असावी ज्यामुळे वाफेने होणाऱ्या प्रदुषणाने पर्यावरण दुषित होणार नाही.

विषबाधेची लक्षणे: उल्टी,भूक कमी होणे,खाज,अतिसार,अति तहान,सुस्ती,स्नायूंचा थरकाप आणि सौम्य अटेक्सिया सारखी लक्षणे दिसू सकतात.

सुरक्षितता खबरदारी: १) अन्नपदार्थ, अन्नपदार्थांचे रिकामी डबे आणि जनावरांच्या चाऱ्यापासून दूर ठेवा. २) तोंड, डोळे आणि त्वचेशी संपर्क होवू देवू नका. ३) फवारणीचे तुषार श्वासाद्वारे आत घेवू नका. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा. ४) फवारणी द्रावण बनविताना संपूर्ण संरक्षित कपडे वापरावेत.५) फवारणी नंतर दूषित झालेले कपडे आणि शरीराचा भाग स्वच्छ धुवा. ६) फवारणी करताना धुम्रपान, खावू–पीवू वा चघळू नये.

प्रथमोपचार : अ) श्वासाद्वारे आत गेल्यास: रूग्णास मोकळ्या हवेत आणा व आराम करू द्या. ब) **त्याचेशी संपर्क झाल्यास:** कपडे आणि त्वचा दूषित झाल्यास, कपडे उतरवा आणि दूषित झालेली त्वचा साबण व भरपूर पाण्याने धुवा. **जर त्वचेस जळजळ होत असेल:** तर चिकित्सकाचा सल्ला घ्या क) **डोळ्यांशी संपर्क झाल्यास:** भरपूर पाण्याने धुवा, जर जळजळ दिर्घ काळा पर्यंत राहीली तर चिकित्सकाचा सल्ला घ्या. ड) **गिळले गेल्यास:** पाण्याने गूळण्या करा. जर रूग्ण सावध व शुध्दीवर असेल तर १ वा २ ग्लास पाणी पीण्यास द्या आणि चिकित्सकास बोलवा व कीटकनाशकाचा डबा वा लेबल दाखवा.

विषोपचार : चिकित्सकाने रूग्णाच्या लक्षणाच्या आधारित उपचाराचा निर्णय घ्यया. कोणताही विशिष्ट विषोपचार माहीत नाही, लक्षणानुसार उपचार करा.

सावधगिरीचे विधान: या लेबलवर/ लिफलेटवर नमूद केल्याशिवाय इतर पिकांवर वापरू नये. कौणी नंतरच्या फवारणीसाठी वापरला जावू नये.मानव आणि पाळीव प्राण्यांना धोका. लिफलेट वरील निर्देशानूसार वापरल्या इतर डबे नष्ट करा. हे उत्पादन जलीय अपृष्ठवंशी आणि माशासाठी अत्यंत विषारी आहे, त्यामुळे रेणू असलेले उत्पादन जलचरांच्या जवळ.टाळले जावू शकते.

रासायनिक संरचना :

घटक	% व/व
फ्लूक्सामेटामाईट स.त.	१०.००
३–मिथोक्सी–एन,एन–डाईमिथाईलप्रोपिओनमाईड	४०.००
पॉलीऑक्सीइथाइलीन अल्काइलफिनाइल इथर ,	
अल्काइल अरेल सल्फोनेट	५.००
एरोमॅटीक सॉलवेन्ट (सी१०–सी १३)	पूरेसे प्रमाण
एकूण	१००.००

વાપરતાં પહેલાં સંલગ્ન પત્રિપત્ર વાંચો.

ગ્રેશિયા

ફ્લુક્સામિટામાઈડ ૧૦% ભાર /ભાર ઈસી
સ્પર્શીય જંતુનાશક

ફ્લુક્સામિટામાઈડ ૧૦% ભાર /ભાર ઈસી યાવતા અને ચૂસિયા જંતુઓના કોસ આયામ સામે અસરકારક નવું આઈઝોક્લાઝોલાઈન જંતુનાશક છે. તે ગામા– અમિનોબુટારીટિક એસિડ (જીએબીએ) – ગેટેડ ક્લોરાઈડ ચેનલ્સ (જીએબીએસીઆઈ) એન્ટાગોનિસ્ટ છે. તે સ્પર્શીય જંતુનાશક છે અને પેટ અને સ્પર્શ થકી અસરકારક છે.

ઉંટકાવ અને માત્રાની ભલામણો:

પાક	જંતુનાં સામાન્ય નામ	હેક્ટર દીઠ માત્રા			છોભવાનો સમયગાળો (વર્ષ)
		એ.આઈ (ગ્રા.)	સ્થના (મિ લિ)	પાણીમાં માત્રા (લિટર)	
રીંગણ	પાન ચડચડિયા–અમરાસ્કા બિગુટુલા બગુટુલા, થ્રીપ્સ– થ્રિપ્સ પાલ્મી ફ્રૂટ અને અંકુર ભેડ–લુસિનોડેસ ઓર્બોનાલિસ	૪૦	૪૦૦	૫૦૦	૫
કોબી	હીરા ફુઠા–પ્લુટેલા ઝાયલોસ્ટેલા,ડાબરી ઈવળ સ્પોડોપ્ટેરા લિટુરા કટેલી ઈવળ– થાયસેનોપ્લુશિયા ઓરિચાલ્સિયા	૪૦	૪૦૦	૫૦૦	૫
મરચાં	થ્રીપ્સ–સ્કર્ટોથ્રિપ્સ ડોર્સેલિસ,ફળ ભેડક– હેલિકોવેર્પા આર્મિગેરા, ટમાકુ ચડચડિયા– સ્પોડોપ્ટેરા લિટુરા	૪૦	૪૦૦	૫૦૦	૫
ભીંડા	પાન ચડચડિયા–અમરાસ્કા બિગુટુલા,થ્રીપ્સ સ્કર્ટોથ્રિપ્સ ડોર્સેલિસ,ફળ ભેડક–હેલિકોવેર્પા આર્મિગેરા	૪૦	૪૦૦	૫૦૦	૫
તુવેર	ટપકાવાળા ફળ ભેડક માકુકા ટેસ્ટુલાલિસ, ફળ ભેડક હેલિકોવેર્પા આર્મિગેરા	૪૦	૪૦૦	૫૦૦	૨૮
ટમેટા	થ્રીપ્સ–થ્રિપ્સ ટબાકી ફળ ભેડક– હેલિકોવેર્પા આર્મિગેરા	૪૦	૪૦૦	૫૦૦	૫

ઉપયોગની રીતઃ ફ્લુક્સામિટામાઈડ ૧૦% ભાર /ભાર ઈસીની આવશ્યક માત્રા લો અને થોડી માત્રામાંપાણી સાથે સારી રીતે મિશ્રણ કરો. સતત હલાવતા રહીને આવશ્યક છંટકાવની માત્રા અનુસાર બાકી પાણી પણ ઉમેરી દો.

છંટકાવનો સમયઃ જંતુ આર્થિક ક્ષેત્ય માત્રાએ પહોંચતાં જ ફ્લુક્સામિટામાઈડ ૧૦% ભાર/ભાર ઈસી છંટકાવ કરો.

છંટકાવની રીતઃ પાન પર છંટકાવ કરવો જોઈએ.

છંટકાવના ઉપકરણઃ હાઈ વોલ્યુમ છંટકાવનું ઉપકરણ ઉપયોગ કરો, જેમ કે, નેપસેક સ્પ્રેયર, તાઈવાન સ્પ્રેયર અને ફુટ સ્પ્રેયર વગેરે, જેથી પરિપૂર્ણ અને એકસમાન આવરણની ખાતરી રહી શકે.

હેતુઃ ફક્ત કૃષિ ઉપયોગ માટે.

માત્રાઃ ભલામણનું કોષ્ટક જુઓ.

મિશ્રણ માટે સૂચનાઃ જંતુનાશકની આવશ્યક માત્રા માપમાં લો અને થોડી માત્રામાં પાણી સાથે સારી રીતે મિશ્રણ કરો. અણુકૂળ સ્પ્રેયર સાથે પાકને સંપૂર્ણ આવરી લેવા માટે સતત હલાવતાં ર હીને નિર્દિષ્ટ અનુસાર પાણીની બાકી માત્રા પણ ઉમેરી દો.

છંટકાવનો સમયઃ કોઈ નિયંત્રણ નહીં. વરસાદ પૂર્વે ભારે પવન હેઠળ છંટકાવ ટાળવો જોઈએ.

પાકનો તબક્કોઃ જંતુનાશક પાક ગમે તે તબક્કામાં હોય ત્યારે જંતુ આર્થિક ક્ષેત્ય માત્રાએ પહોંચતાં છંટકાવ કરવો જોઈએ.

છંટકાવની મહત્તમ સંખ્યા સહિત સામાન્યતાઃ ઉક્ત ભલામણ જુઓ. જંતુના ચેપને આધારે ૩–૧૪ દિવસના અંતરે ૨–૩ છંટકાવની આવશ્યકતા પડી શકે છે.

જંતનાશક કોઈ પણ પાક પર છંટકાવ નહીં કરવા જોઈએ તે તબક્કાઃ ઉક્ત ભલામણ જ જુઓ.

ઝેરીપણુંઃ ભલામણ કરેલી માત્રા અનુસાર ઉપયોગ કરાય તો કોઈ ઝેરીપણું નથી.

પુનઃપ્રવેશ સમયગાળોઃ છંટકાવ પછી ૨૪ કલાક.

પૂર્વ- લણણી નિર્દેશાંક (પીએચઆઈ): ઉક્ત ભલામણ જ જુઓ.

હવામાનની સ્થિતિઃ હવામાન સાફ, શાંત હોવું જોઈએ, વરસાદ અને ભારે પવન નહીં હોવા જોઈએ. ગરમ હવામાન અને ભીમની તાણની સ્થિતિઓનો છંટકાવ ટાળો.

માટી અને પાણીઃ ચોક્કસ માટીની સ્થિતિ મુકરર કરાઈ નથી. છંટકાવ માટે સ્વચ્છ પાણીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

છંટકાવ અંગે સૂચનાઃ પવનની દિશામાં એકસમાન છંટકાવ કરો. નિંદણ સંપૂર્ણ લેવાય તની ખાતરી રાખો.

ઝેરનાં લક્ષણોઃ ઊલટી, ભૂખ ઓછી થવી, અંજવાળ, અતિસાર, વધુ પડતી તરસ, સુસ્તી, લગાવુમાં ઈયાદી અને મધ્યમ એટેક્સિયા જેવાં લક્ષણો ઉદ્ભવી શકે છે.

ખાલી પાત્રોનો નિકાલ : ૧) ખાલી પૅકેજીસને તોડી અને માનવવસ્તીથી દૂર દાટી દેવાં જોઈએ. ૨) તેમને ફરીથી ઉપયોગ ન થાય તે માટે વપરાયેલાં પૅકેજીસ બહાર ન મૂકવાં. ૩) વધારાના પદાર્થ અને લપેટવા માટેની વસ્તુઓનો સુરક્ષિત નિકાલ એ પ્રકારે થવો જોઈએ કે, પર્યાવરણ અને જળ પ્રદુષિત ન થાય.

સંગ્રહ : ૧. કીટકનાશક ભરેલાં પૅકેજીસ અન્ય વસ્તુઓ, ખાસ કરીને ખાદ્યસામગ્રીઓ સંગ્રહ કરવાની ઓરડીઓ, અલાવહી ઓરડીઓમાં અથવા જગ્યાઓમાં અથવા જંતુનાશકની ગુણવત્તા તથા જથ્થાના આધારે અલગ કબાટોમાં તાળા–ચાવી હેઠળ રાખવા જોઈએ. ૨.સંગ્રહ કરવાની રૂમો અથવા જગ્યાઓ સારી રીતે બંધાયેલી, પૂરતા પ્રકાશિત અને સારી રીતે હવાદાર અને પૂરતી મોકળાશવાળી હોવી જોઈએ, જેથી ધૂમ્રસેરો દ્વારા પ્રદૂષણ ન ફેલાય.

સુરક્ષાની સાવચેતીઓઃ ૧) આદ્યપદાર્થો, આદ્ય પદાર્થોના ખાલી પાત્રો અને પશુઆહારથી દૂર રાખો. ૨) મોં, આંખો અને ત્વચાથી દૂર રાખો. ૩) છંટકાવનું ધુમ્મસ શ્વાસમાં લેવાનું ટાળો. પવનની દિશામાં છંટકાવ કરો. ૪) મિશ્રણ કરતી અને છાંટતી વખતે સંપૂર્ણ રક્ષણકારક કપડાં પહેરો. ૫) છંટકાવ કર્યા પછી દૂષિત થયેલાં કપડાં અને શરીરના ભાગો સંપૂર્ણ ધોઈ નાંખો. ૬) છાંટતી વખતે ધૂમ્રપાન ન કરો, કંઈપણ પીવો, ખાવો અને ચાવો નહીં.

પ્રાથમિક ઉપચારઃ એ. શ્વાસમાં જવા પરઃ દર્દીને ખુલ્લી હવામાં બહાર લાવો અને આરામ આપો. બી. **ત્વચા સાથે સંપર્કઃ** કપડાં અને ત્વચા દૂષિત થવા પર કપડાં કાઢી નાખો અને દૂષિત ત્વચાને ભરપૂર પાણી અને સાબુથી ધોઈ નાખો. **જો ત્વચેમાં બંજવાળ ઉદ્ભવેઃ** તબીબી સલાહ લો. સી. **આંખ સાથે સંપર્કઃ** જો આંખો સાથે સંપર્ક થાય તો ભરપૂર પાણીમાં તુરંત બોળો અને તબીબને બતાવો. **જો તે છતાં આંખમાં બંજવાળ રહે તોઃ** તબીબી સલાહ લો. ડી. **પટમાં જવા પરઃ** મોઢું પાણીમાં બોળો. જો દર્દી સતર્ક હોય તો ૧ કે ૨ ગ્લાસ પાણી આપો અને તુરંત તબીબી સલાહ લો અને આ કન્ટેઈનર અથવા લેબલ બતાવો.

વિષનાશકઃ દર્દીનાં લક્ષણોના પ્રતિકારમાં તબીબ દ્વારા નિર્ણયને આધારે ઉપચાર આપો. ચોક્કસ વિષનાશક જ્ઞાત નથી. લક્ષણ પ્રમાણે ઉપચાર કરો.

**ચેતવણીસૂચક નિવેદનઃ આ લેબલ /પત્રકમાં ઉલ્લેખ સિવાયના પાક પર અજમાવવું નહીં. લણણી પશ્ચાત છંટકાવ માટે ઉપયોગ નહીં કરવું. માનવી અને ઘરેલુ જનાવરો માટે જોખમી છે. ઉપયોગ પછી પત્રકના નિર્દેશ અનુસાર કન્ટેઈનરનો નાશ કરો. આ ઉત્પાદન સમુદ્ર જીવો અને માછલીઓ માટે અત્યંત ઝ

ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಲಗತ್ತಿಸಿದ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಗ್ರೇಸಿಯಾ

ಫ್ಲಕ್ಸಮೆಟಮೈಡ್ 10% ಡಬ್ಲು/ಡಬ್ಲು.ಇ.ಸಿ
ಸಂಪರ್ಕ ಕೀಟನಾಶಕ

ಫ್ಲಕ್ಸಮೆಟಮೈಡ್ 10% ಡಬ್ಲು/ಡಬ್ಲು ಇ.ಸಿ ಆಗಿರುವ ಮತ್ತು ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಒಂದು ನೊವೆಲ್ ಬೆಗೊಕ್ಸೊಫ್ಲೋರೈನ್ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಗಾಮಾ-ಅಮಿನೊಬ್ಯುಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ (ಜಿಎಬಿಎ) - ಗೇಟೆಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಚಾನಲ್ (ಜಿಎಬಿಎಸಿಸಿಗಳು) ಅಂಟಾಗೊನಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಪರ್ಕ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸೇವನೆ ಭಾಗ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಡೋಸೇಜ್‌ಸ್ ಶಿಫಾರಸುಗಳು:

ಬೆಳೆ	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಡೋಸೇಜ್			ನಿರೀಕ್ಷಿತಾ ಅವಧಿ
		ಸ.ಘ (ಗ್ರಾ.)	ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಮಿಲಿ)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವಿಕೆ (ಲೀಟರ್)	
ಬದನೆ-ಕಾಯಿ	ಹಸಿರು ಜಿಗುಹುಳ, ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕೊರೆಕ	40	400	500	5
ಕೋಸು	ವಜ್ರ ಬೆನ್ನಿನ ಪತಂಗ ಸ್ಪೊಡೊಪ್ಟೆರಾ ಸಿಮಲೂಪರ್	40	400	500	5
ಮೆಣಸಿನ-ಕಾಯಿ	ಥ್ರಿಪ್ಸ್, ಕಾಯಿಕೊರೆತ ಸ್ಪೊಡೊಪ್ಟೆರಾ	40	400	500	5
ಬೆಂಡೆ-ಕಾಯಿ	ಥ್ರಿಪ್ಸ್, ಹಸಿರು ಜಿಗುಹುಳ	40	400	500	5
ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ	ಮರುಕಾ ಕಾಯಿಕೊರೆತ	40	400	500	28
ಟೊಮ್ಯಾ-ಟೊ	ಥ್ರಿಪ್ಸ್, ಕಾಯಿಕೊರೆತ	40	400	500	5

ಬಳಕೆಗಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನ : ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಫ್ಲಕ್ಸಮೆಟಮೈಡ್ 10% ಡಬ್ಲು/ಡಬ್ಲು.ಇ.ಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ಅಲುಗಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ತ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಉಳಿದ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಸಮಯ : ಕೀಟಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಫ್ಲಕ್ಸಮೆಟಮೈಡ್ 10% ಡಬ್ಲು/ಡಬ್ಲು.ಇ.ಸಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರಿ.

ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಪರಣೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು.

ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೆಯ ಸಲಕರಣೆ: ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಸಾ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ತೈವಾನ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಮತ್ತು ಫೂಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಂಪಡಣಾ ಸಲಕರಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಉದ್ದೇಶ: ಕೇವಲ ಕೃಷಿಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ.

ಡೋಸೇಜ್ : ಶಿಫಾರಸಿನ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿರಿ.

ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ : ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಪಡೆದು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿರಿ. ಅನಂತರ ಒಟ್ಟು ಸಿಂಪರಣೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಬಾಕಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಪುನಃ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕದಡಿರಿ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ನಿಂದ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿರಿ.

ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಸಮಯ : ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧನೆ ಇಲ್ಲ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಡಿ.

ಬೆಳೆಯ ಹಂತ: ಕೀಟಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಬೆಳೆಯ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು.

ಕಾಲಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಂಪರಣೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಕೀಟದ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 7-14 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 2-3 ಸಿಂಪರಣೆಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಗೆ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸದ ಹಂತ: ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ.

ಸಸ್ಯ ವಿಷಕಾರಿತ್ವ : ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗದು.

ಮರು-ಪ್ರವೇಶದ ಅವಧಿ: ಸಿಂಪರಣೆಯಿಂದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ವರೆಗೆ.

ಪ್ರೀ-ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್(PHI): ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ.

ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ : ಹವಾಮಾನವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದು, ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಮಳೆ ಇರಬಾರದು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಗಾಳಿಯೂ ಬೀಸುತ್ತಿರಬಾರದು. ಉಷ್ಣ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತೇವದ ಒತ್ತಡವಿರುವಾಗ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಡಿ.

ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪರಣೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.

ಸಿಂಪರಣೆಯ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು : ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಿಂಪರಿಸಿರಿ. ಕಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪರಣೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿರಿ.

ಖಾಲಿ ಕಂಟೇನರುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ : 1. ಖಾಲಿಕಂಟೇನರ್‌ನ್ನು ಒಡೆದು ಜನವಸತಿಗೆ ದೂರವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಗಿಯಬೇಕು. 2. ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಗೆಗಳಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಕಂಟೇನರಿನ ತೊಳೆ ನೀರನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು ಈ ಉತ್ಪನ್ನದ ಉತ್ಪಾದಕರು, ಸೂತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದವರು ಹಾಗೂ ಬಳಸಿದ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪರಸರ ಮತ್ತು ಜಲಪ್ರದೂಷಣೆಯಾಗದಂತೆ ವಿಸರ್ಜಿಸಕಕ್ಕದ್ದು.

ಶೇಖರಿಕೆ : 1. ಕೀಟನಾಶಕವಿರುವ ಡಬ್ಬಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ, ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಟಕದಂತೆ, ಜಾನುವಾರು, ಪಶು ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ, ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. 2. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟು, ಶುಷ್ಕವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಳಿ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಇರಬೇಕು. ಹಬೆಯಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳದಂತಾಗಲು ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು.

ವಿಷತಗಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ವಾಂತಿ, ಹವಾಲು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ತುರಿಕೆ, ಆತಿಭೇದಿ, ವಿಪರೀತ ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಆಲಸ್ಯ, ಸ್ನಾಯು ಕಂಪನ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಅಟಾಕ್ಸಿಯಾದಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೋರಿಬರಬಹುದು.

ಸುರಕ್ಷಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು : 1. ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಆಹಾರದ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಪರಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಶುಗಳ ಮೇವಿನಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿ. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಜাಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ. 3.ಸಿಂಪರಣೆಯಾದಗಳನ್ನು ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. 4.ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿರಿ. 5. ಸಿಂಪರಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಬರೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 6. ಸಿಂಪರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೊಗೆಬತ್ತಿ ಸೇದಬೇಡಿ, ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಹಾಗೂ ಜಗಿಯಬೇಡಿ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಇದರ ಉಸಿರಾಟ: ಇದರ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಡಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿರಿಸಿ. **ಬಿ. ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕ:** ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡರೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಸಾಬೂನು ಹಾಗೂ ಹೇರಳ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಂತೆ ಚರ್ಮವನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾದರೆ: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. **ಸಿ. ಕಣ್ಣುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ:** ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸಂಪರ್ಕವುಂಟಾದರೆ, ಹೇರಳ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ. **ಡಿ. ಸೂಗುವಿಕೆ:** ಬಾಯಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ, 1 ಅಥವಾ 2 ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ, ರೋಗಿಯು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಈ ಡಬ್ಬಿ ಅಥವಾ ಲೇಬಲ್ ತೋರಿಸಿ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ: ರೋಗಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಧಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ರೋಗಿಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆನುಸಾರವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆನೀಡಿ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ : ಲೇಬಲ್/ಲೀಫ್‌ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಬೆಳೆಗಳ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಮಾನವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕರ. ಧಾರಕವು ಬರಿದಾದ ನಂತರ ಲೀಫ್‌ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶಗೊಳಿಸಿರಿ. ಈ ಉತ್ಪಾದನವು ಜಲಚರ ಅಕಶೇರುಕಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಕಾರಿ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್‌ಗಳಿರುವ ಉತ್ಪಾದನವನ್ನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪ ಬಳಸಬಾರದು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಘಟಕಗಳು	%ಡಬ್ಲು/ಡಬ್ಲು
ಫ್ಲಕ್ಸಮೆಟೈಡ್ ಎ.ಐ	10.00
3-ಮೆಥಾಕ್ಸಿ-ಎನ್, ಎನ್-ಡಿಮೀಥೈಲ್‌ಪ್ರೊಪಿಯೊನಮೈಡ್	40.00
ಪಾಲಿಆಕ್ಸಿಥೈಲೀನ್ ಆಲ್ಕೈಲ್‌ಫೆನೈಲ್ ಈಥರ್	5.00
ಆಲ್ಕೈಲ್‌ಆರೈಲ್‌ಪಲ್ಫೋನೇಟ್	
ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವಂಟ್ (ಸಿ10-ಸಿ13)	ಕ್ಯೂ.ಎಸ್
ಒಟ್ಟು	100.00

ವಾಡುವುದು ಮುಂದು ದಿನಿತೆ ಜಲಪ್ರಿಸಿದ ಕರಪತ್ರಾನ್ನು ಚ್ಚಾಡ್ಡಾಗಿ ಬದವಾಲಿ.

ಗ್ರಾಸಿಯಾ

ಫ್ಲ್ಯೂಮಿಟಾಮೈಡ್ 10% ಬ/ಬ ಇಸಿ
ಸ್ಪರ್ಶದ್ವಾರಾ ಪನಿದೆಸೆ ಕೀಟನಾಶಿನಿ

ಫ್ಲ್ಯೂಮಿಟಾಮೈಡ್ 10% ಬ/ಬ ಇಸಿ ಅನೆದಿ ಒಕ ನರಿಕೊತ್ತ ಇನೋಗ್ಟಾಜೊಲ್ಸ್ ಕೀಟನಾಶಿನಿ.ಇದಿ ಪ್ರತ್ಯೆಕಿಂಚಿ ನಿಭಿನ್ನ ರಕಾಲ ಕೊರಿಕಾಯಿಲೆ ಕೀಟಕಾಲು ಮರಿಯು ರಸಂಲೆರ್ಲು ಪುರುಗುಲು ಅಲಿಸುಮರುಗುಲಿಂಗಾ ಅರಿತಿದುರುಂದಿ. ಇದಿ ಗಾಮಾ-ಅಮಿನೊಬ್ಯುಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ (ಜಿಎಬಿಎ) - ಗೇಟೆಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಚಾನಲ್(ಜಿಎಬಿಎಸಿಸಿ) ಯಿಕ್ಕ (ಯಾಂಟಾಗಿನಿಸ್ಟ್) ಕಲಿಗುಲು.ಇದಿ ಸ್ಪರ್ಶದ್ವಾರಾ ಪನಿದೆಸೆ ಕೀಟನಾಶಿನಿ ಮರಿಯು ಕಡುಪುರೆಸಿಕಿ ಪೌಡಂ,ಸ್ಪರ್ಶ ಚರ್ಯಲ ದ್ವಾರಾ ಮಾದಾ ಪನಿಚೆಸ್ತುಂದಿ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಮರಿಯು ಮೋತಾದು ಸಿಫಾರುಸುಲು :

ಪಂಟ	ತಿಗಂಜುಬು ಸಾಧಾರಣಂಗಾ ಪಿರೆಚೆ ಪೇರು	ಇದಿ ಹೆಕ್ಟಾರುಕು ಮೋತಾದು			ವೆಯಿಂದಾಲ್ಸಿನ ಸಮಯಂ (ರೋಜುಲ್ಲೆ)
		ಸ.ಸಿ. (ಗ್ರಾಮುಲ್ಲೆ)	ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಎಂ.ಪಿ.)	ತಿಗಂಜುಬುನು ನೀರು (ಲೀಟರ್‌ಲು)	
ಸಂಗ	ಗಡ್ಡಿಯಲು- ಅಮಪ್ಪಿ ಬಿಗುಬ್ಬುಲ ಅಮುಯಿದಿ-ಫ್ರಿಸ್ಟ್ಲೆ ಕಾಯ ಮರಿಯು ಮಿಮ್ಮರಿಯಮು- ಬಿಯಿಮೆರೆಲ್ಲಿಂಚಾಲಿ.	40	400	500	5
ಕ್ಯಾಬೆಜಿ	ಅಮುಯಿಯು-ಫ್ಲುವಿಲ್ಲೆಬ್ಬೆಲ್ಲು ಗಂಬಗಾಪುರುಂಬು-ಸ್ಪೊಡೊಪ್ಟೆರಾ ಲಿಟ್ಯುರಾ ವಾಮಾಲಪುಗುಲು- ಫ್ಲುವಿಲ್ಲಿಯಾಟಲಿಫುಬಿಯಾ	40	400	500	5
ಮಿರಪ	ಅಮುಯಿದಿ-ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೌಟ್ ಕಾಯಲು ಪುರುಗುಲು- ಹಿಂಬೆಸ್ಪಿ ಅಲ್ಟೆರ ಅಪಿಬೆ ಗಾಲಿ ಪುರುಗುಲು- ಸ್ಪೊಡಿಪ್ಟೆರಾ ಲಿಟ್ಯುರಾ	40	400	500	5
ಬೆಂಡ	ಗಡ್ಡಿಯಲು- ಅಮಪ್ಪಿ ಬಿಗುಬ್ಬುಲ ಅಮುಯಿದಿ-ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೌಟ್ ಕಾಯಲು ಪುರುಗುಲು- ಹಿಂಬೆಸ್ಪಿ ಅಲ್ಟೆರ	40	400	500	5
ಕಂದಿ	ಮುಪ್ಪಡಾಯಲು ಪುರುಗುಲು- ಮುರುಬಮ್ಮುಲಲಿ ಕಾಯಲು ಪುರುಗುಲು- ಹಿಂಬೆಸ್ಪಿ ಅಲ್ಟೆರ	40	400	500	28
ಬಟಾಲ	ಅಮುಯಿದಿ-ಫ್ರಿಸ್ಟ್ ಬಟಾಲಿ ಕಾಯಲು ಪುರುಗುಲು- ಹಿಂಬೆಸ್ಪಿ ಅಲ್ಟೆರ	40	400	500	5

ವಾಡುವುದು ಸೂಚನಲು: ಫ್ಲ್ಯೂಮಿಟಾಮೈಡ್ 10% ಬ/ಬ ಇಸಿನಿ ಕಾಸಲಿನಂತಿ ಸರಿಮಾಣಂಲೆ ಕೊಂಚೆಸಿ ತೀಸುಕొని దాన్ని కొద్ది నీటిలో వేసి బాగా కలియబిట్టాలి.ఆ పిదప మిగతా సరిమాణంలోని నీటిని కలిపి బాగా కలియబిట్టి ద్రావణాన్ని తయారుచేసుకోవాలి.

ಮಿಶ್ರುಂದಿ ನಿಪಭಾವಮು: ಫ್ಲ್ಯೂಮಿಟಾಮೈಡ್ 10% ಬ/ಬ ಇಸಿ ನಿ ಸಿಫಾರುಸುಯಬಡಿನ ಮೋತಾದುಲೆ ಜಲ್ಲುಸುಂಟೆ ಮಿಶ್ರುಂದಾ ನಿನಿಭಾವಾನಿ ನಿಪಭಾಗಾಂ ಪುಂದದು.

ವಾಡುವು ಪದ್ಧತುಲು: ದೀನ್ನಿ ಆಕುಲು ಜಲ್ಲುಸು ಮಾತ್ರಮೆ ವಾಡಬಡುರುಂದಿ

ಸ್ಪ್ರೆ ಪರಿಶೀರಾಲು : ನ್ಯಾವೆನ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೆಯರ್, ಫ್ರೌನ್ ಸ್ಪ್ರೆಯರ್ ಮರಿಯು ಫುಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಯರ್ ಲಾಂಟಿ ಸ್ಪ್ರಾಲ್ಯಾಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೆಯಿಂಗ್ ಪರಿಶೀರಾಲು ಟುಯೊಗಿಂಚಾಲಿ.జల్లిన్నుండు సంటంతా ఏకరీతిలో అలుముకుపోయేలా పూండేట్టు చూసుకోవాలి.

ಪ್ರಯೋಜನಂ : ಸುನಪಾಯಿನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟುಯೊಗಿಂಚುಟ.

ಮೋತಾದು: ಸಿಫಾರುಸುಲಲೆ ಇನ್ನುಡುನು ಸೂಚನಲು ಪಾಟಿಂಚಾಲಿ.

ರೋಜುಲ ಮಿಶ್ರಮಂ ತಯಾರಿಕೆ ಸೂಚನಲು: ಸಿಫಾರುಸುಯಬಡಿನ ಸರಿಮಾಣಂಲೆ ಈ ಉತ್ಪಾದನನು ಕొంతసేపు తీసుకొని దానిలో కొద్దిగా నీరు పోసి బాగా కలియచిట్టుకోవాలి.ఆ పిదప మిగతా సరిమాణంలోని నీటిని పోసి, కర్ర లేదా కడ్డీంలో బాగా కలియచిట్టుకుంటే సంటంతా అలుముకుపోయేలా జల్లుగోల ద్రావణం తయారవుతుంది.

ವಾಡುವು ಸಮಯಂಲು: అందుకు ఏ నిర్బంధాలూ లేవు. కాన్నీర్వర్షాలికి ముందు అలాగే బాగా గాలి వీసే సమయాలలో పుచికారి చేయరాదని గుర్తుంచుకోండి.

ಪಂಟ ದಶ: ఈ కీటకానాశిని సంట అభివృద్ధి దెందే ఏ దశలో నైనా, సంట అర్థిక నష్టసరిమితి స్థాయి చేరేసమయానికి జల్లుకోవాలి.

తరచుగా ఎన్ని సార్లు పిచికారి చేయాలి మరియు గరిష్ట స్ప్రేల సంఖ్య: పైన నివరించబడిన సిఫారుసులు మారదనడానికి మనకు, అంచేగా తెగులు యొక్క ఉనికిని బట్టి 7-14 రోజుల వ్యవధిన్నూ 2-3 పిచికారీలు అవసరమవుతాయి.

ನಿಲ್ವ ಮರಿಯು ಈ ಕೀಟನಾಶಿನಿ ವಿ ಇತರ ಸಂಟಲು ಪಿಚಿಕಾರಿ ಚೆಯಾರು: పైన నివరించబడిన సిఫారుసులు మారదనడానికి మనకు.

ತಿರಿಗಿ-ಪ್ರವೇಶದ ಅವಧಿ: ಸಿಂಪರಿಕಿ ಅಯಿನ 24 గంటల తర్వాత

ಪ್ರಿ-ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ (ಪಿಹೆಚ್): పైన నివరించబడిన సిఫారుసులను మారదనలేనిదిగా మనకు.

ವಾತಾವರಣ ಪರಿಸ್ಥಿತುಲು: వాతావరణంలో సూర్యరశ్మి లేకుండా అంటే; మబ్బు పట్టినట్లు, వర్షంపడేటట్లు, బాగా ఉబురు గాలి వీయకుండా ప్రశాంతంగా వుండాలి.అంతేగాక వాతావరణంలో బాగా వేడిమి అంగీకరేసు వున్నట్లయితే పిచికారీ చేయకుండా వుండాలి.

ನೆಲ ಮರಿಯು ನೀರು: ప్రత్యేకంగా ఫలానా నేల పరిస్థితులేమీ సూచించబడలేదు గానీ, పిచికారీకి మాత్రం శుభ్రమైన నీటిని వాడాలి.

ಪಿಚಿಕಾರಿ ಚೆಯುವೆದಾನಿಕಿ ಸೂಚನಲು: గాలి వాలాన్ని చూసుకొని సంటంతా ఏకరీతిలో అలుముకుపోయేలా పిచికారి చేసుకోవాలి.

ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಾಂಲು ಪಾರೆಯು ವಿಧಾನಮು: 1. ఖాళీ డబ్బాలను సగంబట్టి సున్నము సంచారానికి దూరంగా పాతిపెట్టాలి. 2. ఖాళీ డబ్బాలను తిరిగి ఏరిధంగానూ వాడరాదు గనుక నాటిని బయట పడిరేయరాదు. 3. ఖాళీ డబ్బాలను, మిగిలిపోయిన మందు మరియు పిరికారాను కడుగగా వచ్చిన నీటిని కడుజాగ్రత్త పరిచస్తూ అంటే పరిసరాలు, నీరు, నీటి నొనరులు కలుషితం కాకుండా పారేసుకొని బాధ్యత తయారీదారులు ఉత్పాదన యొక్క సూత్రీకరణదారులు మరియు దీన్ని జల్లుకునే వారి పేరు కలదు.

ನಿಲ್ವ: ఈ కీటకానాశిని నిల్వ చేసే గదులు లేదా అసరలు ఇతర పదార్థములను అంటే మరి ముఖ్యంగా ఆహార పదార్థములను, సళువుల దాణాను నిల్వ చేసే గదులు అసరలను దూరంగా నీటి యొక్క సరిమాణము మరియు వైజాన్సిల్లో వేసునే అయారాలలో ఎట్టి తాళం వేసి బిగించి మార్గమే జీల్ల చేయాలి. 2. ఈ కీటకానాశిని నిల్వ చేసే గదులు లేదా అసరలు మంచి గట్టి కట్టడములై, పాడిగా, మంచి గాలి వెలుతురు ప్రసరించేలా నిశాలంగా వుండాలి. తద్వారా నీటి ఆవిరెత్తు పరిసరాలు కలుషితం కాకుండా కాపాడుకోవచ్చు.

ವಿಷಪ್ರಭಾವಾಲು : వాంతులనేదం, ఆకలి బాగా మందగించడం, శరీరంపై దురద, అతిసారయి, బాగా దప్పిక కలగడం,ఎక్కువగా అలసట వెంటదం,కండరాలు నొప్పికడం, మరియు అయోమాల కదలికలలో సమన్వయత కొద్దిగా లోపించడం లాంటి విషప్రభావాలు సంభవించవచ్చు.

ಸುರಕ್ಷಾಪ್ರಿ ಮುಂದುವಾಗ್ರಹಲು : 1. ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీ సంట సామగ్రి మరియు సళువుల దాణాలను, మేతకు దూరంగా దీన్ని వుంచండి. 2. దీన్ని నేటికి, వర్షానికి అంటకుండా, కళ్ళలో పడకుండా జాగ్రత్త పరించాలి. 3. ప్రీ ద్రావకపు సామనుమును పీల్చరాదు. పిచికారిని గాలివాటం చూసుకొనే పిచికారి చేసుకోవాలి. 4. కలుషితమైన బట్టలు, శరీరాన్ని శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి. 5. దీన్ని పిచిక