Hitweed

Pyrithiobac Sodium 10 % EC
(Selective Herbicide)
For Agricultural Use Only

Pyrithiobac sodium 10 % EC is an herbicide containing 10 % w/w active ingredient Pyrithiobac sodium, with other relevant ingredients. It is used for control of large number of weeds in cotton crop.

Chemical Composition:

Ingredient

Pyrithiobac sodium a.i.	10.0%w/w
Demineralized Aqua	Q.S.%w/w
Ethoxylated mixture of Lauryl alcohol and octyl phenole (Emulsifier)	25.00%w/w
Total	100.00%w/w

Recommendation:

Crop (s)	Common Name of Pests	Dosage/HA		Dilution in Water Liter	Crop Stage	Re-entry Period	Pre Harvest	Frequency
		AI gm	Formulation ml					
Cotton	Santhi (Trianthema Sp.), Bathua (Chenopodium sp), Tandla (Digera sp.), Amaranthus spp. Celosia argentea	62.5-75.0	625 - 750	500	Pre-emergence: 3-5 days after sowing in assured soil moisture conditions.	After 24 hours	160 days	1

Note:

Good Practices relating to pesticide application techniques:

Direction of Use:use recommended dose. Dilute the formulation in required quantity of water.

Weather Condition(in general): Do not spray during rainy, windy and hot sunny period.

Soil & Water (where ever applicable): This Herbicide is for foliar application and has no adverse effect when used at recommended dose . Avoid using near aquaculture.

Crop Stage for application: Pre-emergence: 3-5 days after sowing in assured soil moisture conditions.

Application Technique: Pyrithiobac Sodium 10 % EC application using high volume sprayers and ASPEE-HTP power sprayer fitted with flat fan or flood jet nozzle.

Equipment Type: knapsack sprayer with flat fan/ flood zet nozzle.

NozzleType: Flat fan or flood jet nozzle.

Dosage: 62.5 to 75.0 gm a.i. /ha (625 -750 ml/ha formulation)in 500 litre of water.

Instruction for Mixing: Shake the bottle before use measure out requisite quantity of the herbicide and mix it well with small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crop with suitable sprayer.

Re-entry Period: After 24 hours

Manner and Time of Application: Measure out requisite quantity of the Pyrithiobac sodium 10 % EC, add to it with small quantity of water, mix thoroughly and then add the remaining quantity of water while stirring vigorously. Do not spray facing the wind.Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation. Pyrithiobac sodium 10 % EC may be applied as pre-emergence herbicide3-5 days after sowingfor the control of weeds in cotton crop in assured moisture condition. Do not apply Pyrithiobac sodium 10 % EC under hot weather and moisture stress conditions. Extent and duration of weed control depends upon soil and moisture conditions.

Application Timing : Preferably in the morning and evening hours.

Frequency : 1

Stages during which pesticides should not be applied on any crop : Follow instructions as above mentioned in time of application.

Precautions to be taken to avoid harm to the beneficial insects like honey bees and natural enemies of pests :

1. Intoxicated for fish and other aquatic animals. Therefore, aquaculture should not be used for driving.
2. Discontinued for bees. Therefore, active foraging of bees should not be used during more and more use.

Symptoms Of Poisoning: Eyes and skin irritation may occur. On contact redness in eyes, tearing may occur. Nasal irritation, respiratory distress, tremors and incoordination.

First Aid : If inhaled remove the patient into fresh air. On contamination of skin and eyes wash and flush with plenty of water. If swallowed drink lot of milk, egg white or gelatine solution and contact doctor. Do not induce vomiting until advised by doctor. Do not give anything to unconscious person.

Antidote: No specific antidote. Gastric lavage at early stage is recommended. Treat symptomatically.

Phytotoxity: Non-phytotoxic when used as recommended dosage.

Storage Conditions :1. The packages containing the herbicides shall be stored separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirah under lock and key depending upon the quality and nature of the herbicides. 2. The rooms or premises meant for storing herbicides should be well lit, dry, well built and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour of herbicide.

Safety Precaution:1. Keep away from food and feedstuff. 2. Avoid contact with skin and eyes. 3. Avoid inhalation of the spray mist. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while spraying.

Disposal of used containers, washing from equipment and surplus material : 1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of insecticides and operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Cautionary Statement: Not to be used on crops other than mentioned on this label/leaflets. not to be used for post-harvest applications. Destroy the container after use as directed on leaflet. 1. Intoxicated for fish and other aquatic animals. Therefore, aquaculture should not be used for driving. 2. Discontinued for bees. Therefore, active foraging of bees should not be used during more and more use.

हिटवीड

पायरिथायोबेक सोडियम १०% ई.सी.
(चयनात्मक खरपतवारनाशक)
केवल कृषि उपयोग के लिए

पायरिथायोबेक सोडियम १०% ईसी एक खरपतवारनाशक है जिसमें सक्रिय तत्व पायरिथायोबेक सोडियम १०% के अलावा इसमे अन्य आवश्यक सहयोगी पदार्थ है । इसका उपयोग कपास की फसल में बहुत सारे खरपतवारों के नियंत्रण के लिए किया जाता है।

रासायनिक संरचना:

पायरिथायोबेक सोडियम स.त.	१०.००% भार/भार
आखनिज जल	आवश्याकतानुसार
लरिल एल्कोहल व ओक्टिल फिनोल इथोक्सिलेट के मिश्रण इमल्सीफायर	२५.००% भार/भार
योग	१००.००% भार/भार

सिफारिशें:

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा लीटर	फसल अवस्था	पुन: काल	पूर्व फसल	आवृति
		स.तत्व ग्राम	संरचना मि.ली					
कपास	साँठी (ट्रायएन्थिमा स्पि.) बथुआ (चिनोपोडियम स्पि.) कोन्द्रा (डायजेरा स्पि.) जंगली चोलाई (अरेन्थस स्पि.) सफेद मुर्गा (सेलोशिया अर्जेंटी)	६२.५ - ७५.०	६२५-७५०	५००	अंकुरण पूर्व,कपास की बीजाई के ३-५ दिन बाद पर्याप्त नमीं की अवस्था में।	२४ घंटो के बाद	१६० दिन	१

सुचना: कीटनाशक अनुप्रयोग तकनीकों से संबंधित अच्छे अभ्यास:

उपयोग के लिए निर्देश: अनुशंसित खुराक का उपयोग करें। और पानी की आवश्यक मात्रा में सूत्रीकरण पतला करें।

मौसम की स्थिति : बरसात,हवा और धूप की अवधि के दौरान स्प्रे न करें।

मिट्टी और पानी: यह हर्बीसाइड पर्ण आवेदन के लिए है और अनूशंसित खुराक पर उपयोग किए जाने पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। जलीय कृषि के पास उपयोग करने से बचें।

फसल अवस्था: अंकुरण पूर्व,कपास की बीजाई के ३-५ दिन बाद पर्याप्त नमीं की अवस्था में।

आवेदन तकनीक:पायरिथायोबेक सोडियम १०% ईसी आवेदन उच्च वोल्टेज स्प्रेयर और एएसपीई-एचटीपी पावर स्प्रेयर का उपयोग करके फ्लैट पंखे या बाढ जेट नोजल के साथ लगाया जाता है।

उपकरण प्रकार: फ्लैट फैन/फ्लड जेट नोजल के साथ नेपसेक स्प्रेयर।

नोजल प्रकार: फ्लैट फैन/फ्लड जेट नोजल

खुराक: खुराक ६२.५ से७५.० ग्राम स.त./हैक्टर (६२५-७५० मि.ली. फॉर्म्युलेशन) ५०० लीटर पानी में।

मिश्रण के लिए निर्देश:उपयोग करने से पहले बोतल को हिलाएं । हर्बिसाइड की आवश्यक मात्रा को मापें और इसे कम मात्रा में पानी में मिलाएं। उपयुक्त स्प्रेयर के साथ फसल की कुल कवरेजके लिए पूरी तरह से आंदोलन के साथ निर्दिष्ट पानी की शेष मात्रा जोड़ें।

पुन: प्रवेश अवधि: २४ घंटो के बाद।

आवेदन का समय और समय: पायरिथायोबेक सोडियम १०% ईसी की अपेक्षित मात्रा को मापें ,इसमें थोडी मात्रा में पानी मिलाएं, अच्छी तरह मिलाएं और फिर सख्ती से हिलाते हुए पानी की बढती मात्रा डालें। हवा के सामने स्प्रे न करें। पानी की शेष मात्रा को पूरी तरह से आंदोलन के साथ निर्दिष्ट करें। पायरिथायोबेक सोडियम १०% ईसी को पूर्व नमी के रूप में लागू किया जाता है। बुवाई के समय कपास की फसल में खरपतवारों का नियंत्रण सुनिश्चित नमी वाली स्थिति में बुवाई के ३ दिनों के बाद किया जाता है। पायरिथायोबेक सोडियम १०% ईसी गर्म मौसम और नमी तनाव की स्थिति में लागू न करें। खरपतवार नियंत्रण की अवधि और मिट्टी और नमी की स्थिति पर निर्भर करती है।

आवेदन का समय: अधिमानत: सुबह और शाम के समय।

अधिक से अधिक अंक सहित आवृति: १

चरण जिसके दौरान किसी भी फसल पर कीटनाशक नहीं लगाया जाना चाहिए: आवेदन के समय के उपर्युक्त निर्देशों का पालन करें।

शहद की मक्खियों और कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं जैसे लाभकारी कीडों से नुकसान से बचाने के लिए बरती जाने वाली सावधानियां:

१. मछली और अन्य जलीय जीवों के लिए विषाक्त । इसलिए, एक्वाकल्चर के पास इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।२. मधुमक्खियों के लिए विषाक्त । इसलिए,मधुमक्खियों के सक्रिय फोर्जिंग अवधि के दौरान उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

विषाक्तीकरण के लक्षण : पदार्थ के संपर्क मे आने पर त्वचा में जलन, खुजली,ललाई, सुजन व आंखों में जलन आँसू आना आदि हो सकता है । नाक में खुजली, सांस की तकलीफ, कंपकंपी व लडखडाना आदि विष के लक्षण हो सकते है ।

पादक आविषालुता: सुझायी गई मात्रा में कोई पौध विषाक्तता नहीं है।

प्राथमिक उपचार : अगर सांस द्वारा अंदर चली गयी हों तो रोगी को खुली हवा में ले जाएँ । त्वचा एवं आँखों के संपर्क मे आने पर अच्छी तरह पानी से लगातार धोयें । निगलने पर तुरंत डाक्टर की सलाह लें रोगी को खूब दूध अंडे की सफेद ज़र्दी, जिलेटिन का घोल या फिर खूब पानी पिलाएँ । उल्टी जब तक डाक्टर ना कहे नहीं करवाएँ । अचेतन रोगी में उल्टी को प्रेरित न करें।

विषनाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नही है। लक्षणानुसार इलाज करें।

संग्रहण की शर्तें: १. खरपतवार नाशक वालें डिब्बों का भंडारण अपनी मात्रा के अनुसार अलग से ताले चाबी वाले कमरे मे किया जाय या ऐसी अलमारियों में जहां ओर कुछ न रखा हो। २. वो कमरे या आहाते जहाँ खरपतवार नाशक रखा है सुनिर्मित प्रकाशपूर्ण, हवा दार पर्याप्त आयामो के हों जहां खरपतवार नाशको वाष्प द्वारा वातावरण दूषित न हो।

सुरक्षा के लिए सावधानियाँ : १.खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें ।२. मुँह, त्वचा और आंखों के संम्पर्क से बचायें । ३.प्रयोग करते समय सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें । हवा की दिशा में प्रयोग न करें । ४.प्रयोग के बाद दूषित कपडों और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोए । ५.प्रयोग के समय धुम्रपान, खाना पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए । ६. इस्तेमाल के समय चश्मा,दस्ताने व अन्य सुरक्षा कवच पहने।

कीटनाशक के प्रयोग किये गए डिब्बों,बचे हुए कीटनाशकों तथा पात्रों के धोवन का निपटारा: १. यह कीटनाशक निर्माता तथा उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि वह डिब्बों,पैकेजस या बचे हुए कीटनाशक तथा धोवन का निपटारा सुरक्षित ढंग से करें जिससे वातावरण या पानी प्रदूषित न हो। २. उपयोग किए गए डिब्बों /पैकेजस को बाहर न फेंके जिससे दुबारा प्रयोग न हो। ३.उपयोग किये गये डिब्बों /पैकेजस को तोडकर आबादी से दूर जमीन में गाड दें।

सावधानियाँ कथन: प्रयोग केवल इस पत्रिका मे निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर न करें । फसल- कटाई के उपरांत अनुप्रयोग हेतु उपयोगी नहीं । -पत्रक के उपयोग के बाद कंटेनर को नष्ट कर दें। १. मछली और अन्य जलीय जीवों के लिए विषाक्त । इसलिए,एक्वाकल्चर के पास इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए । २. मधुमक्खियों के लिए विषाक्त । इसलिए मधुमक्खियों के सक्रिय फोर्जिंग अवधि के दौरान उपयोग नही किया जाना चाहिए ।

हिटवीड

पाइरीथायोबेक सोडीयम १०% ई.सी.
(तणनाशक)
फक्त शेतीय उपयोगकरिता

पाइरीथायोबेक सोडीयम १०% ई.सी. एक तणनाशक आहे ज्यात सक्रिय तत्व पाइरीथायोबेक सोडीयम १०% व/व सह इतर सहाय्यक पदार्थ आहेत. ह्याचा वापर कपाशी मधिल मोठ्या प्रमाणातील तणांवर केला जातो.

रासायनिक संरचना:

घटक

पायरिथायोबेक सोडियम स.त.	१०.०%व/व
डायमिनरलाइज्ड ॲक्वा	क्यू.एस.%व/व
इथोक्सिलेटेड मिक्चर ऑफ लॉरिल आणि-ऑक्टिल फिनोल इमल्सीफायर	२५.००%व/व
एकूण	१००.००%व/व

शिफारस:

पीक	कीटकाचे सामान्य नाव	दर हेक्टरी प्रमाण		कव्याताती पाणी (लीटर)	पीकाचा टप्पा	पुन: प्रवेश काला वधी	कापणी पूर्व	वारं वारता
		स.त. (ग्रॅम/%)	द्रावण (लीटर)					
कापूस	ट्रॉइन्थमा एस पी (सांठी) चिनपोडीयम एस पी (बथुआ) डिजीटेरिया एस पी. (टेंडाला) ॲमरॅन्थस एसपीपी सेलोसिया अर्जेंटिया	६२.५ - ७५.०	६२५ - ७५०	५००	पारणीनंतर ३-५ दिसांनी जमिनीतील पुरेश्या ओलाव्याच्या अवस्थेत.	नंतर २४ तास	१६० दिवस	१

टीप : कीटकनाशक वापरण्याच्या तंत्राशी संबंधित चांगल्या पद्धती.

वापरासाठी निर्देश: शिफारस केलेले प्रमाण वापरा. आवश्यक प्रमाणात पाण्यात द्रावण पातळ करा.

हवामानाची स्थिती (सर्वसाधारणपणे): पावसाळी, वादळी आणि कडक उन्हात फवारणी करू नका.

माती आणि पाणी (जेथे लागू असेल) : हे तणनाशक पर्णिय फवारणीसाठी आहे आणि शिफारस केलेल्या प्रमाणामध्ये त्याचा वापर केल्यावर कोणताही विपरीत परिणाम होत नाही. जवळील मत्स्यशेतीत वापरणे टाळा.

फवारणीसाठी पीकाची अवस्था: पारणीनंतर ३-५ दिवसांनी जमिनीतील पुरेश्या ओलाव्याच्या अवस्थेत.

फवारणीची टेक्निक: पायरिथियोबॅक सोडियम १०% ई.सी. ॲप्लिकेशन उच्च व्हॉल्यूम स्प्रेयर आणि एस्पी-एचटीपी पॉवर स्प्रेयर वापरुन फ्लॅट फॅन किंवा फ्लड जेट नोझलसह बसवले आहे.

उपकरणाचा प्रकार: फ्लॅट फॅन/फ्लड जेड नोजलसह नॅपसॅक स्प्रेयर.

नोजल प्रकार: फ्लॅट-फॅन किंवा फ्लड जेड नोजल.

प्रमाण: ६२.५ ते ७५.० ग्रॅ. स.त./हेक्टर (६२५-७५० मिली/हेक्ट फॉर्म्यूलेशन) ५०० लीटर पाण्यात.

मिसळण्याच्या सुचना: वापरण्या पूर्वी बाटली हलवा. तरनाशकाचे पुरेसे प्रमाण मोजा आणि त्याला कमी प्रमाणात पाण्यात मिसळा. योग्य फवारणी यंत्राने पिकाच्या संपूर्ण कव्हरेजसाठी कसून एजीटेशन निर्दिष्ट केल्यानुसार उर्वरित पाणी घाला.

पुन: प्रवेश कालावधी: २४ तासांनंतर

वापरण्याची पद्धत आणि वेळ: मोजलेले प्रमाण घेवून पाइरीथायोबेक सोडीयम १०% ई.सी. ला प्रथम थोड्या पाण्यात घालून मिसळा, त्यानंतर पूरेश्या पाण्यात घालून संपूर्ण द्रावण बनवा व व्यवस्थित ढवळा. वाऱ्याच्या विरूद्ध दिशेने फवारणी करू नये. पायरीथायोबेक सोडियम १०% ई.सी. कपाशीच्या शेतात तणांच्या नियंत्रणासाठी अंकूरणापूर्वी आणि अंकुरणानंतरही वापरात आणू शकता. इतर तणनाशकांच्या प्रमाणे ह्यातही मातीत पुरेसा दमटपणा व थंड वातावरण होणे आवश्यक आहे. उष्णता व मातीत दमटपणाची कमतरता असल्यास वापर करू नये. तणांचे नियंत्रण द्रावणाचा वापर, मातीतील दमटपणा वर खूपशे निर्भर आहे.

फवारणीची वेळ: शक्यतो सकाळी आणि संध्याकाळी.

वारंवारता:१

कोणत्याही पिकावर कीटकनाशके फवारू नयेत अशी अवस्था: फवारणी करताना वरील सुचनांचे पालन करा.

फायदेशीर कीटक जसे की मधमाश्या आणि कीटकांचे नैसर्गिक शत्रू यांचे नुकसान टाळण्यासाठी घ्यावयाची खबरदारी.

१) मासे आणि इतर जल जीवांसाठी विषारी. म्हणूनच मत्स्यपालनच्या बाजूला वापर केला जावू नये.

२) मधमाशांच्या ठिकाणी फवारू नये. म्हणूनच अधिकाधिक वापर करताना मधमाशा सक्रिय असताना वापर करू नये.

विषबाधेची लक्षण: डोळे व त्वचेस जळजळ होवू शकते. संपर्कात आल्यास डोळे लाल होणे, अश्रू येणे असे होवू शकते. नाकास खाज येणे, श्वासोश्वासात त्रास होणे. कांपरे, असमन्वय.

प्रथमोपचार: श्वासद्वारे आत गेल्यास रूग्णास मोकळ्या हवेत आणा. त्वचा व डोळ्यांशी संपर्क झाल्यास भरपूर पाण्याने धुवा गिळले गेल्यास रूग्णास भरपूर दूध, अंड्यातील पांढरे, जिलेटीन सोल्यूशन द्या आणि डॉक्टरशी संपर्क साधा. जो पर्यंत डॉक्टर सांगत नाहीत तो पर्यंत उल्टी करवू नये. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिराय उलटया करू नका. बेशुध्द असलेल्या व्यक्तित काहीही देऊ नका.

विषोपचार : कोणताही खास विषोपचार नाही. सुरूवातीच्या टप्प्यावर गॅस्ट्रिक लव्हेजची शिफारस केली जाते. लक्षणानुसार उपचार करा.

पानांना विषारीपणा: शिफारस केलेल्या मात्रेत वापरलेअसता रोपांच्या पानांना विषारी नाही.

साठवण : तणनाशकाची पॅकेजिस वेगळ्या खोलीत वा जागेत इतर समान साठवणीच्या जागेपासून दूर तणनाशकाचे प्रमाण आणि प्रकारानुसार वेगळ्या कपाटात कडीकुलपात ठेवावे. तणनाशक साठवण करण्याची खोली वा जागा मजबूत बांधणीची, कोरडी, भरपूर उजेडाची व हवेशीर आणि पूरेशी लांबरूंद असावी जेणे करून पर्यावरणाशी वाफेने होणारे प्रदुषण टळेल.

सुरक्षा खबरदारी: १. अन्न पदार्थ व खाद्यान्य पासून दूर ठेवा. २. त्वचा व डोळे यांच्याशी संपर्क टाळा. ३. फवाऱ्याच्या वाफेचा श्वांस घाऊ नका. ४. फवारणीनंतर दूषित कपडे व शरीराचे अवयव पाण्याने नीट धुवून टाका. ५. फवारणी करतानां धूम्रपान, खाणे पीणे करू नका किवां काहीही चझाळू नका.६) फवारणी करताना संपूर्ण सुरक्षित कपडे वापरा.

वापरलेल्या डब्यांची विल्हेवाट, उपकरणे धुवणाचे पाणी आणि अतिरिक्त साहित्य. १) निर्माता, उत्पादन बनविणाऱ्याचे आणि हाताळणाऱ्यांचे कर्तव्य आहे की पॅकेजिस किंवा उरलेले द्रावण किंवा मशीनीतील धाण/पाणी यांची विल्हेवाट पर्यावरण किंवा पाणी प्रदुषित होणार नाही अशा सुरक्षित पद्धतीने लावावी. २) पुन्हा कामासाठी वापरली जाऊ नयेत म्हणून रिकामी पॅकेजिस उध्ळ्यावर टाकू नयेत. ३) रिकामी पॅकेजिस मोडून-तोडून वस्तीपासून दूर जागी जमिनीत खोल पुरावीत.

सावधगिरीचे विधान: ह्याचा वापर फक्त लेबल/ लिफलेट वर उल्लेख केलेल्या पीकां शिवाय इतर पीकांवर करू नये. कापणी नंतरच्या अनुप्रयोगासाठी वापरले जावू नये. लिफलेट मधे सांगितल्या प्रमाणे वापरानंतर डबे नष्ट करा. १) मासे आणि इतर जल जीवांसाठी विषारी. म्हणूनच मत्स्यपालनाच्या जवळ वापर केला जावू नये. २) मधमाशांच्या ठिकाणी फवारू नये. म्हणूनच, अधिकाधिक वापर करताना मधमाशा सक्रिय असताना वापर करू नये.

હીટવિડ

પાયરિથાયોબૅક-સોડિયમ ૧૦% ઈસી
(નીંદણનાશક)
ફક્ત ખેતીવાડીના ઉપયોગ માટે

પાયરિથાયોબૅક સોડિયમ ૧૦% ઈસી એ બીજા સંબંધિત ઘટકો સાથે સક્રિય ઘટક પાયરિથાયોબૅક-સોડિયમ ૧૦% વ/વ ધરાવતું નીંદણનાશક છે. એનો ઉપયોગ કપાસના પાકમાં મોટી સંખ્યામાં નીંદણોના નિયંત્રણ માટે કરવામાં આવે છે.

રાસાયણિક સંમિશ્રણ

સામગ્રી

પાયરિથિયોબૅક સોડિયમ એ.આઈ.	૧૦.૦% ભાર/ભાર
ડિમિનરલાઈઝ્ડ એક્વા	ક્યૂટી માત્રા% ભાર/ભાર
લોરિલ આલ્કોહોલ અને ઓક્ટાઈલ ફિનોલ ઈથૉક્સિલેટ મિશ્રણ	૨૫.૦૦% ભાર/ભાર
કુલ	૧૦૦.૦૦% ભાર/ભાર

ભલામણો:

પાક	જંતુનાં સામાન્ય નામ	હેક્ટર ઠીઠ માત્રા		મંઠ પલાવવા પાણી લી.	પાકના તબક્કા	પુનઃ પ્રવેશ સમય ગાળો	પૂર્વ-વણાઈ	શાતત્વતા
		સ.ત. ગ્રામ	દ્રાવણ લી.					
કપાસ	ટ્રાયન્થૈમા એસપી. (સાંઠી) કેનોપોડિયમ એસપી. (બથુઆ) ડાઝીરા એસપી (ટિઠાલા) ઍમરૅન્થસ એસપીપી સેલોસિયા આર્ગેન્ટિયા	૬૨.૫ - ૭૫.૦	૬૨૫-૭૫૦	૫૦૦	ઝાડીપૂર્વઉગી જમીનની ભેજવાળી સ્થિતિમાં વાવણી પછી ૩-૫ દિવસ.	૨૪ કલાક પછી	૧૬૦	૧

નોધ: જંતુનાશકના છંટકાવની ટેક્નિકના સંબંધી સારા વ્યવહારો.

ઉપયોગની દીધ: સૂચિત માત્રા ઉપયોગ કરો. સ્થાનાને પાણીની આવશ્યક માત્રામાં ઉમેરો.

હવામાનની સ્થિતિ (સામાન્ય): વરસાદ, પવન અને ગરમીના સમયગાળામાં છંટકાવ નહીં કરો.

માટી અને પાણી (જ્યાં લાગુ હોય): આ નીંદણનાશક પર્ણીય છંટકાવ માટે છે અને સૂચિત માત્રામાં ઉપયોગ કરાય ત્યારે કોઈ માઠી અસર ધરાવતું નથી.મત્સ્યપાલન નજીક ઉપયોગ કરવાનું ટાળો.

છંટકાવ માટે પાકના તબક્કા: પૂર્વ ઉદ્ભવ: ખાતરીપૂર્વકની જમીનની ભેજવાળી સ્થિતિમાં વાવણી પછી ૩-૫ દિવસ.

છંટકાવની ટેક્નિક: ફ્લેટ ફેન અથવા ફ્લડ જેટ નોઝલથી હિટ કલેવાં હાઈ વોલ્યુમ સ્પ્રેયર અને અસ્પી- એચપીટી પાવર સ્પ્રેયરનો ઉપયોગ કરીને પાયરિથિયોબેક સોડિયમ ૧૦% ઈસી છંટકાવ કરો.

ઉપકરણનો પ્રકાર: ફ્લેટ ફેન/ફ્લડ ફેટ નોઝલ સાથેનું નેપસેક સ્પ્રેયર

નોઝલનો પ્રકાર: ફ્લેટ ફેન અથવા ફ્લડ જેટ નોઝલ

માત્રા: ૫૦૦ મિલિ પાણીમાં હેક્ટર ઠીઠ ૬૨.૫થી ૭૫.૦ ગ્રા એ.આઈ. (૧. હેક્ટર ઠીઠ સ્થાનામાં ૬૨૫- ૭૫૦ મિલિ)

મિશ્રણ માટે સૂચના: ઉપયોગ પૂર્વે બોટલને બરોબર હલાવો. નિંદણનાશકની આવશ્યક માત્રા માપમાં લો અને ઓછી માત્રામાં પાણી સાથે સારી રીતે મિશ્રણ કરો. અણુકૂળ સ્પ્રેયર સાથે પાકના સંપૂર્ણ આવરણ માટે સારત હલાવતા ર હીને નિર્દિષ્ટ અનુસાર પાણીની બાકી માત્રા ચણ ઉમેરો.

પુનઃપ્રવેશ સમયગાળો: ૨૪ કલાક પછી

છંટકાવની રીત અને સમય: પાયરિથાયોબેક-સોડિયમ ૧૦% ઈસીની માપેલો જરૂરી લો, એમાં થોડુંક પાણી ઉમેરો, સંપૂર્ણ પણે મિશ્રણ કરો અને પછી પાણીનો બાકીનો જરૂરી ઉમેરો તે વખતે ખોટલી હલાવતા રહો. પવનની સામે રહી છંટકાવ કરશો નહીં. પાયરિથિયોબેક-સોડિયમ ૧૦% ઈસીનો ઉપયોગ કપાસમાં નીંદણોના નિયંત્રણ માટે નીંદણો ઉગતાં પહેલાં અથવા શરૂઆતમાં ઉગ્યા પછી અથવા તો ઉગ્યા પછી નીંદણનાશક તરીકે કરી શકાય છે. કોઈપણ બીજા નીંદણનાશક માટે હોય છે તેમ, શ્રેષ્ઠ પરિણામો માટે, જમીનમાં પૂરતો ભેજ અને ઠંડકવાળી પરિસ્થિતિઓમાં નીંદણનાશક શ્રાવણનો છંટકાવ કરવો આવશ્યક છે. પાયરિથિયોબેક-સોડિયમ ૧૦% ઈસીનો છંટકાવ ગરમ આબોહવા અને ભેજની તાણવાળી પરિસ્થિતિઓમાં કરશો નહીં. નીંદણ નિયંત્રણની હદ અને મુદ્દત જમીન તથા ભેજની પરિસ્થિતિઓ પર આધાર રાખે છે.

છંટકાવનો સમય: સવારે અને સાંજના સમયે કરવો.

સાતત્યતા: ૧

જંતુનાશક કોઈ પણ પાક છંટકાવ નહીં કરી શકાય તેવા તબક્કા: છંટકાવના સમયે ઉક્ત ઉલ્લેખિત સૂચનાઓનું પાલન કરો.

મધમાખીઓ અને જંતુના નૈસર્ગિક શત્રુઓ જેવા લાભકારી જંતુઓને હાનિ ટાળવા માટે લેવાની સાવચેતીઓ

૧.માછલી અને અન્ય સમુદ્રિ જગાવરો માટે ઝેરી. આથી મત્સ્યપાલન થતું હોય ત્યાં ઉપયોગ નહીં કરવો જોઈએ.

૨.મધમાખીઓ માટે ખતરો. આથી મધમાખી સક્રિય હોય ત્યાં વધુ ને વધુ ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ.

ઝેરની અસરનાં લક્ષણો: આંખ તથા ત્વચામાં થળ/બળતરા થઈ શકે. સંસર્ગ થતાં, આંખોમાં લાલાશ, આંસુ ગળવાં વગેરે થાય. નાકમાં થળ/બળતરા, શ્વાસમાં તકલીફ, ધ્રૂજારી, ક્રિયામાં વિસંગતિ.

પ્રાથમિક સારવાર : જો શ્વાસમાં જાય તો દરદીને તાજી હવામાં ખસેડો. ત્વચા અને આંખો દૂષિત થવા પામે, તો પુષ્કળ પાણીથી ધુસો અને તાલક માશે. જો ગળવામાં આવે, તો પુષ્કળ દૂધ પીલો, ઈંડાંની શ્વેતી અથવા જીલેટીન શ્રાવણ આપો અને ડૉક્ટરનો સંપર્ક સાધો. ડૉક્ટર સલાહ ન આપે ત્યાંસુધી ઉલટી કરાવશો નહીં. ડોક્ટરની સલાહ નહીં હોય ત્યાં સુધી ઊલટી નહીં કરાવવી. બેભાન વ્યક્તિને કશું પણ આપવું નહીં.

વિષનાશક: વોલ્ક્સ વિષનાશક નથી. વહેલા તબક્કામાં ગેસ્ટ્રિક લેવેજની ભલામણ છે. લક્ષણ પ્રમાણે ઉપચાર કરો.

વનસ્પતિ માટે ઝેરતત્વ: જ્યારે ભલામણો માત્રા મુજબ વાપરવામાં આવે ત્યારે વનસ્પતિ માટે ઝેરી નથી.

સંગ્રહ : નીંદણનાશકો ધરાવતું પૅકેજ બીજી વીજવસ્તુઓ સંગ્રહવા માટે વપરાતાં ઓરડા અથવા જગ્યાથી દૂર અલગ ઓરડા અથવા જગ્યામાં સંગ્રહવું અથવા નીંદણનાશકના જથ્થા અને પ્રકાર ઉપર આધારિત અલગ કબાટોમાં તાળાં-ચાવીમાં બંધ કરીને રાખવું. નીંદણનાશકના સંગ્રહ માટેનાં ઓરડા અથવા જગ્યા સારી બાંધણીનાં. સૂકાં, સારો પ્રકાશ ધરાવતાં અને હવાઉર તથા પૂરતી ઝોકવાળાં હોવાં જોઈએ જેથી નીંદણનાશકની વરાળથી પર્યાવરણીય પ્રદૂષણ થતું અટકાવી શકાય.

સાવચેતી: ૧. ખાદ્ય પદાર્થો અને ખોરાક ના મિશ્રણથી દૂર રાખો. ૨. ત્વચા અને આંખ નો સ્પર્શ ટાળો. ૩. છંટકાવના પ્રવાહીને શ્વાસમાં ન લો. ૪. છંટકાવ પછી દૂષિત કપડાં શરીરનાં ભાગોને બરાબર ધોઈ નાખો. ૫. છંટકાવ કરતી વખતે ધૂમ્રપાન ન કરો, ઠંઢપણ ખાઓ,પીઓ અથવા ચાવો નહિ.૬. છંટકાવ કરવા સમયે સંપૂર્ણ સુરક્ષાત્મક કપડાં પહેરો.

ઉપયોગ કરેલાં કન્ટેઈનરો, ઈક્વિપમેન્ટના ધોવાણનો કચરો અને વધારાની સામગ્રીનો નિકાલ:૧. ઉત્પાદકના ઉત્પાદકો, ટૈવાર કરનારાઓ અને જંતોવાલકોની એ જવાબદારી દરેકની કે પૅકેજીસ અથવા વધારાની સામગ્રી અને મશીનમાંથી ધોવાણ તથા યાત્રોનો એવી સલામત રીતમાં નિકાલ કરવામાં આવે જેથી પર્યાવરણનું તથા જળ પ્રદુષણ થતું અટકે. ૨.વપરાયેલાં પૅકેજીસ તેમનો ફરીથી ઉપયોગ થતો અટકે તે માટે બહાર છોડવાં નહીં. ૩. પૅકેજીસ ભાંગી નાંખવાં અને વસ્તીથી દૂર જમીનમાં દાટી દેવાં.

સાવચેતીનું નિવેદન: આ લેબલ /લીફલેટ પર ઉલ્લેખિત સિવાયના પાક પર અજમાવશો નહીં. લણણી પછી છંટકાવ માટે ઉપયોગ નહીં કરવો જોઈએ. કન્ટેઈનર ઉપયોગ પછી લીફલેટમાં નિર્દેશ અનુસાર શાશ કરો. ૧. માછલી અને અન્ય સમુદ્રિ જીવો માટે ઝેરી છે. આથી મત્સ્યપાલન થાય ત્યાં ઉપયોગ નહીં કરવો જોઈએ. ૨. મધમાખીઓ માટે ખતરો. આથી મધમાખી સક્રિય હોય ત્યાં વધુ ને વધુ ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ.

ہیٹوِیڈ

پائریتھایو بیک سوڈیم 10٪ ای سی
(گھاس پھوس مار دوا)
صرف زراعتی استعمال کے لیے کیڑے مار دوا

हिटवीड

पायरिथायोबेक सोडियम १०% ई.सी.
(चयनात्मक खरपतवारनाशक)
केवल कृषि उपयोग के लिए

पायरिथायोबेक सोडियम १०% ईसी एक खरपतवारनाशक है जिसमें सक्रिय तत्व पायरिथायोबेक सोडियम १०% के अलावा इसमे अन्य आवश्यक सहयोगी पदार्थ है । इसका उपयोग कपास की फसल में बहुत सारे खरपतवारों के नियंत्रण के लिए किया जाता है।

रासायनिक संरचना:

पायरिथायोबेक सोडियम स.त.	१०.००% भार/भार
आखनिज जल	आवश्याकतानुसार
लरिल एल्कोहल व ओक्टिल फिनोल इथोक्सिलेट के मिश्रण इमल्सीफायर	२५.००% भार/भार
योग	१००.००% भार/भार

सिफारिशें:

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा लीटर	फसल अवस्था	पुन: काल	पूर्व फसल	आवृति
		स.तत्व ग्राम	संरचना मि.ली		

ہٹ ویڈ

پائریتھایو یک سوڈیم 10٪ ای سی

(گھاس پھوس مار دوا)

صرف زرعی استعمال کے لیے کیڑے مار دوا

پیریتھیوبیک سوڈیم ای سی 10% ایک چنندہ گھاس پھوس کُش ہے جو کپاس میں بڑی بڑی پتّیوں والی جھاڑیوں کو قابو میں کرنے کیلئے استعمال ہوتی ہے۔ سفارش کے مطابق استعمال کریں۔

کیمیائی ترکیب:

اجزاء

پائریتھیوبیک سوڈیم اے آئی 10.0 ٪ وزن/وزن

معدنیات سے پاک پانی۔ کیو ایس ٪ وزن/وزن

ایتھاکسیلیٹڈ لاریل الکوحل اور اوکٹانیل فینول کا مرکب شیرہ ساز 25.00 ٪ وزن/وزن

کل میزان۔ 100.00 ٪ وزن/وزن

سفارشات:

فصل	جراثیم کا عام نام	مقدار/ایکڑ: اے آئی (گرام)	مقدار/ایکڑ: فارمولیشن (لیٹر)	کھیت/پانی (لیٹر)	فصل کاٹنے سے قبل	دوبارہ داخلہ کا وقت	تکرار
کپاس	ٹرائی ایتھیما ایس پی(سائتھی) جیننز یوٹیم ایس پی(سائتھی) ڈائیجیرا ایس پی (ٹینڈالا) امارنتھس ایس پی سیلوسٹرسا	62.5-75.0	625-750	500	مناسب رطوبت والی زمین میں بوائی کے 3 تا 5 دن کے بعد	کیفیت پر ہے۔	1

نوٹ:-جراثیم کش ادویات کے صحیح استعمال کی تکنیک۔

طریقہ استعمال: سفارش کی گئی خوراک استعمال کریں۔محلول پانی کی مطلوبہ مقدار میں ملائیں۔

موسمی حالت (یا لعموم): بارش،تیز ہوا اور تیز گرمی کے دوران استعمال نہ کریں۔

مٹی اور پانی (جہاں قابل عمل ہو): یہ گھاس پھوس کش پتوں پر چھڑ کا کیلئے ہے اور سفارش کی گئی خوراک کے استعمال سے یہ کوئی گزند نہیں پہنچا تی ہے۔ آبی زراعت کے نزدیک استعمال نہ کریں۔

فصل کے کس مرحلے پر استعمال کیا جائے :مناسب رطوبت والی زمین میں بوائی کے 3 تا 5 دن کے بعد۔

طریقہ استعمال:پائریتی تھیو بیک سوڈیم 10 % ای سی بائی والیوم سپرییر جیسے ASPEE-HTP پاور اسپریر جس کے ساتھ فلیٹ فین یا فلڈ نوزل لگی ہو،استعمال کر کے اسپرے کریں ۔

سامان کی قسم:بقچہ والا اسپریر جس کے ساتھ فلیٹ فین/فلڈ جیٹ نوزل ہو۔

نوزل کی قسم: فلیٹ فین یا فلڈ جیٹ نوزل

خوراک:62.5 سے 75.0 گرام اے آئی /ایکٹیر (625 تا 750ملی لیٹر/ایکٹیر محلول) 500 لیٹر پانی میں۔

ملائے کا طریقہ:بوتل کو استعمال سے قبل خوب ہلائیں۔گھاس پھوس کش کی مطلوبہ مقدار نکالیں اور اس کو پانی کی تھوڑی مقدارملائیں ۔مناسب چھڑکنے کے آلہ سےفصل میں مکمل استعمال کیلئےپانی کی باقی ماندہ مقدار بتائے گئے طریقے پر ملائیں۔

دوبارہ داخلہ کا وقفہ: چوبیس گھنٹے کے بعد

طریقہ استعمال اور وقت: پائریتھیوبیک سوڈیم ۱۰٪ ای سی کی مایع بوتی مقدار لیجئے اسکو پانی کی تھوڑی مقدار ملائیں، اچھی طرح سے ملائیں اور پھر پانی کی باقی ماندہ مقدارزور سے ہلائیے ہلائیے ملائیں۔ اندھی کے رخ میں سپرے نہ کریں۔ پائریتھیوبیک سوڈیم ۱۰٪ ای سی کو استعمال کیا جاسکتا ہے بطور ماقبل یا جلد مابعد یا مابعد نباتات کش دواروں میں کچھ کے کنٹرول کے لئے۔ جہاں تک دیگر نباتات کش ادویات کا تعلق ہے تو زمین کی بھر پور تری او رسرد ماحول میں دوا کے چھڑکاؤ کی ضرورت درکار ہے اچھے نتائج کے لئے۔ پائریتھیوبیک سوڈیم ۱۰٪ ای سی کو مت استعمال کریں گرم موسم میں اور نمی کی قلت میں ۔ کچھ کو قابو کرنے کا دارومدار مٹی اور نمی کے ماحول پر منحصر ہے۔

استعمال کا وقت: بہتر ہے کہ صبح اور شام کے وقت استعمال کیا جائے۔

تعداد تکرار: 1

وہ مرحلے جس وقت جراثیم کُش ادویات کسی بھی فصل پر استعمال نہیں کی جاتی چاہیے۔

اوپر دی ہوئی ہدایات اور وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے سبزی کش دوائی استعمال کریں۔

احتیاط سے کام لیں تاکہ مفید کیڑے مکوڑے جیسے شہد کی مکھیوں اور مضر کیڑوں کے دشمن کیڑے محفوظ رہ سکیں۔

1.مچھلیوں اور دیگر آبی جانداروں کیلئے زہریلی ہے۔اسلئے آبی زراعت میں استعمال نہ کی جائے۔

2.شہد کی مکھیوں پر استعمال منع ہے۔اس لئے زیادہ سے زیادہ استعمال کے دوران شہد کی مکھیوں کو زیرہ پوشی کیلئے استعمال نہ کریں۔

زہریلے اثر کی علامات: آنکھوں اور جلد میں جلن ہوسکتی ہے۔لمس ہونے پر آنکھوں میں سرخی ہوسکتی ہے،آنسو بہہ سکتے ہیں، ناک میں جلن،سانس لینے میں دقت،کھُجلی،تال میل کی کمی،سستی،مردود،متلی،قے،چکراور گھبر۔

ابتدائی طبی تدابیر: اگر نگل جائے تو بیمار کو تازہ ہوا میں لے لیجئے۔ آنکھوں او جلد کے آلودہ ہونے کی وجہ سے انکو دھو لیجئے خوب پانی سے۔ اگر نگل جائے تو اچھی مقدار میں دودھ پی لیجئے، سفیدی انڈے کی یا جیلیٹن محلول، اور ڈاکٹر سے رابطہ کیجئے۔ اُلٹی مت کیجئے بغیر ڈاکٹر صلاح نہ دے۔

ڈاکٹر کے مشورہ کے بغیر قے نہ کریں۔بے ہوش شخص کو کوئی چیز نہ کھلائیں۔

تریاق:**کوئی خاص تریاق دستیاب نہیں ہے۔ابتداء میں معدہ کے دھونے کی صلاح دی جاتی ہے۔علامات کے مطابق علاج کریں۔**

پودوں کے لئے زہریلا پن: سفارشی مقدار میں استعمال کرنے سے پودوں پر زہریلا اثر نہیں کرتی۔

اسٹوریج: چھڑکا محلول تیار کرنے کیلئے کھانا پکانے والے برتن استعمال نہ کریں۔ محلول کھانے کیلئے کوئی چھری یا سریا کا استعمال کریں۔دستانے،ماسکس یا کیڈا وغیرہ پہن کر ہی کام کریں۔دوا کو سونگھیں نہیں اور آنکھوں میں نہ چھونے دیں۔ چھڑکاؤ کرتے وقت حفاظت کرنے والے کپڑے،ماسک،گاگلز اور جوتے پہنیں۔ دوا کا استعمال کرتے ہوئے نہ کچھ کھائیں نہ پئیں اور نہ ہی سگریٹ نوشی کریں۔استعمال نہ ہونے محلول کو سنبھال کر رکھ رکھیں۔استعمال کرنے کے بعد،اپریز یا پانی اور دیگر برتنوں کو دوزانہ پانی سے دھو کر رکھیں۔کام پورا ہوچکنے کے بعد ہاتھوں کو پانی سے دھوئیں اور اپنا بدل لیں۔آلودہ کپڑوں کو بھی دھوئیں۔فاضح محلول کو اپریز یا پانیوں وغیرہ کو دھونے کے پانی کو بھاری نالیوں،تالابوں وغیرہ کو آلودہ نہ کریں۔زہریلے اثر کی کسی بھی نشانی کو دیکھتے ہی ڈاکٹر سے رابطہ قائم کریں۔

فرسٹ ایڈ: ۱۔دوا کے نگلے جانے پر حلق کے اندر گدگدی کر کے قے کرنے کے لئے اکسائیں۔ قے کا پانی صاف ہونے تک دوہراتے رہیں۔اگر مریض بے ہوش ہے تو قے کرنے کے لئے مت اکسائیں۔۳۔آلودہ ہوئے لباس اور بدن کے حصوں کو صابن پانی سے اچھی طرح دھو کے صاف کرلیں۔ ۴۔آنکھوں میں اثر ہوا ہو تو ۱۰۔۱۵ منٹوں تک صاف پانی سے دھوتے رہیں۔ ۵۔دوا کو سونگھ لیا ہو تو مریض کو تازہ ہوا میں لے جائیں۔ ۶۔چھڑکاو کے دوران مکمل حفاظتی کپڑے استعمال کریں۔

استعمال شدہ کنٹینر کو ضایع کرنا:صاف اور اضافی میٹیریل کو دھونا:

۱۔خالی ہوئے کنٹینروں کو تو ڑکر آڑا دی سے دو مرتبہ دھو کر پانی میں ڈبو کر رکھیں۔ ۲۔خالی کنٹینروں اور ہتھکوں کو باہری مقام پر اراتے دیں تا کہ دوبارہ استعمال نہ ہوں۔ ۳۔ہتھکوں،فالتو روگنی دوا اور دھونے کے پانی کو اس طرح حفاظت سے ضائع کریں کہ پانی،ماحولیات کی آلودگی نہ ہو۔

احتیاط: لیبل اور چپی میں دی گئی فصلوں کے علاوہ کسی فصل پر استعمال نہ کریں۔

فصل کی کٹائی کے بعد استعمال نہ کریں۔پرچی میں بتائے گئے طریقے پر کنٹینر استعمال کے بعضطائع کریں۔1.مچھلیوں اور دیگر آبی جانداروں کیلئے زہریلی ہے۔اسلئے آبی زراعت میں استعمال نہ کی جائے۔2.شہد کی مکھیوں پر استعمال منع ہے۔ **اس لئے زیادہ سے زیادہ استعمال کے دوران شہد کی مکھیوں کو زیرہ پوشی کیلئے استعمال نہ کریں۔**

ہیٹ ویڈ

پائریتھایو یک سوڈیم 10% ای سی

(கிளைக்கொல்லி)

பருத்திப் பயிரில் மட்டும் பயன்படுத்தக்கூடியது

இரசாயனச் சேர்க்கை:

மூலப் பொருள்

பைரிதியோபேக் சோடியம் ஏ.ஐ.	10.0% எ/எ
டிமினாரலைஸ்டு அக்வா	கி.கு.% எ/எ
இதோக்ஸைலேடெட் மிக்ஸ்சர் ஆஃப் லாரைல் அல்கஹால் அண்ட் அக்டைல் ஃபினோல் எல்ஸிஃபையர்	25.00% எ/எ
மொத்தம்	100.00% எ/எ

பரிந்துரைகள்

பயிர்	பூச்சிகளின் பொதுப்பெயர்	அளவு/ஒரு ஹெக்டேருக்கு: தீ.மு. (கிராம்)	ஃபார்மு-லேஷன் (லிட்டர்)	கலக்கும்	பயிரப் பருவம்	மருந்து தெளித்த பிறகு நடமாட்டம்	அறுவடைக்கு முன்னர்	அடிக்கடி பயன்பாடு
பருத்தி	ட்ரியாத்தமா எஸ்பி (சாத்தி) கொனோட்ரேச்சா எஸ்பி. (பாத்துவர்) டைகோர எஸ்பி. (டெண்டவர்) அமராந்தஸ் எஸ்பி(சிலெரேபா அஸ்ஹெடியா	62.5-75.0	625 - 750	500	விதைத்த 3-5 நாட்களில் நிலத்தில் ஈரப்பதம் தங்கியிருக்கும் நிலைமையில்	24 மணி நேரத்-திற்குப் பிறகு	160	1

கவனிக்கவும்: பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தெளிப்புக்கான தொழில்நுற்ப ஆலோசனைகள்.

பயன்படுத்தும் விதம்:- பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கும் மருந்தளவைப் பயன்படுத்த வேண்டும். தேவையான அளவு மருந்தை பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு நீரில் கலந்துகொள்ள வேண்டும்.

வானிலை நிலவரம் (பொதுவாக): மழைக் காலத்தில், காற்று வீசிக் கொண்டிருக்கும் போது அல்லது வெயில் தீவிரம் அதிகமாக இருக்கும் போது தெளிக்கக் கூடாது.

நிலம் மற்றும் நீர் (பொருந்தும் இடங்களில்): இந்த பூசணக்கொல்லி மருந்தை இலை தெளிப்பாகப் பயன்படுத்த வேண்டும், இவ்வாறு பயன்படுத்தும் போது பாதுப்பு ஏதும் ஏற்படாது. செயற்கை மீன் வளர்ப்பு இடங்களுக்க்கு அருகில் பயன்படுத்தக் கூடாது.

மருந்து தெளிப்புக் பயிர் பருவம்: விதைத்த 3-5 நாட்களில் நிலத்தில் ஈரப்பதம் தங்கியிருக்கும் நிலைமையில்

மருந்து தெளிக்கும் நை: பைரிதியோபாக்-சோடியம் 10% இசி மருந்தை அதிக கொள்ளளவு எலியோரேயர் மற்றும் அல்பீட்-எச்டிபி பவர் ஸ்பிரேயில் தட்டை விசிரி னை அல்லது வெள்ளப்பாய்வு னை பொருத்தி பயன்படுத்த வேண்டும்.

கருவி வகை: நாப்சாக் ஸ்பிரேயர் தட்டை விசிரி / வெள்ளப்பாய்வு கூம்பு னை பொருத்தியது.

கூம்பு வகை: தட்டை விசிரி அல்லது வெள்ளப் பாய்வு கூம்பு

மருந்தளவு: 62.5 தல் 75.0 கிராம் ஏ.ஐ. / ஹெக்டேர் (625 - 750 மிலி/ஹெக். தயாரிப்பு) 500 லிட்டர் தண்ணீரில் கலக்க வேண்டும்.

மருந்து தயாரிக்கும் குறிப்புகள்: மருந்து பாட்டிலை நன்றாகக் குலுக்கி திறந்து சிறிதளவு தண்ணீரில் தேவையான அளவு களைக்கொல்லி மருந்தை சேர்த்து நன்றாகக் கலக்க வேண்டும். மீதுள்ள தண்ணீரை இத்தாய் கரைசலுடன் சேர்த்து குலுக்கி குலுக்கி நன்றாகக் கலக்கி பொருத்தமான தெளிப்பானில் பயன்படுத்தும் விதமாக கரைசலைத் தயாரிக்க வேண்டும்.

மருந்து தெளித்த பிறகு நடமாட்டம்: 24 மணி நேரத்திற்குப் பிறகு

தெளிக்கும் றைபும் காலம்: தேவையான அளவு பைரிதியோபாக் சோடியம் 10% இசி எடுத்து சிறிது அளவு தண்ணீரி சேர்த்து நன்றாக கலந்துபின் மீதி தண்ணீரை ஊற்றி நன்றாக கலக்கவும். காற்றுக்கு எதிராக தெளிக்க கூடாது. பைரிதியோபாக்- சோடியம் 10 இசி பருத்திபயிரில் களை முளைவிடுவதற்கு முன்,அல்லது முளைவிட்ட இளம் பருவத்தில்அல்லது முளைவிட்ட பின் இதை பயன்படுத்தலாம். சிறந்த பலனுக்கு மண்ணில் போதுமான ஈரத்தன்மை மற்றும் குளிர்ந்த வெளாயிலே தெளிக்க வேண்டும். வெப்பமான குழ்நிலையிலும் வறண்ட நிலையிலும் இதை தெளிக்கக்கூடாது. இவைகளை பொருத்தேகளை கட்டுப்பாடு கால அளவு நிர்ணயிக்கப்படும்.

பயன்படுத்தும் காலம்: களைக்கொல்லி மருந்தை பெரும்பாலும் அதிகாலை அல்லது மாலை வேளையில் தெளிக்க வேண்டும்.

அடிக்கடி பயன்பாடு: 1

பயிர்கள் மீது பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை தெளிக்கக் கூடாத கட்டங்கள்: மேலே சொல்லப்பட்டிருக்கும் குறிப்புகளைப் பின்பற்றி மருந்தைத் தெளிக்க வேண்டும்.

நன்மை பயக்கும் பூச்சிகள் மற்றும் தீம்பூச்சிகளை வேட்டையாடும் உயிரினங்கள் மற்றும் தேனீக்களுக்கு தீங்கு ஏற்படாதிருக்க தேவைப்படும் எனெச்சரிக்கைகள்:

1.மீன் மற்றும் இதர பிற நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு இது தீங்கு விளைவிக்கும். ஆகையால், இதை செயற்கை மீன் வளர்ப்பு இடங்களில் பயன்படுத்தக் கூடாது.

2.தேனீக்களுக்கு தீங்காகும். அதனால் தேனீக்கள் சுறுசுறுப்பாகப் பறந்து கொண்டிருக்கும் சமயத்தில் மருந்தைத் தெளிக்கக் கூடாது.

நச்சுப்பட்டவர்களுக்கு தீங்காகும்: கண்களிலும், சருமத்திலும் எரிச்சல் ஏற்படும். மருந்து பட்டால் கண்கள் கிவக்கும். மூக்கில் எரிச்சல், மூச்க திணறல், நடுக்கம், ஒத்துழையாமை.

தலுதலவீ: உட்கவாசித்தால் பாதிக்கப்பட்டவரை சுத்தமான காற்றோட்டமுள்ள இடத்திற்கு கொண்டு செல்லவும். சருமத்திலும், கண்களிலும் பட்டால் தண்ணீர் பாய்ச்சி நன்றாக கழுவவும். விழுங்கிவிட்டால் அதிக அளவு பால், முட்டையின் வெள்ளை கரு அல்லது ஜிலேடின் கலவை பருகச் செய்யவும் மற்றும் மருத்துவரை அணுகவும். மருத்துவர் சொல்லும் வரை வாந்தி எடுக்கத் தூண்டாதீர்.மருத்துவர் குறிப்பிட்டு சொல்லாத வரை வாந்தி எடுக்க தூண்டக் கூடாது. சுவநினைவு இழந்திருப்பவருக்கு எதையும் கொடுக்கக் கூடாது.

நச்சறிவு: குறிப்பிட்ட நச்சறிவு எதுவுமில்லை. ஆரம்பக் கட்டத்தில் வயிற்றறைச் சுத்தம் செய்யும் நடைறையைப் பின்பற்ற வேண்டும். அறிகுறிகளுக்கு ஏற்ப சிகிச்சை அளிக்கவும்.

தாவரத்திற்கு நச்சு: சிபாரிக செய்யப்பட்ட அளவுகளில் உபயோகப்படுத்தினால் தாவரங்களுக்குநச்சுக்கப்பயக்காது.

கேமித்து வைத்தல்:

களைக்கொல்லி அடங்கிய பேக்கேஜ்களை பிறப் பொருட்களை கேமிக்கும் அறைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட அறைகளில் அல்லது தனி அலமாரியில் கேமித்து பூட்டி வைக்கவும். களைக்கொல்லியின் கேபிப்பு அறை நன்கு காட்டப்பட்டதாக, உலர்ந்ததாக, காற்றோட்டமுள்ளதாக, களைக்கொல்லியின் ஆவியினால் மாசு ஏற்படுவதை தவிர்க்க போதுமான பரப்பளவு கொண்டதாக இருக்க வேண்டும்.

முன்னெச்சரிக்கை:

1. உணவு பண்டங்கள், வெற்று உணவு பாத்திரங்கள் மற்றும் கால் நடைகளுக்கு அப்பால் வைக்கவும். 2. வாயிலும், கண்களிலும் மற்றும் சருமத்திலும் படுவதை தவிர்க்கவும். 3. தெளிப்பு சாறலை உட்கவாசிக்கக் கூடாது. காற்று வீசும் திசையிலேயே தெளிக்கவும். 4. தெளிப்பு முடிந்த பின் மாசுபட்ட ஆடைகளையும், உடல் பாகங்களையும் நன்றாக கழுவவும். 5. மருந்துபுக்கும்போது, புகை பிடிக்கவோ, பருகவோ, உண்ணவோ மற்றும் மெல்லவோ கூடாது. 6. மருந்தைக் கலக்கும் போதும் தெளிக்கும் போதும் மு பாதுகாப்பு உடைகளை அணிந்திருக்கவும்.

காலி பாத்திரம் கருவிகள், கருவிகளை அலம்பிய நீர் மற்றும் மீந்துவிட்ட கரைசலை அப்புறப்படுத்துதல்: 1. பேக்கேஜுகள் அல்லது எஞ்சிய பொட்டுக்கள் மற்றும் எந்திரத்தின் கழுவு நீர் மற்றும் கொள்கலன்களை சுற்றுப்புற சூழல் மற்றும் நீர் நிலைகளுக்கு மசுக ஏற்படாதவுறாறு பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்த வேணடியது உற்பத்தியாளர், கலவை தயாரிப்பாளர் மற்றும் உபயோகிப்பவரின் கடமை ஆகும். 2. உபயோகித்த பேக்கேஜுகளை மறுமுறை பயன்படுத்தும் வகையில் வெளியில் விட்டுவைக்கக் கூடாது 3. பேக்கேஜுகளை உடைத்து வசிப்பிடங்களுக்கு அப்பால் புதையக்கவும்.

எச்சரிக்கை அறிவிப்பு:லேபில் / கையேட்டில் குறிப்பிட்டிருக்கும் பயிர்களைத் தவிர்த்து இதர பிற பயிர்களில் இதைப் பயன்படுத்தக் கூடாது. அறுவடைக்குப் பிந்திய பயன்பாட்டிற்கு ஏற்றது அல்ல. கையேட்டிலுள்ள குறிப்புகளைப் பின்பற்றி கொள்கலன்களை அழித்துவிடவும். 1. மீன் மற்றும் இதர பிற நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு இது தீங்கு விளைவிக்கும். ஆகையால், இதை செயற்கை மீன் வளர்ப்பு இடங்களில் பயன்படுத்தக் கூடாது. 2. தேனீக்களுக்கு தீங்காகும். அதனால் தேனீக்கள் சுறுசுறுப்பாகப் பறந்து கொண்டிருக்கும் சமயத்தில் மருந்தைத் தெளிக்கக் கூடாது.

ফিটভীড

পাইরিথিয়োব্যাম-সোডিয়াম ১০% ইসি

(আগাছানাশক)

শুধুমাত্র কৃষিকাজে ব্যবহারের জন্যে

পাইরিথিয়োব্যাক-সোডিয়াম ১০% ইসি হচ্ছে আগাছানাশক, যাতে আছে ১০% ওজন/ওজন সক্রিয় পদার্থ পাইরিথিয়োব্যাক-সোডিয়ামের সঙ্গে অন্যান্য সহায়ক পদার্থসমূহ। ইহা তুলোর ফসলের ব্যাপক সংখ্যক আগাছা দমনের জন্যে ব্যবহৃত হয়।

রাসায়নিক গঠন :

উপাদান

পাইরিওব্যাক সোডিয়াম সক্রিয় উপাদান	১০.০০ % ওজন/ওজন
ডিমিনারালাইজড আ্যাকোয়া	কিউ.এস % ওজন/ওজন
লরিল অ্যাল্কোহল এর ইথক্সিলেটেড মিশ্রণ অক্টিল ফিনল ইমালসিয়ার	২৫.০০ % ওজন/ওজন
মোট	১০০.০০% ওজন/ওজন

সুপারিশ :

ফসল	কীটের সাধারণ নাম	হেক্টর পিছু মাত্রা: স.উ: (গ্রাম)	হেক্টর পিছু মাত্রা: ফর্মুলেশন (লি)	জলে তরলীকরণ (লি)	ফসলের অবস্থা	পুনঃ প্রবেশ সময়কাল	ফসল কাটার পূর্বে	ড্রিফ্রো য়েলি
কার্পাস	পুনর্নভা (ট্রিয়াম্ফেমা) বাথুয়া (সেনোপোডিয়াম) লাটামারি (ডিজেরা) জংলী নটে (অ্যামারান্থাস) সেলোসিয়া আর্জেন্টিয়া	৬২.৫-৭৫.০	৬২৫ - ৭৫০	৫০০	নিশ্চিত মাটির আর্দ্রতা পরিস্থিতিতে বপনের ৩ - ৫ দিন পরে	২৪ ঘণ্টা পরে	১৬০	১

দ্রষ্টব্য: কীটনাশক প্রয়োগ বিধি সম্পর্কিত ভাল অনুশীলন।

ব্যবহারের নির্দেশাবলী: সুপারিশ করা মাত্রা ব্যবহার করুন। ফর্মুলেশানটির সঙ্গে প্রয়োজনীয় মাত্রায় জল মিশিয়ে তরল করুন।

আবহাওয়া পরিস্থিতি (সাধারণত): বৃষ্টির দিনগুলিতে, প্রবল হাওয়ায় এবং উষ্ণ রোদ্রজ্বলন দিনে স্প্রে করবেন না।

মাটি এবং জল (যেখানে যা প্রয়োগযোগ্য): এই আগাছানাশক পাতার উপর প্রয়োগ করার জন্য এবং কোনও বিপরীত প্রভাব প।ে না যখন সুপারিশ করা মাত্রা ব্যবহার করা হয়। জলজ চাষের নিকটে ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

ব্যবহারের জন্য ফসলের অবস্থা: নিশ্চিত মাটির আর্দ্রতা পরিস্থিতিতে বপনের ৩ - ৫ দিন পরে

প্রয়োগের কৌশল: ফ্ল্যাট ফ্যান অথবা ফ্লাড জেট নজল লাগানো উচ্চ মাত্রার স্প্রেয়ার এবং এএসপিইই-এইচটিপি পাওয়ার স্প্রেয়ার ব্যবহার করে পাইরিথিয়োব্যাক-সোডিয়াম ১০% ইসি প্রয়োগ।

সরঞ্জামের প্রকার: ফ্ল্যাট ফ্লাড জেট নজল সহ ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার।

নজলের প্রকার: ফ্ল্যাট ফ্যান অথবা ফ্লাড জেট নজল

মাত্রা: ৫০০ লিটার জলে ৬২.৫০ থেকে ৭৫.০০ গ্রাম সক্রিয় উপাদান*হেক্টর (৬২৫ - ৭৫০ মিলি*হেক্টর ফর্মুলেশন)

মেশানোর জন্য নির্দেশ: ব্যবহারের পূর্বে বোতলটি ঝাঁকিয়ে নিন আগাছানাশকের প্রয়োজনীয় মাত্রা ওজন করে বের নিয়ে এবং অল্প জলের সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে নিন। উপযুক্ত স্প্রেয়ারের মাধ্যমে ফসলের উপর সম্পূর্ণ কভারেজের জন্য ভাল নাড়িয়ে নির্দেশ অনুযায়ী অবশিষ্ট জল মেশান।

পুনঃ-প্রবেশের সময়কাল: ২৪ ঘণ্টা পরে

পদ্ধতি এবং প্রয়োগের সময়: মধ্য মতো পাইরিথিয়োব্যাক-সোডিয়াম ১০% ইসি'র পরিমাণ নিয়ে তাতে অল্প পরিমাণ জল মেশান, ভালোভাবে মিশিয়ে তারপর উত্তমরূপে ঘুলিয়ে বাকী পরিমাণ জল মেশান। বাতাস বহার দিকে মুখ করে স্প্রে করবেন না। তুলোর আগাছা দমনের জন্যে অঙ্কুরোদ্গম-পরবর্তি আগাছানাশক হিসাবে পাইরিথিয়োব্যাক-সোডিয়াম ১০% ইসি প্রয়োগ করা যাবে। সেরা সুফলের জন্যে অন্য যেকোন আগাছানাশকের মতো পর্য্যাপ্ত আর্দ্রতা এবং শীতল পরিবেশের অধীনে আগাছানাশকের দ্রবণ স্প্রে করা একান্ত আবশ্যক। পাইরিথিয়োব্যাক-সোডিয়াম ১০% ইসি গরম আবহাওয়া এবং আর্দ্রতার কবল থাকা পরিবেশের অধীনে প্রয়োগ করবেন না। মাটি ও আর্দ্রতার অবস্থার ওপর নির্ভর করবে আগাছা দমনের ব্যাপ্ত তা তথা সময়কাল।

প্রয়োগের সময়: সকাল এবং বিকাল বেলায় প্রয়োগ করা শ্রেয়।

কতবার প্রয়োগ করা হবে : ১ সেই সময় অবস্থা যখন যে কোনও ফসলে কীটনাশক ব্যবহার **করা উচিৎ নয়:** প্রয়োগের সময় উপরে বর্ণিত নির্দেশগুলি পালন করুন।

বন্ধুকীট যেমন মৌমাছি এবং কীটের প্রাকৃতিক শত্রুর ক্ষতি থেকে বিরত থাকতে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

১.মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রানীদের পক্ষে বিষাক্ত। তাই,ড্রাইভিংএর জন্য জলজ চাষ করা উচি নয়।

২.মোমাছিদের জন্য ব্যবহার বন্ধ করুন। এইসজন্য,মধু সংগ্রহের সময় মোমাছিদের সক্রিয় থাকার সময় ব্যবহার করবেন না।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ - চোখ ও ত্বকের অস্বস্থিত্ব লক্ষণ হ'তে পারে। সংস্পর্শের ক্ষেত্রে চোখ লালচে, অশ্রুপাত হ'তে পারে। নাকের অস্বস্থি, শ্বাসকার্যের ধকল, কীপুনি, সুষম সঞ্চালন ক্ষমতার অভাব।

প্রাথমিক চিকিৎসা: শ্বাসে গেলে রোগীকে মুক্তবায়ুতে সরিয়ে নিন। চোখ ও ত্বকের সংক্রমণের ক্ষেত্রে প্রচুর জলের ঝাপ্টা দিয়ে ধুয়ে দিন। গিলে ফেললে প্রচুর দুধ, ডিমের সাদা অংশ বা জিলেটিন দ্রবণ পান করান এবং ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ডাক্তারের পরামর্শ না পাওয়া পর্যন্ত বমি করাবেন না। বমি করানোর চেষ্টা করবেন না যতক্ষণ না চিকিৎসক পরামর্শ নে দিচ্ছেন। অচৈতন্য ব্যক্তিকে কোনও কিছু দেবেন না।

প্রতিষেধক: কোনও নির্দিষ্ট প্রতিষেধক নেই। প্রাথমিক স্তরে গ্যাস্ট্রিক ল্যাভেজের সুপারিশ করা হয়ে থাকে। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন।

উদ্ভিদে বিষাক্ততা: অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করলে উদ্ভিদের পক্ষে বিষাক্ত নয়।

সংরক্ষণ - আগাছানাশক সম্বলিত প্যাক অন্যান্য পদার্থ মজুতের জন্যে ব্যবহৃত ঘর বা স্থান থেকে দূরে পৃথক ঘর বা স্থানে মজুত করতে হবে বা আগাছানাশকের পরিমাণ ও প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে তালা বন্ধ অবস্থায় পৃথক আলমারিতে রাখতে হবে। আগাছানাশক মজুতের জন্যে ব্যবহৃত ঘর বা স্থানটি হতে হবে সুনির্মিত, শুকনো, সুআছাদিত এবং বাতায়িত তথা আগাছানাশকের বাষ্পতার দ্বারা পরিবেশের সংক্রমণ হওয়া এড়াতে পর্য্যাপ্ত পরিসরযুক্ত।

সাবধানতা : ১. খাদ্য ও পশুখাদ্য থেকে দূরে রাখতে হবে। ২. ত্বক আর চোখে যেন না লাগে। ৩. স্প্রে করার সময় নাকে, গলায় যেন ছিটে না যায়। ৪. স্প্রে করার পর মিশ্রণ লেগে থাকা পোশাক এবং গোটা দেহ ধুয়ে ফেলতে হবে। ৫. স্প্রে করার সময় ধূমপান, পানীয় খাবার খাওয়া, কিংবা কোন জিনিষ চিবানো নিষেধ। ৬. স্প্রে করার সময় সুরক্ষামূলক জামাকাপড় পরুন।

ব্যবহৃত পাত্র, সরঞ্জাম ধোয়া জল এবং অবশিষ্ট সামগ্রীর নিষ্পত্তি: ১) উৎপাদের নির্মাতা, ফর্মুলাকারী এবংঅপারেটরের দায়িত্ব যে প্যাক বা উদ্বৃত্ত পদার্থ তথা মেশিন এবংপ্রাত্তিক ধোয়নি তলের এমন নিরাপদ উপায়ে বিনষ্ট করতেই হবে, যাতে পরিবেশ ও জলের দূষণ প্রতিরোধ হয়। ২) ব্যবহৃত প্যাকের পুনর্ব্যবহার রোধ করতে উহা যত্রতত্র ফেলে রাখবেন না। ৩) প্যাক ভেজে জনবসতি থেকে দূরে পুঁতে ফেলতে হবে।

সতর্কতা মূলক বিবৃতি: লেবেল ৭লিফলেটে উল্লিখিত নির্দেশ ব্যতীত অন্য কোনও ভাবে ফসলের উপর ব্যবহার করবেন না। ফসল কাটার পর ব্যবহারের জন্য নয়। ব্যবহারের পিছত লিফলেটে খালি পাত্রগুলি লিফলেটের নির্দেশ অনুজ্ঞী নিষ্পত্তি করুন। ১. মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীদের পক্ষে বিষাক্ত। তাই, জলজ চাষের জন্য ব্যবহার করা উচিৎ নয়। ২. মৌমাছিদের জন্য ব্যবহার চালু রাখা যাবে না। তাই, খাদ্য সংগ্রহের জন্য সক্রিয় থাকার সময় ব্যবহার করবেন না।

ہیٹ وِیڈ

پائریتھایو یک سوڈیم 10% ای سی

(کھیت کی کھرپتوار)

صرف کھیت کی کھرپتوار کے لئے

پائریتھیوبیک سوڈیم ای سی 10% ایک چنندہ کھیت کی کھرپتوار ہے جو کپاس میں بڑی بڑی پتیوں والی جھاڑیوں کو قابو میں کرنے کیلئے استعمال ہوتی ہے۔ سفارش کے مطابق استعمال کریں۔

کیمیائی ترکیب:

اجزاء

پائریتھیوبیک سوڈیم اے آئی 10.0 ٪ وزن/وزن

معدنیات سے پاک پانی۔ کیو ایس ٪ وزن/وزن

ایتھاکسیلیٹڈ لاریل الکوحل اور اوکٹانیل فینول کا مرکب شیرہ ساز 25.00 ٪ وزن/وزن

کل میزان۔ 100.00 ٪ وزن/وزن

سفارشات:

فصل	جراثیم کا عام نام	مقدار/ایکڑ: اے آئی (گرام)	مقدار/ایکڑ: فارمولیشن (لیٹر)	کھیت/پانی (لیٹر)	فصل کاٹنے سے قبل	دوبارہ داخلہ کا وقت	تکرار
کپاس	ٹرائی ایتھیما ایس پی(سائتھی) جیننز یوٹیم ایس پی(سائتھی) ڈائیجیرا ایس پی (ٹینڈالا) امارنتھس ایس پی سیلوسٹرسا	62.5-75.0	625-750	500	مناسب رطوبت والی زمین میں بوائی کے 3 تا 5 دن کے بعد	کیفیت پر ہے۔	1

نوٹ:-جراثیم کش ادویات کے صحیح استعمال کی تکنیک۔

طریقہ استعمال: سفارش کی گئی خوراک استعمال کریں۔محلول پانی کی مطلوبہ مقدار میں ملائیں۔

موسمی حالت (یا لعموم): بارش،تیز ہوا اور تیز گرمی کے دوران استعمال نہ کریں۔

مٹی اور پانی (جہاں قابل عمل ہو): یہ گھاس پھوس کش پتوں پر چھڑ کا کیلئے ہے اور سفارش کی گئی خوراک کے استعمال سے یہ کوئی گزند نہیں پہنچا تی ہے۔ آبی زراعت کے نزدیک استعمال نہ کریں۔

فصل کے کس مرحلے پر استعمال کیا جائے :مناسب رطوبت والی زمین میں بوائی کے 3 تا 5 دن کے بعد۔