HUSKIE®
PYRITHIOBAC SODIUM 4.5% W/W + GLYPHOSATE 60% W/W SG
Herbicide
For agricultural use

Type of Formulation : 1
Used for control target pest: Echinochloa colonum, Cynodon dactylon, Cyperus rotundus, Trianthema portulacastrum, Parthenium hysterophorus, Phyllanthus niruri, Cleome viscosa, Eclipta alba
Crop Name: Non-crop Area
Chemical Composition:

Pyrithiobac sodium a.i.:	4.50%w/w
Glyphosate a.i.:	60.00%w/w
Alkylpolyglycosides and Alkyldiaminealkoxylates	2.00%w/w
Cocobetaine cocoamidopropylbetaine, tallowamine-15-ethoxylate	3.00%w/w
Ammonium carbonate:	2.50%w/w
Ammonium Sulphate:	26.00%w/w
Demineralized Water:	2.00%w/w
Total :	100.00%w/w

Recommendation:

Name of the Corp	Common Name of the target pest	Waiting period from last spray to harvest (in days)	Active Ingredients (g)	Formulation (g)	Dilution in water (L)
Non crop area	Echinochloa colonum,Cynodon dactylon,Cyperus rotundus, Trianthema portulacastrum, Parthenium hysterophorus, Phyllanthus niruri,Cleome viscosa,Eclipta alba	-	882-903	1367-1400	500

Directions for use: Take the required quantity of product and mix it well with required quantity of water. Application is to be done through knapsack or backpack sprayer.
Weather conditions (in general): Do not spray during rainy, windy and hot sunny period.
Soil and water (where ever applicable): This Herbicide is for foliar application and has no adverse effect when used at recommended dose. Avoid using near aquaculture.
Crop stage for application – Days after sowing: It is applied on weeds as post emergence application.
Application techniques: Foliar application using high volume sprayers and ASPEE-HTP power sprayer fitted with flat fan or flood jet nozzle.
Equipment type: High volume sprayer viz. Knapsack sprayer with proper nozzle (flat-fan/ flood jet) nozzle.
Nozzle type: Flat-fan/ flood jet nozzle.
Dosage: 882 – 903 gm a.i. /ha (1.367 – 1.400 kg/ha formulation)
Instruction for Mixing: Measure out requisite quantity of the herbicide and mix it well with small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with stirring agitation for total coverage of crop with suitable sprayer.
Re-entry period: After 24 hours.
Pre Harvest Interval(PHI): Not applicable.
Manner and Time of application: Take the required quantity of product and mix it well with required quantity of water. Application is to be done through knapsack or backpack sprayer. Apply on weeds as post emergence application, recommendation which should have to at least 3 to 5 leaves so that translocation into the plant can occur.
Application timings: Apply on weeds as post emergence application, recommendation which should have to at least 3 to 5 leaves so that translocation into the plant can occur.
Frequency including maximum number of sprays: One application only refers to the above recommendation.
Stages during which pesticides should not be applied on any crop: Refer to the above recommendation only.
Precautions to be taken to avoid harm to the beneficial insects like honey bees and natural enemies of pests: Highly toxic to aquatic organisms, fresh water fish and honeybees with long lasting effects, thus product containing molecules may be avoided near aquaculture and should not be applied when bees are actively foraging.
Symptoms of poisoning: It is primarily irritant to skin, eyes and respiratory tract, headache, giddiness, nausea, vomiting and confusion.
First aid:1. If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1or 2 glasses of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. call the doctor. do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. 2. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. if patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth breathing. consult a physician. 3. In case of skin contact: Wash with soap and plenty of water. if pain, redness or irritation persists, consult a doctor. all the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. 4. In case of eye Contact: Rinse gently with plenty of water at least 15 minutes. if pain, irritation, redness or photophobia persists. Consult eye specialist.
Antidote Statement: No specific antidote. Treat symptomatically.
Safety Precautions: 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animal food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation of the spray mist. Spray in the direction of the wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. 7. No animal should be allowed to graze in the treated area.
Instructions for storage: 1. The rooms or premises meant for storing herbicides should be well lit, well built, cool, and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour. 2. The packages containing the herbicide should be stored/ transported in such a manner that they do not come in contact with food stuffs and animal feeds and store away from fire and open flame. 3. The herbicide should be stored in original packaging and separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles specially food stuff. It should be kept in separate almirah under lock and key depending upon the quality and nature.
Disposal of used containers, washing from equipment and surplus material: 1. The used packages shall not be left outside to prevent the re-use. 2. It shall be the duty of manufacturer/ formulators and operators to dispose packages or surplus materials & washings from the machine and container shall be disposed-off in a safe manner so as to prevent environment and water pollution. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.
Cautionary Statement: 1. This product is less toxic to aquatic organisms, fresh water fish and honey bees with long lasting effects, thus product containing molecules may be avoided near aquaculture and should not be applied when bees are actively foraging. 2. Toxic to aquatic organisms and avoid mixing with water bodies.3. Dangerous to re-use the empty container. 4. Destroy the container after use as directed on leaflet. 5. Not to be used on crops other than mentioned on this label / leaflets.

हस्की
पायरिथायोबेक सोडियम ४.५% भा/भा + ग्लाइफोसेट ६०.०% भा/भा एस.जी.
खरपतवारनाशक
केवल कृषि उपयोग के लिये

फॉर्मूलेशन का प्रकार : १
लक्ष्य कीट नियंत्रण हेतु उपयोग किया जाता है: स्वांक, दूब, मोथा,साँठी , गाजर घास,हजारदाना घास, हुरहुर,भांगरा
फसल का नाम : गैर फसल क्षेत्र
रासायनिक संरचना:

पायरिथायोबेक सोडियम स.त.:	४.५०%भा/भा
ग्लाइफोसेट स.त.:	६०.००%भा/भा
एल्काइल पोलीग्लाइकोसाइडस और एल्काइल डायमाइनालकोक्सी लेलेटस	२.००%भा/भा
कोकोबेटाइन कोकोमिडोप्रोपाइलबीटेन, टॉलोमाइन-१५-एथोक्सिलेट	३.००%भा/भा
अमोनियम कार्बोनेट:	२.५०%भा/भा
अमोनियम सल्फेट:	२६.००%भा/भा
अखनिजी जल:	२.००%भा/भा
कुल:	१००.००%भा/भा

अनुशंसा:

निगम का नाम	लक्ष्य कीटनाशक का सामान्य नाम	अंतिम स्प्रे से कटाई तक प्रतीक्षा अवधि (दिनों में)	सक्रिय सामग्री (ग्राम)	सूत्रीकरण (ग्राम)	पानी में घनत्वापन (लिटर)
गैर फसल क्षेत्र	स्वांक, दूब, मोथा, साँठी , गाजर घास, हजारदाना घास, हुरहुर,भांगरा	-	८८२-९०३	१३६७-१४००	५००

इस्तेमाल के लिए निर्देश : निश्चित मात्रा में ली हुरहुर खरपतवार नाशक को पहले थोडे पानी में डाल कर घोल लें तत्पश्चात आवश्यक पानी डालकर पूरा घोल बना लें व अच्छी तरह हिला लें और नेपसेक या बैकपैक स्प्रेयर्स से इसका उपयोग करें।
मौसम की स्थिति (सामान्य रूप में) : बरसात, हवा और तेज धूप के समय छिड़काव न करें।
मिट्टी और पानी (जहां भी लागू हो) : यह खरपतवार नाशक पत्तियों पर छिड़काव के लिए है और अनुशंसित मात्रा में उपयोग करने पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। जलीय कृषि के पास उपयोग करने से बचें।
आवेदन के लिए फसल चरण – दिखाने के बाद के दिन : इसे खरपतवारों पर अंकुरण के बाद के अनुप्रयोग के रूप में लगाया जाता है।
आवेदन तकनीक : उच्च मात्रा वाले स्प्रेयर और फ्लैट फैन या फ्लड जेट नोजल के साथ लगे ए.एस.पी.ई.ई.-एच.टी.पी.पावर स्प्रेयर का उपयोग करके पर्णीय अनुप्रयोग।
उपकरण के प्रकार: फ्लैट फैन/ फ्लड जेट नोजल लगे नैपसैक छिडकाव यंत्र।
नोजल प्रकार: फ्लेट–फैन/ फ्लड जेट नोजल
मात्रा बनाने की विधि : ८८२ – ९०३ ग्रा. स.त./हे. (१.३६७–१.४०० कि. ग्रा./हे.संरचना)
मिलाने का निर्देश : निश्चित मात्रा में ली हुई खरपतवार नाशक को पहले थोडे पानी में डाल कर घोल लें तत्पश्चात आवश्य क पानी डालकर पूरा घोल बना लें व अच्छी तरह हिला लें।
पुन: प्रवेश अवधि : २४ घंटो के बाद।
फसल पूर्व अंतराल(PHI) : लागू नहीं है।
आवेदन का तरी का और समय : निश्चित मात्रा में ली हुई खरपतवार नाशक को पहले थोडे पानी में डाल कर घोल लें तत्पश्चात आवश्यक पानी डालकर पूरा घोल बना लें व अच्छी तरह हिला लें और नेपसेक या बैकपैक स्प्रेयर्स से इसका उपयोग करें।
आवेदन का समय : खरपतवारनाशक का छिड़काव खरपतवार के अंकुरण के बाद जब कम से कम ३ – ५ पत्ते के हो ताकि खरपतवारनाशक का पौधे में अच्छी तरह से स्थानातरण हो सके।
स्प्रे की अधिकतम संख्या सहित आवृत्ति: उपरोक्त अनुशंसा का संदर्भ से केवल एक आवेदन करें।
चरणों के दौरान वे अवस्थाएं जिनके दौरान किसी भी फसल पर कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए:ऊपर दिए गए परामर्श का पालन करें
एहतियात मधु मक्खियों और कीटों के प्राकृतिक शत्रु जैसे लाभकारी कीडों को नुकसान से बचाने के लिए बरती जाने वाली सावधानियां: यह उत्पाद जलीय जीवों , ताजे पानी की मछली और मधु मक्खियों के लिए कम विषैला होता है , इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है, इसलिए इसका इस्तेमाल जलीय कृषि के आसपास नही किया जाना चाहिए और जब मधुमक्खियाँ सक्रिय हों तो इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
विषाक्तता के लक्षण : आंख और त्वचा में जलन हो सकती है। संपर्क में आने पर आंखों में लाली, सिरदर्द, चक्कर आना, जी मिचलाना, उल्टी , पसीना, अत्यधिक आँसू और लार आना हो सकता है।
प्राथमिक चिकित्सा: १. अगर निगल लिया: यदि व्यक्ति होश में है और सतर्क है, तो पानी से कुल्ला करें और १ या २ गिलास पानी पीने के लिए दें। बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछ भी कभी नहीं दें। चिकित्सक को बुलाएं। उपस्थित चिकित्सक न चाहे या जब तक वांछित न हो, उल्टी को प्रेरित न करें। २.अगर साँस ली जाए : रोगी को ताज़ी हवा में ले जाएँ और शरीर के तापमान का ध्यान रखें। यदि रोगी साँस नहीं ले रहा है या कठिनाई से साँस ले रहा है, तो कृत्रिम श्वसन दें, अधिमानत: मुँह से साँस लेने के साथ साथ एक चिकित्सक से परामर्श करें। ३.त्वचा संपर्क के मामले में: ढेर सारे साबुन और पानी से धो लें। अगर दर्द, लाली या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से सलाह लें। सभी दूषित कपड़ों को अलग कर देना चाहिए और उपयोग करने से पहले अलग से साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। ४. आँख से संपर्क के मामले में: कम से कम १५ मिनट तक ढेर सारे पानी से धीरे से धोएं। अगर दर्द, जलन, लाली या फोटोफोबिया बना रहता है तो नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लें।
विषनाशक कथन : कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षनानुसार उपचार करें।
सुरक्षा सावधानियां : १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें। २. मुँह, त्वचा और आंखों के संम्पर्क से बचायें। ३. प्रयोग करते समय सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा मे प्रयोग न करें। ४. प्रयोग के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोए। ५. प्रयोग के समय धुम्रपान, खाना पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. प्रयोग के समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। ७. उपचारित क्षेत्र में किसी भी जानवर को चरने नहीं देना चाहिए।
भंडारण के लिए निर्देश: १. जिस कमरे या अलमारी में खरपतवारनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सुखा, प्रकाशमय, हवादार तथा पर्याप्त आकार का होना चाहिये जिससे खरपतवारनाशक के भाप से वातावरण प्रदूषित होने का खतरा न रहे। २.डिब्बों का भंडारण तथा परिवहन इस प्रकार करें कि खाद्य पदार्थो या पशु आहार के संपर्क में न आये चूंकि यह ज्वलनशील है इसलिये आग से दूर रखें। ३.खरपतवारनाशक रखे हुए डिब्बों / पैकेजेस को अलग कमरों या उन कमरों या जगहों जिसमें अन्य वस्तुएं रखी जाती है, उनसे दूर रखना चाहिए या अलग अलमारियों में ताला चाबी लगाकर खरपतवारनाशक की प्रमाण व प्रकार के हिसाब से रखें।
प्रयुक्त कंटेनरों का निपटान: १. उपयोग किये गये डिब्बों को बाहर न फेंके जिससे उनका दुबारा प्रयोग न हो। २. यह खरपतवारनाशक निर्माता व उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि वह डिब्बों या बचे हुए खरपतवारनाशक तथा साधनों के धोवन का निपटारा सुरक्षित ढंग से करे जिससे वातावरण या पानी प्रदूषित न हो। ३. उपयोग किये गये डिब्बों को तोडकर आबादी से दूर जमीन में गाड़दें।
चेतावनी बयान:१. यह उत्पाद जलीय जीवों , ताजे पानी की मछली और मधुमक्खियों के लिए कम विषैला होता है, इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है, इसलिए इसका इस्तेमाल जलीय कृषि के आसपास नही किया जाना चाहिए और जब मधुमक्खियाँ सक्रिय हों तो इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। २. यह उत्पाद जलीय जीवों के लिए विषैला है और जल निकायों को इस से दूषित होने से बचायें। ३. खाली डिब्बो का पुन: उपयोग खतरनाक है। ४. पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात आद्यान को नष्ट करें। ५. लेबल और पर्चों पर जो अभिदत है, उससे भिन्न अन्य प्रयोजन मे उपयोग के लिए नहीं।

हस्की
पायरिथि ओबॅक सोडीयम ४.५% व/व+ ग्लायफोसेट ६०% व/व एस जी
तणनाशक
कृषि वापरासाठी

फॉर्मुलेशनचा प्रकार:१
लक्षित कीटकांच्या नियंत्रणासाठी वापरले जाते: इचिनोक्लोआ कॉलोनम, सायनोडॉन डॉक्टेलॉन, साय पेरस रोटंडस, ड्रायन्थेमा पोर्टुलाकास्ट्रम, पार्थेनियम हायस्टेरोफोरस, फिलान्यस निरूरी, क्लीओम व्हिस्कोमा, एक्लिपटा अल्वा.
पिकाचे नाव : पीक नसलेले क्षेत्र
रासायनिक संरचना :

पायरिथिओबॅक सोडियम स.त.	४.५०%व/व
ग्लायफोसेट स.त.	६०.००%व/व
अल्केल पॉलीग्लाइकोसाइडस आणि डायमाइनालकोक्सी लेलेटस	२.००%व/व
कोकोबेटाइन कोकोमिडोप्रोपाइलबेटेन, टॉलोमाइन–१५–एथोक्सिलेट	३.००%व/व
अमोनियम कार्बोनेट:	२.५०%व/व
अमोनियम सल्फेट:	२६.००%व/व
डिमिनरलाइज्ड पाणी	२.००%व/व
एकूण	१००.००%व/व

शिफारस:

पिकाचे नाव	कीटकचा सामान्य नाव	शेवटची फवारणी ते कापणी मधित वाट पाहण्याचा कालावधि दिवसात	स.त. (ग्रॅम)	द्रावण (ग्रॅम)	करण्य साठी पाणी (लीटर)
निंब–पाडली झाड्या	ईचिनोक्लोआ कोलोनम, सायनोडोन डेक्टाक्टोन, साईपरस रोटंडस, ड्रायन्थेमा पोर्टुलाकास्ट्रम, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, इयाटेन्थस निरूरी, क्लिओम विस्कोसा, अेक्लिप्टा आल्बा.	-	८८२–९०३	१३६७–१४००	५००
पीक नसलेले क्षेत्र	इचिनोक्लोआ कॉलोनम, सायनोडॉन डॉक्टेलॉन, साय पेरस रोटंडस, ड्रायन्थेमा पोर्टुलाकास्ट्रम, पार्थेनियम हायस्टेरोफोरस, फिलान्यस निरूरी, क्लीओम व्हिस्कोमा, एक्लिप्टा अल्वा.	-	८८२–९०३	१३६७–१४००	५००

वापरासाठी निर्देश : आवश्यक प्रमाणात उत्पादन घ्या आणि त्यात चांगले मिसळा आवश्यक प्रमाणात पाणी. फवारणी नॅपसॅक किंवा बॅकपॅक स्प्रेअरद्वारे केला जातो.
हवामान परिस्थिती (सर्वसाधारणपणे): पावसाळी, वादळी आणि कडक उन्हात फवारणी करू नका.
माती आणि पाणी (जेथे कधीही लागू असेल) : हे तणनाशक पर्णासंबंधी वापरण्यासाठी आहे आणि शिफारस केलेल्या डोसमध्ये वापरल्यास कोणतेही प्रतिकूल परिणाम होत नाहीत. जवळील मत्स्यशेती वापरणे टाळा.
फवारणीसाठी पिकाची अवस्था: पेरणीनंतरचे दिवस : ते तणांवर उगवल्यानंतर वापरले जाते.
कॉल्पिथेशन तंत्र: हाय वॉल्यूम स्प्रेअर्स आणि फ्लॅट फॅन किंवा फ्लड जेट नोजलसह एस्पीईईई – एचटीपी पॉवर स्प्रेअर वापरून पर्णिय फवारणी.
उपकरण प्रकार : हाय वॉल्यूम स्पेअर उदा. योग्य नोजल (फ्लॅट– फॅन/फ्लड जेट) नोजलसह नॅपसॅक स्प्रेअर.
नोजल प्रकार : फ्लॅट–फॅन / फ्लड जेट नोजल.
डोस :८८२ – ९०३ ग्रा.स.त. / हेक्टर (१.३६७–१.४०० किग्रॅ /–हेक्टर फॉर्मुलेशन)
मिश्रण संबंधी निर्देश: तणनाशकाची आवश्यक मात्रा मोजा आणि थोडया प्रमाणात पाण्यात मिसळा. सांगितल्याप्रमाणे उरलेले पाणी पूर्ण पणे हलवून टाकावे. संपूणा शेतासाठी योग्य स्प्रेअर.
पुन: प्रवेश कालावधी: २४ तासांनंतर.
कापणीपूर्व अंतर (पीएचआई) :लागू नाही.
फवारणी करण्याची पद्धत आणि वेळ : आवश्यक प्रमाणात उत्पादन घ्या आणि आवश्यक प्रमाणात पाण्यात मिसळा. पावारणी नॅपसॅक किंवा बॅकपॅक स्प्रेअरद्वारे केला जातो. जगलत्या– नंतर फवारणी म्हणून तणांवर फवारा, शिफारसी ज्यामध्ये किमान ३ ते ५ पाने असावीत जेणेकरून तणनाशकाचे रोपात चांगल्या प्रकारे स्थानांतरण होवू शकेल.
फवारणीच्या वेळा : उगवल्यानंतर फवारणी म्हणून तणांवर फवारा, शिफारस ज्यामध्ये किमान ३. ते ५ पाने असावीत जेणेकरून तणनाशकाचे रोपात चांगल्या प्रकारे स्थानांतरण होवू शकेल.
फवारणीच्या कमाल संख्येसह वारंवारता: फक्त एक फवारणी वरील शिफारसी पहा.
कोणत्याही पिकावर कीटकनाशके फवारू नयेत अशी अवस्था: फक्त वरील शिफारस पहा.
फायदेशीर कीटक जसे की मधमाश्या आणि कीटकांचे नैसर्गिक शत्रू यांचे नुकसान टाळण्यासाठी घ्यावयाची खबरदारी. हे उत्पादन जलीय जीव , गोड्या पाण्यातील मासे आणि मधमाशांसाठी कमी विषारी आहे आणि दीर्घकाळ टिकणारे परिणाम आहेत, त्यामुळे ऱ्हयू असलेले उत्पादन मत्स्यपालना जवळ टाळले जाऊ शकते आणि मधमाश्या सक्रिय पणे मधगोळा करताना तेथे फवारणी करू नये.
विषबाधेची लक्षणे: हे प्रामुख्याने त्वचा, डोळे आणि श्वसनमार्गास त्रासदायक आहे, डोकेदुखी, चक्कर येणे, मळमळ, उलटया आणि गोंधळ.
वापरासाठी निर्देश: तणनाशकाची आवश्यक मात्रा मोजा आणि थोडया प्रमाणात पाण्यात मिसळा. सांगितल्याप्रमाणे उरलेले पाणी पूर्ण पणे हलवावे. वाचाव्हके तोंड करून फवारणी करू नये. गरम हवामान आणि ओलावा तणावाच्या परिस्थितीत पायरिथायोबेक सोडियम ३.१% व/व + पेन्डीमिथालीन ३४%व/व डोकडी लागू करू नका. तण नियंत्रणाचा कालावधी आणि माती आणि आद्रैतावर अवलंबून असतो.
फवारणीचा कालावधि: बी पेरणीच्या १–३ दिवसांच्या आत अंकूरणा पूर्वी (खारीशीर मातीचा ओलावा असलेल्या परिस्थितित).
फवारणीचे टेक्निक: फवारणीचे कळी पाहिजे.
फवारणीची उपकरणे आणि नोझल: हाई वॉल्यूम स्प्रेयर जसे, नॅपसॅक स्प्रेयर योग्य (फ्लॅट–फॅन/फ्लड जेट) नोझलसह .
सुरक्षा सावधानी: १. अन्न पदार्थ व खाद्यान्य पासून दूर ठेवा. २. त्वचा व डोळे यांच्याशी संपर्क टाळा. ३. फवाऱ्याच्या वाफेचा श्वास घाऊक नका. ४. फवारणीनंतर दूषित कपडे व शरीराचे अवयव पाण्याने नीट धुवून टाका. ५. फवारणी करतानां धूम्रपान, खाणे पीणे करू नका किंवा काहीही चघळू नका. ६.) हातात्राणी करताना संपूर्ण सुरक्षित कपडे घाला.
विषबाधाची लक्षण: कोणतेही खास विष लक्षण नाही. डोकेदुखणे, चक्कर, मळमळ, उल्टी, घाम येणे, जास्त अश्रु येणे आणि लाळ निर्माण होवू शकते.
प्रथमोपचार: जर गिळले गेल्यास: व्यक्ती शुध्दीवर असेल तर,पाण्याने तोंड स्वच्छ धुवा आणि १ किंवा २ ग्लास पाणी पिण्यास दया.व्यक्ती जर बेशुध्द असेल तर तोंडाद्वारे काहीही देवू नये. डॉक्टरला बोलवा.जोपर्यंत उपस्थित चिकित्सका द्वारे उल्टी करण्यास सांगितले जात नाही तो पर्यंत उल्टी करू नये. **जर श्वासाद्वारे आत गेल्यास:** रूग्णास मोकळ्या हवेत आणा आणि शरीर तापमानावर लक्ष देवा. जर रूग्ण श्वास घेत नसेल वा श्वास घेण्यास त्रास होत असेल तर कृत्रिम श्वसन द्या, शक्यतो तोंडाने तोंडस श्वासोच्छ्वास दया. चिकित्सकाचा सल्ला घ्या . **जर त्वचेशी संपर्क आल्यास:** शरीराशी संपर्क आलेला भाग साबण व भरपूर पाण्याने धुवा, वासस केस व नखे देखील धुवा, जर वेदना, लालसरपणा किंवा जळजळ कायम राहिल्यास डॉक्टरचा सल्ला घ्या सर्व दूषित झालेले कपडे वेगवेगळे आणि वापर करण्यापूर्वी व्यवस्थित पणे साबण व पाण्याने वेगळे धुतले पाहिजेत. **जर डोळ्यांशी संपर्क झाल्यास:** तर डोळे भरपूर पाण्याने जवळ–जवळ १५ मिनिटे स्वच्छ धुवा, जर वेदना, जळजळ सहन होत नसेल लालसर पणा व प्रकाश अतिवेदन होत असेल तर नेत्र चिकित्सकाचा सल्ला घ्या.
विषरोधकता: कोणताही खास उपचार माहीत नाही, लक्षणानुसार उपचार करा.
सुरक्षितता खबरदारी:१) अन्नपदार्थ, अन्नपदार्थाचे रिकामी डबे आणि जनावरांच्या चाऱ्यापासून दूर ठेवा. २) तोंड, डोळे आणि त्वचेशी संपर्क होवू देवू नका. ३) फवारणीचे तुषार श्वासाद्वारे आत घेवू नका. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा. ४) फवारणी नंतर दूषित झालेले कपडे आणि शरीराचा भाग स्वच्छ धुवा. ५) फवारणी करताना धुम्रपान, खावू–पीवू वा चघळू नये. ६) फवारणी द्रावण बनविताना संपूर्ण संरक्षित कपडे वापरावेत. ७) उपचार केलेल्या ठिकाणी कोणत्याही प्राण्यांना चरण्यास परवानगी देऊ नये.
साठवणीसाठी सुचना: १. त्यां खोलीत वा कपाटात तणनाशकाची साठवण करायची असेल तौ मजबूत बांधणीची, भरपूर प्रकाशाची थंड आणि पूरशी ओबरूंद असावी जेणे करुन तणनाशकाच्या वाफेने वातावरण दूषित होण्याचा धोका होणार नाही.२. पॅकेजिसची साठवण आणि परिवहन अशा प्रकारे करावी की अन्य पदार्थ वा जनावरांच्या चाऱ्याशी संपर्क होय देय नका. कारण हे ज्वलनशील आहे म्हणून आगी पासून दूर ठेवा. ३. तणनाशक ठेवलेल्या पॅकेजीसना वेगळ्या खोलीत वा त्या खोलीत वा जागेत जिथे इतर वस्तू ठेवल्या जातात त्या पासून दूर ठेवले पाहिजे वा वेगळ्या कपाटात कुलूप घालौत तणनाशकाच प्रमाण व प्रकाराच्या हिशोबाने ठेवावे.
वापरलेल्या डब्यांची विल्हेवाट, उपकरणे धुवणाचे पाणी आणि अतिरिक्त साहित्य. १) पुन्हा कामासाठी वापरली जाऊ नयेत म्हणून रिकामी पॅकेजिस उघड्यावर टाकू नयेत. २) निर्माता, उत्पादन बनविणाऱ्याचे आणि हाताळणाऱ्यांचे कर्तव्य आहे की पॅकेजिस किंवा उरलेले द्रावण किंवा मशीनतील धाण/पाणी यांची विल्हेवाट पर्यावरण किंवा पाणी प्रदुषित होणार नाही अशा सुरक्षित पद्धतीने लावावी. ३) रिकामी पॅकेजिस मोडून–तोडून वस्तीपासून दूर जगी जमिनीत खोल पुरावीत.
सावधगिरीचे विधान : १) हे उत्पादन जलीय जीव, गोड्या पाण्यातील मासे आणि मधमाशांसाठी कमी विषारी आहे आणि दीर्घकाळ टिकणारे परिणाम आहेत, त्यामुळे ऱ्हयू असलेले उत्पादन मत्स्यपालना जवळ टाळले जाऊ शकते आणि मधमाश्या सक्रिय पणे मधगोळा करताना तेथे फवारणी करू नये.२) जलीय जीवांसाठी विषारी आणि पाण्यामध्ये मिसळणे टाळा.३) रिकाम्या डब्यांचा पुर्नवापर धोकादायक आहे.४) खरपतवार निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात आद्यान को नष्ट करा ५) लेबल आणि पत्रकांवर निर्देशित केलेल्या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरले जावू नये.

હુસ્કી
પાયરીથાયોબેક સોડીયમ ૪.૫% ભાર / ભાર + ગ્લાયફોસેટ ૬૦% ભાર / ભાર એસજી
નિંદણનાશક
કૃષિ ઉપયોગ માટે

દવાનો પ્રકાર: ૧
કયા લક્ષવાળા જંતુને કાબૂમાં લેવા માટે ઉપયોગ: ઈચિનોક્લોઆ કોલોનમ, સાયનોડોન ડૅક્ટેલૉન, સાઈપરસ રોટંડસ, ડ્રાયન્થેમા પોર્ટુલાકાસ્ટ્રમ, પાર્થેનિયમ હાયસ્ટેરોફોરસ, ફિલાન્યસ નિરૂરી, વ્લીઓમ વિસ્કોમા, એક્લિપટા અલ્બા.
પાકનું નામ: બિન–પાકની જગ્યા
રાસાયણિક સંરચના :

પાયરિથાયોબેક સોડિયમ એ.આઈ.	૪.૫૦% ભાર / ભાર
ગ્લાયફોસેટ એ.આઈ.	૬૦.૦૦% ભાર / ભાર
આલ્કાઈલપોલીગ્લાયકોસાઈડીસ મે આલ્કાઈલ ડાયમાઈનઆલ્કોક્સિલેટીસ	૨.૦૦%ભાર / ભાર
કોકોબેટિઈન કોકોઅમિડોપ્રોપાઈલબેટિઈન, ટેલોઅમાઈન–૧૫–એથોક્સિલેટ	૩.૦૦% ભાર / ભાર
એમોનિયમ કાર્બોનેટ	૨.૫૦% ભાર / ભાર
એમોનિયમ સલ્ફેટ	૨૬.૦૦% ભાર / ભાર
ડિમિનરલાઈઝ્ડ પાણી	૨.૦૦% ભાર / ભાર
કુલ	૧૦૦.૦૦% ભાર / ભાર

ભલામણો:

પાકનું નામ	જંતુનાં સામાન્ય નામ	છેલ્લા છંટકાવથી લણણી સુધીની પ્રતિક્ષા અવધિ (દિવસોમાં)	એ.આઈ. (ગ્રામ)	ફૉર્મ્યુલેશન (ગ્રામ)	પાણીમાં ઉમેરણ (લિટર)
બિન–પાકની જગ્યા	ઈચિનોક્લોઆ કોલોનમ, સાયનોડોન ડેક્ટાક્ટોન, સાઈપરસ રોટંડસ, ડ્રાયન્થેમા પોર્ટુલાકાસ્ટ્રમ, પાર્થેનિયમ હિસ્ટેરોફોરસ, ફાલાન્યસ નિરૂરી, ક્લિયોમ વિસ્કોસા, એક્લિપ્ટા આલ્બા.	-	૮૮૨–૯૦૩	૧૩૬૭–૧૪૦૦	૫૦૦
પીક નસલેલે ક્ષેત્ર	ઇચિનોક્લોઆ કૉલોનમ, સાયનોડૉન ડૉક્ટેલૉન, સાઇપરસ રોટંડસ, ડ્રાયન્થેમા પોર્ટુલાકાસ્ટ્રમ, પાર્થેનિયમ હિસ્ટેરોફોરસ, ફાલાન્યસ નિરૂરી, ક્લિયોમ વિસ્કોસા, એક્લિપ્ટા અલ્બા.	-	૮૮૨–૯૦૩	૧૩૬૭–૧૪૦૦	૫૦૦

ઉપયોગ માટે નિર્દેશ: આવશ્યક માત્રામાં ઉત્પાદન લો અને આવશ્યક પાણીની માત્રા સાથે સારી રીતે મિશ્રણ કરો. છંટકાવ નોઝલ અથવા બેકપેક સ્પ્રેયરથી કરવાનો રહેશે.
હવામાનની સ્થિતિઓ (સર્વસાધારણપણે): વરસાદી, વાદળી અથવા કડક ઉન્હાત ફવારણી કરવ નકા.
માટી અને પાણી (જ્યાં લાગુ હોય): આ નિંદણનાશક પર્ણીય છંટકાવ માટે છે અને ભલામણ કરેલી માત્રામાં ઉપયોગ કરાય ત્યારે તેની કોઈ માઠી અસર થતી નથી. મત્સ્યપાલન કરાતું હોય તેની નજીક ઉપયોગ નહીં કરવો જોઈએ.
છંટકાવ માટે પાકના વબક્તા– વાવણી પછી દિવસોમાં: નિંદણ ઊભરવા પશ્ચાત છંટકાવ કરવાની રહે છે.
છંટકાવની ટેક્નિક: પાર્ણીય છંટકાવ માટે ફ્લેટ ફેન અથવા ફ્લડ જેટ નોઝલથી ફિટ કરેલું હાઈ વોલ્યુમ સ્પ્રેયર અને અસ્પી– એસટીપી પાવર સ્પ્રેયરનો ઉપયોગ કરો.
ઈંજિયોમેન્ટલો પ્રકાર: હાઈ વોલ્યુમ સ્પ્રેઅર વડા. યોગ્ય નોઝલ (ફ્લેટ– ફેન /ફ્લડ જેટ) નોઝલ સાથેનું નૅપસૅક સ્પ્રેઅર.
નોઝલનો પ્રકાર: ફ્લેટ– ફેન / ફ્લડ જેટનોઝલ.
માત્રા: ૮૮૨– ૯૦૩ ગ્રા એ.આઈ. / હેક. (૧.૩૬૭–૧.૪૦૦ કિગ્રા / હેક્ટર. સ્વરૂપ)
મિશ્રણ માટે સૂચનાઓ: નિંદણનાશકની આવશ્યક માત્રા માપમાં લો અને થોડી માત્રામાં પાણી સાથે ભળેભર મિશ્રણ કરો. હવે સ્વાત હલવવાં દહીની મિશ્રિત અશુદ્ધાત બાકી પાણી પણ ઉમેરી દો. અનુકૂળ સ્પ્રેયર સાથે પાકના સંપૂર્ણ આવરણ માટે .
પુનઃપ્રવેશ શમયગાળો: ૨૪ કલાક પછી.
પૂર્વ લણણી અંતર (પીએચઆઈ): લાગુ નહીં.
છંટકાવની રીત અને સમય: આવશ્યક માત્રામાં ઉત્પાદન લો અને આવશ્યક પાણીની માત્રા સાથે સારી રીતે મિશ્રણ કરો. છંટકાવ બેકપેક અથવા બેકપેક સ્પ્રેયરથી કરવાનો રહેશે. નિંદણ ઊભર્યા પછી છંટકાવ કરો. કમોડેલમ ૩ થી ૫ પાન આવેલાં હોવાં જોઈએ, જેથી છોડમાં ટ્રાન્સલોકેશન ઉપભવી શકે.
છંટકાવનો સમય: નિંદણ ઊભર્યા પછી છંટકાવ કરો. કમોડેલમ ૩ થી ૫ પાન આવેલાં હોવાં જોઈએ, જેથી છોડમાં ટ્રાન્સલોકેશન ઉપભવી શકે.
છંટકાવની મહત્તમ સંખ્યા સહિત આવર્તવતા: એક છંટકાવ. ઉક્ત ભલામણ જ અનુસરો.
જંતુનાશક કોઈ પણ પર છંટકાવ નહીં કરી શકાય તેવા વબક્તા: ઉક્ત ભલામણ જ અનુસરો.
**મધમાખીઓ અને જંતુના નૈસર

ஹஸ்கி
பைரிதியோபேக் சோடியம் 4.5% எ/எ+ கிளைஃபோசேட் 60% எ/எ எஸ்ஜி களைக்கொல்லி
வேளாண் பயன்பாட்டிற்கு

கரைசல் வகை : 1
இலக்கு பூச்சிகள் கட்டுப்பாட்டிற்கான பயன்பாடு : எகினோக்லோவா கோலோனம், பாரித்தினியம் ஹிஸ்டிரிபோரஸ், பைலாந்தஸ் மாக்சிமஸ், ஸ்டாலர் ஹார்னாடஸ், ஸ்டாலர் ஹார்னாடஸ் ஹார்னாடஸ் ஹார்னாடஸ், ஸ்டாலர் ஹார்னாடஸ் ஹிஸ்டிரிஸ்ஹார்னாடஸ், ஃபாஸ்ஃபரியமம் ஹிஸ்டிரிஸ்ஹார்னாடஸ், ஃபாஸ்ஃபரியமம் சிலியம், ஹிப்பீஸ்ட்ரம் ஸ்பிரியம், ஃபாஸ்ஃபரியமம் சிலியம், ஹிப்பீஸ்ட்ரம் அல்பா.
பயிர்பெயர் : தரிசு நிலம்
இரசாயனச் சேர்க்கை: அடக்கம் (% எ/எ)
பைரிதியோபேக் சோடியம் ஏ.ஐ. 4.50% எ/எ
கிளைஃபோசேட் ஏ.ஐ. 60.00% எ/எ
அல்கைல்பாலிகிளைகோசைட்ஸ் அண்ட் அல்கைல்டையமின்அல்கோக்ஸைலேட்ஸ் 2.00% எ/எ
கோகோபிடெய்ன் கோகோஅமி டோப்ருரொமைல்பிடெய்ன், டாலோவமைன் -15-இதோக்ஸைலேட் 3.00% எ/எ
அம்மோனியம் கார்பொனேட் 2.50% எ/எ
அம்மோனியம் சல்பேட் 26.00% எ/எ
டிமினரலைல்ஃப் வாட்டர் 2.00% எ/எ
மொத்தம் 100.00 % எ/எ
பரிந்துரைகள்:

பயிர்கள்	பூச்சியின் பெயர்	கடைசி தெளிப்பு மற்றும் அறுவடைக்கு இடையே காத்திருக்கும் காலம் (நாட்கள்)	ஏ.ஐ. (கிராம்)	மருந்து (கிராம்)	தண்ணீரில் கலப்பது (லிட்டர்)
தரிசு நிலம்	எகினோக்லோவா கோலோனம், பாரித்தினியம் ஹிஸ்டிரிபோரஸ் பைலாந்தஸ் மாக்சிமஸ் மாக்சிமஸ் ஸ்டாலர் ஹார்னாடஸ் ஸ்டாலர் ஹார்னாடஸ் ஹிஸ்டிரிஸ்ஹார்னாடஸ் ஃபாஸ்ஃபரியமம் ஹிஸ்டிரிஸ்ஹார்னாடஸ் ஃபாஸ்ஃபரியமம் சிலியம் ஹிப்பீஸ்ட்ரம் ஸ்பிரியம் ஃபாஸ்ஃபரியமம் சிலியம் ஹிப்பீஸ்ட்ரம் அல்பா.	-	882-903	1367-1400	500

பயன்படுத்தும் விதம்: தேவையான அளவு தயாரிப்பு மருந்தை எடுத்து சிறிதளவு நீரில் நன்றாகக் கலந்து கொள்ளவும். இக்கரைசலை நாப்சாக் ஸ்பிரேயர் அல்லது பேக்பேக் ஸ்பிரேயரைப் பயன்படுத்தி தெளிக்க வேண்டும்.
வானிலை நிலவரம் (பொதுவாக): மழைக் காலத்தில், காற்று வீசிக் கொண்டிருக்கும் போது அல்லது வெயில் தீவிரம் அதிகமாக இருக்கும் போது தெளிக்கக் கூடாது.
நிலம் மற்றும் நீர்: இந்த பூசணக்கொல்லி மருந்தை இலை தெளிப்பாகப் பயன்படுத்த வேண்டும். இவ்வாறு பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கும் அளவில் கலந்து மருந்தைப் பயன்படுத்தும் போது பாதிப்பு ஏதும் ஏற்படாது. சேயற்கை மீன் வளர்ப்பு இடங்களுக்கு அருகில் பயன்படுத்தக் கூடாது.
மருந்து தெளிப்புக்கான பயிர் வளர்ச்சிக் கட்டம் - விதைத்த பிறகு நடக்கும்: களைவிட்டு வளர்ந்திருக்கும் களைகள் மீது இத்தயாரிப்பைத் தெளிக்க வேண்டும்.
மருந்து தெளிக்கும் முறை: கரைசல் மருந்தை அதிக கொள்ளளவு ஸ்பிரேயர் மற்றும் அல்பீரீ-எச்டீபி பவர் ஸ்பிரேயரில் தட்டை விசிரி னை அல்லது வெள்ளப்பாய்ச்சு னை பொருத்தி பயன்படுத்த வேண்டும். பொருத்தமாக தெளிப்பானை பயன்படுத்தி பயிர் முவதையும் நனைக்க தெளிக்க வேண்டும்.
தெளிக்கும் றையும் காலம்: தேவையான அளவு தயாரிப்பு மருந்தை எடுத்து சிறிதளவு நீரில் நன்றாகக் கலந்து கொள்ளவும். இக்கரைசலை நாப்சாக் ஸ்பிரேயர் அல்லது பேக்பேக் ஸ்பிரேயரைப் பயன்படுத்தி தெளிக்க வேண்டும். களைகள் ளளவிட்ட பிறகு அவைகளில் 3 தல் 5 இலைகள் தோன்றியிருக்கும் கட்டத்தில் மருந்தைத் தெளிக்கும் போது இடப்பெயர்சி நிகழ்ந்து களைகளில் பரவி அவற்றை அழிக்கும்.
பயன்படுத்தும் காலம்: களைகள் ளளவிட்ட பிறகு அவைகளில் 3 தல் 5 இலைகள் தோன்றியிருக்கும் கட்டத்தில் மருந்தைத் தெளிக்கும் போது இடப்பெயர்சி நிகழ்ந்து களைகளில் பரவி அவற்றை அழிக்கும்.
தெளிப்பு வைக்கக்கூடிய அதிக பட்ச தெளிக்கும் தடவைகள்: ஒரு தெளிப்பு மட்டும்.மேலேயுள்ள பரிந்துரைகளைப் பார்க்கவும்.
பயிர்க ளுக்கிடையே தெளிக்கலாம்: மேலேயுள்ள பரிந்துரைகளைப் பார்க்கவும்.
நன்மை பயக்கும் பூச்சிகள் மற்றும் தும்பிச்சிகளை வேட்டையாடும் உயிரினங்கள் மற்றும் தேனீக்களுக்கு தீங்கு ஏற்படாதிருக்க தேவைப்படும் எனெச்சரிக்கைகள்: இத்தயாரிப்பு நீர்வாழ் உயிரினங்கள், நல்ல நீர் மீன் மற்றும் தேனீக்களுக்கு நீங்த தாபிப்பு எதையும் ஏற்படுத்தாது என்றாலும், இந்த மருந்து கலந்திருக்கும் பொருள்களை செயற்கை மீன் வளர்ப்பு இடங்களில் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்க வேண்டும், தேனீக்கள் சுறுசுறுப்பாகப் பறந்து கொண்டிருக்கும் சமயங்களிலும் மருந்தைத் தெளிக்கக் கூடாது.
நச்சுபட்ட அறிகுறிகள்: கருமத்திறன், கண்களில் மற்றும் கவாசக் குழல் மேற்புறத்தில் மேலோட்டமான நமைச்சல் உணர்வு தோன்றலாம், தலைவலி, கிறுகிறுப்பு, குமட்டல், வாந்தி மற்றும் மலக்குழப்பு உணர்வுகளுக்கு தோன்றலாம்.
நலுதகளி: விழுங்கியிருந்தால்: தோயாளி வயறினையுடன் விழிப்புடன் இருந்தால், வாமைக் கொப்பளிக்கக் செய்து 1 அல்லது 2 கிளாஸ் தண்ணீரைக் குடிக்கக் செய்யுங்கள். சுயநினைவு தவறியிருப்பவர்களுக்கு வாய் வழியாக எதையும் கொடுக்கக் கூடாது. மருத்துவரைக் கப்பிட வேண்டும். மருத்துவரின் மேற்பார்வை இல்லாமல் நோயாளியை வாந்தி எடுக்கத் தூண்டக் கூடாது.
வாசிக்கிறந்தால்: தோயாளியை நல்ல காற்றோட்டமான இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்று, உடல் தட்பவெப்பத்தைத் கவனிக்க வேண்டும். ஒருவேளை தோயாளி சுவாசிக்கவில்லை அல்லது சுவாசிக்க சிரமப்படுகிறார் என்றால், வாயுடன் வாய் வழியாக ஊதி செயற்கை சுவாசமளிக்க வேண்டும். மருத்துவ உதவியைப் பெற வேண்டும். **மருத்து சருமத்தில் பட்டிருந்தால்:** தண்ணீரக் குளிக்க வேண்டும். தோப்பு பொட்டு நிறைந்த ஆண்களி ஊற்றி குளிக்க வேண்டும். நடு இடுக்குகள், டி அணைத்தை எும் நன்றாகக் கத்தும் செய்து குளிக்க வேண்டும். வலி, கண்ணத் அல்லது உறுத்தல் உணர்வுகள் தொடர்ந்திருந்தால், மருத்துவரிடம் சிகிச்சைபெற வேண்டும். மாசுபட்ட ஆடைகளை தனியாக நன்றாக கோப்பு பொட்டு துவைத்த பிறகே மறுபடியாகம் செய்ய வேண்டும்.
கண்களில் பட்டிருந்தால்: கண்களை நன்றாக அலம்பிக்கொள்ள வேண்டும். தொடர்ந்து 15 நிமிடங்கள் வரை கண்களில் நீரைத் தண்ணிர் ஊற்றி கழுவிக்கொள்ள வேண்டும். வலி, உறுத்தல், கண்ணுக்கு அல்லது பிரகாசத்தை சகிக்க டியாத நிலையை இருந்தால், கண் மருத்துவரிடம் சிகிச்சைபெற வேண்டும்.
நச்ச முறிவு: குறிப்பிட்ட நச்சு முறிவு எதுவும் கிடையாது. அறிகுறிகளுக்கேற்ப சிகிச்சை அளிக்கவும்.
பாதுகாப்பு அனெச்சரிக்கைகள்: 1. உணவு பண்டங்கள், வெற்று உணவு பாத்திரங்கள் மற்றும் கால் நடைகளுக்கு அப்பாலம் வைக்கவும். 2. வாயிலும், கண்களிலும் மற்றும் சருமத்திலும் படுவதை தவிர்க்கவும். 3. தெளிப்பு காற்றை உட்கவாசிக்கக் கூடாது. காற்று வீகம் திசையிலேயே தெளிக்கவும். 4. தெளிப்பு முடிந்த பின் மாசுபட்ட ஆடைகளையும், உடல் பாகங்களையும் நன்றாக கழுவவும். 5. மருத்துவக்குப்பொது, புகை பிடிக்கவோ, பருகவோ, உண்ணவோ மற்றும் மெல்லவோ கூடாது. 6. கலவை தயாரிக்கும் போதும், தெளிக்கும்போதும் முழு ஆடை ஒன்றை அணிய வேண்டும். 7. மருந்து தெளிக்கப்பட்டிருக்கும் பரப்புகளில் காலந்தடைகளை மேயவிடக் கூடாது.
சேமித்து வைத்தல்: 1. இல்லவாறு சேமித்து வைக்கப்படும் அறையைக் அல்லது கட்டிடங்கள் நன்றாகக் கட்டப்பட்டதாகவும், பிரகாசமாகவும், குளிர்ந்து காற்றோட்டமாகவும் நல்ல நீர் அலகத்துடன், மருந்து காற்று சுத்தமான காற்றுடன் கலக்காத விதத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும். 2. களைக்கொல்லி மருந்து அடங்கியிருக்கும் பேக்கேஜுகளைச் மேடித்து வைக்கும் போதும் / போக்குவரத்தி லும், உணவுப் பொருள்கள் மற்றும் விலங்கு தீவனங்களிலிருந்து விலகி வைக்க வேண்டும், அனைக்கப்படாத தீவிலிருந்து விலகி பாதுகாப்காக சேமித்து வைக்க வேண்டும். 3. களைக்கொல்லி மருந்தை அதன் ஒரிஜினல் கொள்கலனில், உணவுப் பொருள்கள் வைக்கும் இடத்திலிருந்து விலகி ஒரு தனி அறையில் அல்லது கட்டிடத்தில் பாதுகாப்பாக வைக்க வேண்டும். மருந்தின் அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொருத்து சாவி பூட்டு வசதியுள்ள ஒரு தனி அலமாரியில் மருந்தைச் சேமித்து வைக்கவும்.
கொள்கலன்களை அப்புறப்படுத்தல்: 1. பயன்படுத்திக் கொள்கலன் களை மீண்டும் பயன்படுத்துவதைத் தடுக்க அவை வெளியில் விட்டுவைக்கப்பட்ட கூடாது. 2. சுற்றுப்புறத்துறை மற்றும் நிர்வாகத்தைப் பொருத்து அவை ஒரிஜினல் கொள்கலனில், உணவுப் பொருள்கள் வைக்கும் இடத்திலிருந்து விலகி ஒரு தனி அறையில் அல்லது கட்டிடத்தில் பாதுகாப்பாக வைக்க வேண்டும். மருந்தின் அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொருத்து சாவி பூட்டு வசதியுள்ள ஒரு தனி அலமாரியில் மருந்தைச் சேமித்து வைக்கவும்.
தெளிக்கும் முறை: குறிப்பிட்ட நச்சு முறிவு எதுவும் கிடையாது. இக்கரைசலை நாப்சாக் ஸ்பிரேயர் அல்லது பேக்பேக் ஸ்பிரேயரைப் பயன்படுத்தி தெளிக்க வேண்டும். களைகள் ளளவிட்ட பிறகு அவைகளில் 3 தல் 5 இலைகள் தோன்றியிருக்கும் கட்டத்தில் மருந்தைத் தெளிக்கும் போது இடப்பெயர்சி நிகழ்ந்து களைகளில் பரவி அவற்றை அழிக்கும்.
பயன்படுத்தும் காலம்: களைகள் ளளவிட்ட பிறகு அவைகளில் 3 தல் 5 இலைகள் தோன்றியிருக்கும் கட்டத்தில் மருந்தைத் தெளிக்கும் போது இடப்பெயர்சி நிகழ்ந்து களைகளில் பரவி அவற்றை அழிக்கும்.
தெளிப்பு வைக்கக்கூடிய அதிக பட்ச தெளிக்கும் தடவைகள்: ஒரு தெளிப்பு மட்டும்.மேலேயுள்ள பரிந்துரைகளைப் பார்க்கவும்.
பயிர்க ளுக்கிடையே தெளிக்கலாம்: மேலேயுள்ள பரிந்துரைகளைப் பார்க்கவும்.
நன்மை பயக்கும் பூச்சிகள் மற்றும் தும்பிச்சிகளை வேட்டையாடும் உயிரினங்கள் மற்றும் தேனீக்களுக்கு தீங்கு ஏற்படாதிருக்க தேவைப்படும் எனெச்சரிக்கைகள்: இத்தயாரிப்பு நீர்வாழ் உயிரினங்கள், நல்ல நீர் மீன் மற்றும் தேனீக்களுக்கு நீங்த தாபிப்பு எதையும் ஏற்படுத்தாது என்றாலும், இந்த மருந்து கலந்திருக்கும் பொருள்களை செயற்கை மீன் வளர்ப்பு இடங்களில் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்க வேண்டும், தேனீக்கள் சுறுசுறுப்பாகப் பறந்து கொண்டிருக்கும் சமயங்களிலும் மருந்தைத் தெளிக்கக் கூடாது.
நச்சுபட்ட அறிகுறிகள்: கருமத்திறன், கண்களில் மற்றும் கவாசக் குழல் மேற்புறத்தில் மேலோட்டமான நமைச்சல் உணர்வு தோன்றலாம், தலைவலி, கிறுகிறுப்பு, குமட்டல், வாந்தி மற்றும் மலக்குழப்பு உணர்வுகளுக்கு தோன்றலாம்.
நலுதகளி: விழுங்கியிருந்தால்: தோயாளி வயறினையுடன் விழிப்புடன் இருந்தால், வாமைக் கொப்பளிக்கக் செய்து 1 அல்லது 2 கிளாஸ் தண்ணீரைக் குடிக்கக் செய்யுங்கள். சுயநினைவு தவறியிருப்பவர்களுக்கு வாய் வழியாக எதையும் கொடுக்கக் கூடாது. மருத்துவரைக் கப்பிட வேண்டும். மருத்துவரின் மேற்பார்வை இல்லாமல் நோயாளியை வாந்தி எடுக்கத் தூண்டக் கூடாது.
வாசிக்கிறந்தால்: தோயாளியை நல்ல காற்றோட்டமான இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்று, உடல் தட்பவெப்பத்தைத் கவனிக்க வேண்டும். ஒருவேளை தோயாளி சுவாசிக்கவில்லை அல்லது சுவாசிக்க சிரமப்படுகிறார் என்றால், வாயுடன் வாய் வழியாக ஊதி செயற்கை சுவாசமளிக்க வேண்டும். மருத்துவ உதவியைப் பெற வேண்டும். **மருத்து சருமத்தில் பட்டிருந்தால்:** தண்ணீரக் குளிக்க வேண்டும். தோப்பு பொட்டு நிறைந்த ஆண்களி ஊற்றி குளிக்க வேண்டும். நடு இடுக்குகள், டி அணைத்தை எும் நன்றாகக் கத்தும் செய்து குளிக்க வேண்டும். வலி, கண்ணத் அல்லது உறுத்தல் உணர்வுகள் தொடர்ந்திருந்தால், மருத்துவரிடம் சிகிச்சைபெற வேண்டும். மாசுபட்ட ஆடைகளை தனியாக நன்றாக கோப்பு பொட்டு துவைத்த பிறகே மறுபடியாகம் செய்ய வேண்டும்.
கண்களில் பட்டிருந்தால்: கண்களை நன்றாக அலம்பிக்கொள்ள வேண்டும். தொடர்ந்து 15 நிமிடங்கள் வரை கண்களில் நீரைத் தண்ணிர் ஊற்றி கழுவிக்கொள்ள வேண்டும். வலி, உறுத்தல், கண்ணுக்கு அல்லது பிரகாசத்தை சகிக்க டியாத நிலையை இருந்தால், கண் மருத்துவரிடம் சிகிச்சைபெற வேண்டும்.
நச்ச முறிவு: குறிப்பிட்ட நச்சு முறிவு எதுவும் கிடையாது. அறிகுறிகளுக்கேற்ப சிகிச்சை அளிக்கவும்.
பாதுகாப்பு அனெச்சரிக்கைகள்: 1. உணவு பண்டங்கள், வெற்று உணவு பாத்திரங்கள் மற்றும் கால் நடைகளுக்கு அப்பாலம் வைக்கவும். 2. வாயிலும், கண்களிலும் மற்றும் சருமத்திலும் படுவதை தவிர்க்கவும். 3. தெளிப்பு காற்றை உட்கவாசிக்கக் கூடாது. காற்று வீகம் திசையிலேயே தெளிக்கவும். 4. தெளிப்பு முடிந்த பின் மாசுபட்ட ஆடைகளையும், உடல் பாகங்களையும் நன்றாக கழுவவும். 5. மருத்துவக்குப்பொது, புகை பிடிக்கவோ, பருகவோ, உண்ணவோ மற்றும் மெல்லவோ கூடாது. 6. கலவை தயாரிக்கும் போதும், தெளிக்கும்போதும் முழு ஆடை ஒன்றை அணிய வேண்டும். 7. மருந்து தெளிக்கப்பட்டிருக்கும் பரப்புகளில் காலந்தடைகளை மேயவிடக் கூடாது.
சேமித்து வைத்தல்: 1. இல்லவாறு சேமித்து வைக்கப்படும் அறையைக் அல்லது கட்டிடங்கள் நன்றாகக் கட்டப்பட்டதாகவும், பிரகாசமாகவும், குளிர்ந்து காற்றோட்டமாகவும் நல்ல நீர் அலகத்துடன், மருந்து காற்று சுத்தமான காற்றுடன் கலக்காத விதத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும். 2. களைக்கொல்லி மருந்து அடங்கியிருக்கும் பேக்கேஜுகளைச் மேடித்து வைக்கும் போதும் / போக்குவரத்தி லும், உணவுப் பொருள்கள் மற்றும் விலங்கு தீவனங்களிலிருந்து விலகி வைக்க வேண்டும், அனைக்கப்படாத தீவிலிருந்து விலகி பாதுகாப்காக சேமித்து வைக்க வேண்டும். 3. களைக்கொல்லி மருந்தை அதன் ஒரிஜினல் கொள்கலனில், உணவுப் பொருள்கள் வைக்கும் இடத்திலிருந்து விலகி ஒரு தனி அறையில் அல்லது கட்டிடத்தில் பாதுகாப்காக வைக்க வேண்டும். மருந்தின் அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொருத்து சாவி பூட்டு வசதியுள்ள ஒரு தனி அலமாரியில் மருந்தைச் சேமித்து வைக்கவும்.
கொள்கலன்களை அப்புறப்படுத்தல்: 1. பயன்படுத்திக் கொள்கலன் களை மீண்டும் பயன்படுத்துவதைத் தடுக்க அவை வெளியில் விட்டுவைக்கப்பட்ட கூடாது. 2. சுற்றுப்புறத்துறை மற்றும் நிர்வாகத்தைப் பொருத்து அவை ஒரிஜினல் கொள்கலனில், உணவுப் பொருள்கள் வைக்கும் இடத்திலிருந்து விலகி ஒரு தனி அறையில் அல்லது கட்டிடத்தில் பாதுகாப்காக வைக்க வேண்டும். மருந்தின் அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொருத்து சாவி பூட்டு வசதியுள்ள ஒரு தனி அலமாரியில் மருந்தைச் சேமித்து வைக்கவும்.

ہسکی
پائرتھیوبک سوڈیم 4.5% w/w + گلائفوسیٹ 60% w/w ایس جی
خودرو نباتات کش دوا
صرف زرعی استعمال کے لیۓ مادہ

فارمولیشن کی قسم: 1
نشانہ بنائے گئے حشرات کو قابو کرنے کے لیۓ استعمال: اکائنو کلوا کولونم، سائنو سائنو ڈون ڈیکیلون، سائپرس روٹونڈس، ترانتھیما پورٹولاکیسٹرم، پارتھینیم بائینسٹروفورس، فائیلنتھیس نروری، کلیوس وسکوسا، اکیٹیا البا.
فصل کا نام: غیر فصلی علاقہ
کیمیائی اجزاء:
پائرتھیوبک سوڈیم اے آئی 4.50% w/w
گلائی فوسیٹ اے آئی 60.00% w/w
الکائل پولی گلائیکوسائیلز اور الکائل ڈائی امائن الکوکزائلیٹس 2.00% w/w
کوکوبیٹائن کوکوامیڈوپروپائل بیٹائن، ٹیلوامائن-15-ایتھوآکزیلیٹ: 3.00% w/w
امونیم کاربونیٹ: 2.50% w/w
امونیم سلفیٹ: 26.00% w/w
معدنیات سے پاک پانی: 2.00% w/w
کل: 100.00 w/w
سٹرکٹر:

فصل	گھاس پات کا عام نام مدافعتی مینجمنٹ	آخری استعمال اور کٹائی کے انتظار	اے آئی (گرام)	فارمولیشن (گرام)	پانی (لیٹر/ہیکٹیئر)
غیر فصلی علاقہ	اکائنو کلوا کولونم، سائنو سائنو ڈون ڈیکیلون، سائپرس روٹونڈس، ترانتھیما پورٹولاکیسٹرم، پارتھینیم بائینسٹروفورس، فائیلنتھیس نروری، کلیوس وسکوسا، اکیٹیا البا.	-	882-903	1367-1400	500

استعمال کی ہدایات: دوا کی مطلوبہ مقدار لیں اور اسے پانی کی مطلوبہ مقدار کے ساتھ اچھی طرح ملائیں۔ نیپ سیک یا بیک پیک اسپریئر کے ذریعہ دوا کو چھڑکاؤ کریں۔
موسمی حالت (یا ٹعمو): بارش نیز یا اور تیز گرمی کے دوران استعمال نہ کریں۔
مٹی اور پانی (محیل قابل عمل ہو): یہ گھاس پھوس کش پتوں پر جیڑ کو کیلئے ہے اور سفارش کی گئی خوراک کے استعمال سے یہ کوئی گزند نہیں پہنچا تی ہے۔
آبی زراعت کے نزدیک استعمال نہ کریں۔
چھڑکاؤ کے لیۓ فصل کا مرحلہ- بیج بونے کے بعد یا کے دن: اس خودرو نباتات کش دوا کا حشرات کے ظاہر ہونے کے بعد چھڑکاؤ کریں۔
چھڑکاؤ کی تکنیک: زائدہ حجم والے اسپریئر اور چیڑ پنکھے یا فلڈ جیٹ ٹونٹی سے لیس ASPEE-HTP پاور اسپریئر کا استعمال کرتے ہوئے نباتات کے پتوں پر دوا کا چھڑکاؤ کریں۔
سامان کی قسم: زائدہ حجم والے اسپریئر جیسے کہ مناسب ٹونٹی (چیڑ پنکھے /فلڈ جیٹ) والا نیپ سیک اسپریئر۔
ٹونٹی کی قسم: چیڑ پنکھے/فلڈ جیٹ ٹونٹی۔
مقدار: 882-903 گرام اے آئی/ہیکٹر (1.367-1.400 کلوگرام/ہیکٹر/فارمولیشن)
ملائے گئے مادیات: نباتات کش دوا کی ایک خاص مقدار لیجئے اور اسے پانی کے کم مقدار سے ملائیے۔ اور پھر پانی کی باقی ماندہ مقدار ملایئجے خوب بلا کر تلک سپرے یکسان طور پر ممکن بوسکے۔
دوبارہ داخلہ کا وقفہ: جوبیس گھنٹے کے بعد۔
فصل کٹائی سے پہلے کا وقفہ: (پی ایچ آئی): لاگو نہیں۔
چھڑکاؤ کا طریقہ اور وقفہ: دوا کی مطلوبہ مقدار لیں اور اسے پانی کی مطلوبہ مقدار کے ساتھ اچھی طرح ملائیں۔ نیپ سیک یا بیک پیک اسپریئر کے ذریعہ دوا کو چھڑکاؤ کریں۔ خودرو نباتات کش دوا کا حشرات کے ظاہر ہونے کے بعد غیر ضروری گھاس پھوس پر چھڑکاؤ کریں۔ دوا کے چھڑکاؤ کا تجویز کردہ وقفہ وہ ہے جب نباتات کے کم از کم 2 سے 5 پتوں تاکہ دوا پودے میں منتقل ہو سکے۔
دوا کے چھڑکاؤ کے اوقات: خودرو نباتات کش دوا کا حشرات کے ظاہر ہونے کے بعد غیر ضروری گھاس پھوس پر چھڑکاؤ کریں۔ تجویز کردہ وقفہ وہ ہے جب نباتات کے کم از کم 2 سے 5 پتوں تاکہ دوا پودے میں منتقل ہو سکے۔
تعدد بشمول سپرے کی تعداد: صرف ایک استعمال اور اس کے سفارش کے مطابق۔
مرحد جب نباتات کش دوا کسی فصل پر نہیں چھڑکا جائے: اوپر کی سفارش پر دھیان دیجئے۔
احتیاط جسے کم لیں تاکہ مفید کیڑے مکوڑے جیسے شہد کی مکھیوں اور مفتر کیڑوں کے دشمن کیڑے محفوظ رہ سکیں۔
یہ دوا آبی جانداروں، تازہ پانی کی مچھلیوں اور شہد کی مکھیوں کے لیۓ کم زہریلی ہے لیکن طویل مدتی اثرات رکھتی ہے، لہذا اس دوا کو آبی جانداروں کی افزائش کے تالابوں کے قریب استعمال کرنے سے گریز کریں اور اس وقت چھڑکاؤ نہ کریں جب مکھیاں زیادہ تعداد میں ہوں۔
زہر خوراکی کی علامات: یہ دوا بنیادی طور پر جلد، آنکھوں اور سانس کی نالی کو متاثر کرتی ہے۔ سر درد، چکر آنا، متلی، قے اور الجھن جیسی علامات واقع ہو سکتی ہیں۔
ابتدائی طبی تدابیر: اگر پیسٹ میں چلا جائے: اگر مریض ہوش میں اور الرٹ ہے تو منہ کے اندر دوئی لینے کو پانی سے دھویں اور پینے کے لیۓ 2 یا 3 گلاس پانی دیں۔ کسی بے ہوش شخص کو منہ کے ذریعے کوئی چیز نہ دیں۔ اکائکو کیلا ہی۔ جب تک مریض کا ہاتھ نہ کانپے یا الٹا نہ آئے مریض کو زبردستی نہ کریں۔ اگر سانس کے ذریعے جلد میں داخل ہوا ہو: مریض کا ہوش ہوا ہو تو باہر لے جائیں اور اس کے جسم کے دوحرارت کو قابل رکھیں۔ اگر مریض سانس نہیں لے رہا ہے یا سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی ہو تو آرٹی فیشل سانس کے ذریعے سانس دیں، بہتر ہے کہ منہ سے منہ کا کرسانس یں۔ کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
جلد آلودہ ہونے کی صورت میں: جسم کے متاثرہ حصوں کو ہلکے صابن والے پانی اور نرم کپڑے سے دھوئیں۔ اگر درد، سرخی یا سوزش باقی رہتی ہے تو کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ تمام آلودہ کپڑوں کو دھونے کے استعمال سے قبل دھو لیں۔ آنکھوں کے ارد گرد پانی سے اچھی طرح دھو لیجئے۔ آنکھوں کے ارد گرد پانی سے آنکھ کی صورت میں: کم از کم 15 منٹوں تک وہیر سارے پانی سے آنکھیں دھوئیں۔ اگر درد، سوزش، سرخی یا فوٹو فوبیا باقی رہتا ہے تو کسی ماہر چشم سے رجوع کریں۔
نگلنے: کوئی خاص تریاق موجود نہیں۔ صرف علامات اور معاون تھراپی سے کام لیں لحاظ احتیاطی بیان۔
حفاظتی احتیاطی تدابیر: 1- عمل کرتے وقت پتلونیں اور وزائت کو پہنے رہیں۔ اور ہاتھ اور چہرے کے سمس نہ ہونے دیں۔ 2- ہتھے ہاتھوں سے مسلسل نہ کریں۔ 3- ہر استعمال کے بعد صابن اور پانی سے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں۔ 4- کھانے کے دوران یا سونے کے لیۓ دوا کے استعمال سے قبل ہاتھ اور چہرے کو اچھی طرح دھوئیں اس کے بعد ان آلات سے دیگر کیڑے مار ادویات کا چھڑکاؤ کریں۔ 5- کسی بھی اضافی لباس برائے چھڑکاؤ کو کھلی کی جگہوں کی جگہوں کے پیچھے یا پانی میں دبا دیں کیونکہ اس سے پانی کے ٹینک کے آلودہ ہونے کا خدشہ ہے۔
5- استعمال کیے گئے مناسب لباس، چشمے، دستانے، جوتے، جوتے کے شیلڈ یا ٹیپ کے ساتھ ماسک اور آل پرپائز ماسک یا ہیلمٹ استعمال کریں۔ 6- لاگو کے بعد ہاتھ اور پاؤں استعمال نہ کیجئے کھائیں، پیئیں یا تمباکو کو ختی کریں۔ 7- تعامل شدہ علاقے میں کسی جانور کو چرنے کی اجازت نہیں دیں۔
ذخیرہ اندوزی کرنے کی ہدایات: 1- دوا کو اسٹور کرنے والے کمرے مضبوط ہونے، اچھے روشنی دار ہوا دار اور کھلے دروازے کے ساتھ ہونے چاہئے۔ 2- اس دوا کے پیکجوں کو اسی طرح اسٹور کریں کہ ان کی مہر دوسری چیزوں جیسے خوراک اور جانوروں کے چارے سے نہ ہو اور دوا کو آگ، گرمی سے دور اسٹور کریں۔
3- گھاس پھوس یا دوا کے پیکیجوں کو دوسری اشیاء خاص طور پر کھانے کی چیزیں رکھنے والے کمرے سے دور، اعلیٰ کنٹینروں کے اندر ہی رکھنا چاہئے۔ دوا کی جسم اور مقدار کے حساب سے الگ الگ الماری میں مالا الگ کر رکھیں۔
استعمال شدہ کنٹینر کو محفوظ طریقہ سے ناسمانہ اور اضافی میٹیریل کو دھونا:
1- خالی کے کنٹینروں کو کوڑا کرکٹ کے ڈبے میں ڈال دیں۔ 2- خالی کنٹینروں اور ٹکنوں کو باہر ہی مٹی میں دبا دیں تاکہ دوبارہ استعمال نہ ہوں۔ 3- ٹکنوں، فلاٹرز کو مٹی دوبارہ دھونے کے پانی کو اس طرح ختم کرنے سے ضائع کریں کہ پانی، مٹی یا حیوانات کو آلودگی نہ ہو۔
احتیاطی بیان: یہ دوا آبی جانداروں، تازہ پانی کی مچھلیوں اور شہد کی مکھیوں کے لیۓ کم زہریلی ہے لیکن طویل مدتی اثرات رکھتی ہے، لہذا اس دوا کو آبی جانداروں کی افزائش کے تالابوں کے قریب استعمال کرنے سے گریز کریں اور اس وقت چھڑکاؤ نہ کریں جب مکھیاں زیادہ تعداد میں ہوں۔ آبی جانداروں کے لیۓ یہ دوا زہریلی ہے اور پانی کے ذخیروں میں ملانے سے گریز کریں۔ دوا کے خالی ڈبے کو استعمال خطرناک ہے۔ استعمال کے بعد دوا کے خالی ڈبے کو دبایا کر پانی کے بہتے ہوئے کے ذریعے کسی مناسب جگہ پر ٹھکانے کے مطابق ٹلف کر دیں۔ اس لیۓ/ ہدایات کے مطابق کسی اور بھی پر دوسرے فصلوں کے علاوہ دیگر فصلوں پر دوا کا چھڑکاؤ نہ کریں۔

ہسکی
پائرتھیوبک سوڈیم 4.5% w/w + گلائفوسیٹ 60% w/w ایس جی
خودرو نباتات کش دوا
صرف زرعی استعمال کے لیۓ مادہ

فارمولیشن کی قسم: 1
نشانہ بنائے گئے حشرات کو قابو کرنے کے لیۓ استعمال: اکائنو کلوا کولونم، سائنو سائنو ڈون ڈیکیلون، سائپرس روٹونڈس، ترانتھیما پورٹولاکیسٹرم، پارتھینیم بائینسٹروفورس، فائیلنتھیس نروری، کلیوس وسکوسا، اکیٹیا البا.
فصل کا نام: غیر فصلی علاقہ
کیمیائی اجزاء:
پائرتھیوبک سوڈیم اے آئی 4.50% w/w
گلائی فوسیٹ اے آئی 60.00% w/w
الکائل پولی گلائیکوسائیلز اور الکائل ڈائی امائن الکوکزائلیٹس 2.00% w/w
کوکوبیٹائن کوکوامیڈوپروپائل بیٹائن، ٹیلوامائن-15-ایتھوآکزیلیٹ: 3.00% w/w
امونیم کاربونیٹ: 2.50% w/w
امونیم سلفیٹ: 26.00% w/w
معدنیات سے پاک پانی: 2.00% w/w
کل: 100.00 w/w
سٹرکٹر:

فصل	گھاس پات کا عام نام مدافعتی مینجمنٹ	آخری استعمال اور کٹائی کے انتظار	اے آئی (گرام)	فارمولیشن (گرام)	پانی (لیٹر/ہیکٹیئر)
غیر فصلی علاقہ	اکائنو کلوا کولونم، سائنو سائنو ڈون ڈیکیلون، سائپرس روٹونڈس، ترانتھیما پورٹولاکیسٹرم، پارتھینیم بائینسٹروفورس، فائیلنتھیس نروری، کلیوس وسکوسا، اکیٹیا البا.	-	882-903	1367-1400	500

استعمال کی ہدایات: دوا کی مطلوبہ مقدار لیں اور اسے پانی کی مطلوبہ مقدار کے ساتھ اچھی طرح ملائیں۔ نیپ سیک یا بیک پیک اسپریئر کے ذریعہ دوا کو چھڑکاؤ کریں۔
موسمی حالت (یا ٹعمو): بارش نیز یا اور تیز گرمی کے دوران استعمال نہ کریں۔
مٹی اور پانی (محیل قابل عمل ہو): یہ گھاس پھوس کش پتوں پر جیڑ کو کیلئے ہے اور سفارش کی گئی خوراک کے استعمال سے یہ کوئی گزند نہیں پہنچا تی ہے۔
آبی زراعت کے نزدیک استعمال نہ کریں۔
چھڑکاؤ کے لیۓ فصل کا مرحلہ- بیج بونے کے بعد یا کے دن: اس خودرو نبا