

IMPOOL®

QUIZALOFOP ETHYL 5% EC

Herbicide

For Agriculture Use Only

Quizalofop-ethyl 5% EC, based on Ethyl 2-(4-6-Chloroxynoxalin-2-yl oxy) phenoxy propionate, is a selective post-emergence herbicide for the effective control of grassy weeds in soybean, black gram, onion, cotton and groundnut crops.

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage / HA		Dilution in (Litres)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
		Al gram	Formula- ml		
Black gram	Goose grass (Eleusine indica) Wild finger (Dactyloctenium aegyptium), Crab grass (Digitaria sanguinalis scop), Love grass (Eragrostis sp.), Water crown grass (Paspallidium sp.), Viper grass (Dinebra retroflexa), Echinochloa spp.	37.5-50.0	750-1000	500	52
Cotton	Barnyard grass (Echinochloa crusgalli), Samwa/Samel (Echinochloa coloumum), Viper grass (Dinebra retroflexa), Crab grass (Digitaria mariginata)	50.0	1000	500	94
Onion	Crab grass (Digitaria sp.), Goose grass (Eleusine indica), Wild finger (Dactyloctenium aegyptium), Love grass (Eragrostis sp.)	37.5-50.0	750-1000	375-450	7
Ground nut	Samwa/Samel (Echinochloa coloumum), Viper grass (Dinebra retroflexa), Crow foot grass (Dactyloctenium spp.)	37.5-50.0	750-1000	500	89
Soybean	Barnyard grass (Echinochloa crusgalli), Samwa/Samel(Echinochloa coloumum), Love grass (Eragrostis sp.)	37.5-50.0	750-1000	500-600	95

Direction Of Use: PREPARATION OF SPRAY EMULSION - Add slowly the required quantity of herbicide to water and stir well with a rod or stick till it is properly emulsified. SPRAYING INSTRUCTION: 1. Shake the bottle before use. 2. Spray uniformly. 3. Do not spray against wind direction. 4. Wash the sprayer thoroughly with water before and after use. METHOD ANDTIME OF APPLICATION - Spray with the help of knapsack sprayer fitted with flat fan nozzle on Soybean at 20-24 days after sowing, on Cotton at 15-27 days after sowing, on Groundnut at 19-25 days after sowing, on Black gram at 14-22 days after sowing and on Onion at 13-27 days after transplanting. PLANT PROTECTION EQUIPMENT - Knapsack sprayer fitted with flat fan nozzle is recommended to apply the herbicide.

Re-entry Period: 24hrs

Application Equipment - Knapsack sprayer fitted with a flat fan nozzle - to use for applying the herbicide.

Time of Application - Spray 20-25 days after sowing with the help of knapsack sprayer using flat fan nozzle.

Precaution : 1. While handling, mixing or spraying this product, wear proper protective clothing, goggles, rubber gloves, boots, long-sleeved shirts, long pants, mask and a hat. 2. Avoid inhalation of vapours or mist, and skin or oral contact with the herbicide. Do not get in eyes. 3. Spray only in the direction of wind and not against it, so as to avoid spray drifts setting on the body. 4. Wash thoroughly with soap and water immediately after handling. 5. Do not eat, drink or smoke during spraying. 6. Clear sprayer, buckets and other utensils thoroughly with water and detergent after use.

Symptoms of Poisoning : No specific symptoms of poisoning. Lethargy, headache, nausea, giddness, vomiting and anxiety may occur.

First Aid : If swallowed, do not induce vomiting. Give large quantity of water. Never give anything by mouth to an unconscious person. If skin is contaminated, wash with plenty of soap and water. In case of eye contamination, immediately flush with a steady gentle stream of water for at least 15 minutes. If inhaled, remove the patient to fresh air. If not breathing, give artificial respiration, preferably by mouth.

Antidote : No specific antidote. Gastric lavage at early stages is recommended. Treat symptomatically.

Disposal of Used container : 1. It shall be the duty of manufactures, formulators of herbicides and operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall be left outside to prevent their reuse. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions : The package containing herbicides shall be stored in separate rooms or premises, away from the rooms or premises used for storing articles or shall keep in separate airtms under lock and key depending upon the quantity and nature of the herbicides. The rooms or premises meant for storing herbicides shall be well build dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension. 3. Store away from sparks, fire and open flame.

Warning: 1. Not to be used on crops and pests other than those mentioned on label and leaflets. 2. Not to be used for post-harvest application. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet.

Chemical Composition :		
Quizalofop-ethyl a.i.		05.00% w/w
Sorbol	Blend of polyoxyethylene alkyl phenyl ether and alkyl benzene sulphhonate)	32.00% w/w
Solvent	Solvesso (C8-C9 aromatic hydrocarbon solvent)	Q.S. %
Total : 100.000%w/w		

Caution : Not to be used on crops other than specified on this Label / Leaflet.

Dangerous to reuse empty containers

इमपूल

क्वीजालोफोप –ईथाइल 5% भा/भा ई.सी.

खरपतवारनाशक

क्वीजालोफोप –ईथाइल 5 प्रतिशत ई.सी. (क्लोरोक्विलऑक्सेलिन-2-यालकरी) फिनोक्सी प्रोपियोेट पर आधारित एक वन्यनाक, निमिनोतर खरपतवारनाशक है जो कि सोयाबीन, उदर, प्याज, कपास व मूंगफली की फसल में बास करके खरपतवारों के निवर्ण के लिए प्रभावकारी है ।

उपयोग :

फसल	खरपतवार के नाम	प्रति हैक्टेयर भाजा		पाानी की मात्रा (लीटर)	अतिर छिड़काव तथा फसल काने के बीच अन्तराल (दिने में)
		स.तत्व (ग्राम)	संघनता (मिली)		
उदर	गुह घास (इरुग्लिन इंडिका) वाइल्ड फिंगर, डेब्र घास/मकड़ा घास, वाटर क्राउन घास, नीला, गवईर घास	37.5-50.0	750-1000	500	52
कपास	बाई घास (एफिनेकोलोा क्रुसगाली), सांवा (एफिनेकोलोा कोलेनम) वाईर घास (डावनेबरा रेटुर्नक्लेन्सा), डेब्र घास/मकड़ा घास (डिजिटरीसा मार्गिनाटा	50.0	1000	500	94
गुह घास (इरुग्लिन इंडिका), वाइल्ड फिंगर, डेब्र घास/मकड़ा घास, लव घास, डिनेटेरिया सी	37.5-50.0	750-1000	375-450	7	
मूंगफली	सांवा (एफिनेकोलोा कोलेनम), वाईर घास (डावनेबरा रेटुर्नक्लेन्सा), क्रोफुट घास/मकड़ा (डेनेटोलोनम स्प.)	37.5-50.0	750-1000	500	89
सोयाबीन	बाईरघास (एफिनेकोलोा क्रुसगाली), सांवा/समेल (एफिनेकोलोा कोलेनम), लव घास (इराग्रोस्टिस सी.)	37.5-50.0	750-1000	500-600	85

उपयोग के लिए तैयार-निर्देश : छिड़काव मिश्रण को तैयार करना : खरपतवारनाशक की वांछित मात्रा को पानी में घोलें और तब तक उसे डेढ़ गैलन तक मिलाएं जिससे अच्छा घोलन बन सके जो जलो। छिड़काव के निर्देश : १. इस्तेमाल से पहले बोरेज को अच्छी तरह हिलायें। 2. छिड़काव सामान स्प्रे करके ३. हवा के स्थल व बहक से साथ छिड़काव करें। ४. इसे समय को छिड़काव से पहले व बाद में पानी से अच्छी तरह धोकर साफ करें। छिड़काव की विधि एवं समय : खरपतवारनाशक का छिड़काव नैसर्गिक रूपसे, जिसमें फलेट फैन या फनल जैत नोजल लगा हो के द्वारा सोयाबीन में बुवाई के २० से २२ दिनों के बाद, कपास में बुवाई के १५ से २७ दिनों के बाद, मूंगफली में बुवाई के १९ से २५ दिनों के बाद, उदर में बुवाई के १५ से २२ दिनों के बाद एवं प्याज में १३ से २७ दिनों के बाद प्रत्येक की छिड़काव करें; खरपतवारनाशक के छिड़काव के लिए फलेट फैन या फनल जैत नोजल लाी स्प्रेयर की सहायता की जानी है।

पुनःप्रवेश २४ घंटे।

छिड़काव के उपकरण : खरपतवारनाशक का छिड़काव करने के लिए नैसर्गिक स्प्रेयर, जिसमें फलेट फैन नोजल लगा हो, का उपयोग कीजिये।

प्रयोग का समय : खरपतवारनाशक का छिड़काव बुवाई के 20-25 दिन के बाद नैसर्गिक स्प्रेयर, जिसमें फलेट फैन नोजल लगा हो, के द्वारा करें।

सावधानताओं के लिए सावधानियां :
खरपतवारनाशक को घुसे, मिलाते तथा छिड़काव करते समय रसायन कण्डे जैसे कि घना, रडक के दरताने, लकड़ी आखती की कमीज, नकाब और गुन घुट, रेत तथा हई आदि पदम को हटाकर साफ करें। 2. खरपतवारनाश की कमी व नुहाह को सांभ लएं अन्तर जाने से बचें। इसे भुलें और लक के समकई से बचें। इसे आंखों के अन्तर जाने से बचाव। 3. इस्तेमाल की दिनां में छिड़काव करें। इस्तेमाल करीब, नीला मिश्रण की पुनरुत्पे हरित पर न करें। 4. प्रयोग के बाद दूधित हरित को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। 5. छिड़काव के समय प्याज, और काना - पीन न करें। 6. छिड़काव के बाद, स्प्रेयर के उपकरणों को अच्छी तरह साबुन और पानी से साफ कर लें।

विन के लक्षण : विषाक्त के लिए कोई विशेष लक्षण नहीं दिखाई देते। सूखी, फिर दब, मतली, उल्टी, वक्कर तथा निम्न हो सकती है।

प्राथमिक निवारण : यदि निम्न जगहों को उल्टी न करायें। अधिक मात्रा में पीने को पानी दें। नरो की हालत में ह्रुद धड़क कुछ न दें। लक दूधित हो जाएं तो दुरन्त साबुन और पानी से धोएं। यदि आंखें दूधित हो जाएं तो उनको तुरन्त कम से कम 15 मिनट पानी से अच्छी तरह साफ करें। सूँघ लेने पर, लेगी को दूध हटा दें। पानी पीने सीन न ले लें जो उसे दूध द्वारा कृत्रिम धवन करे।

वि नाराज : कोई विशेष निवारण नहीं है। प्राथमिक अवस्था में गरिष्ठत लेवेंज की सिफारिश की जाती है। (सामान्यतया इस्तेमाल करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. खाली डिब्बों को लोह का आबदी से दूर गाड़ दें। 2. खाली डिब्बों का पुनः प्रयोग करने के लिये उन्हें बाहर फेंक छोड़ें। 3. डिब्बों में कहीं कोई खरपतवार नाशक और चंको की बुवाई का पानी सूखित तकले से कले लाना आवश्यक एवं पानी प्रदूषित ना हो।

संरक्षण की शर्तें : 1. कसते में या अस्मरिये में लता बंद करके वन्य कपास और खाद सामग्री से दूर सूखित तथा बाहिर दें। 2. खरपतवार नाशक के संरक्षण हूँ उपयोग किये जाने वाले कसरे सुनिश्चित, सूखे, चपकें चपकाने जैसे जेतें बाहिर तथा उनमें चपकें अन्तर होना बाहिर लातिे कसते में लाना जग से बचें।

प्रेतावली : १. लिफलेट और लेबल से सिफारिश किए हुये फसलों और किट के सिवा अन्यत्र पर इस्तेमाल न करें। २. फसल फटाई के बाद किये जाने वाले पन्त उपाचार से शांमिल न करें। ३. इस्तेमाल के बाद डब्बों को लिफलेट से ढिपे हुये तुरंतिक से नष्ट करें।

रासायनिक संघनता :

क्वीजालोफोप –ईथाइल सक्रिय तत्व		05.00% भा/भा
इमलीकॉपर	सोरबोल (सोलाइकरी इथाइलिन इमलीकॉपर	32.00% भा/भा
सोरबोल	सोरबोल (सोलाइकरी इथाइलिन इमलीकॉपर बैनजील सल्फोनेटस का मिश्रण)	
सोल्वेंट	सॉल्वेसो (सी-8/-७/ सी-9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन)	घनत्व मात्रा ३०.००%
योग :100.000% भा/भा		

बेतावली : इस लेबल / पत्रिका पर निर्दिष्ट किये गये फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें।

खाली डिब्बों का दुबारा प्रयोग करना खतरनाक है।

इमपूल

क्वीजालोफॉप इथाईल ५% ई सी

तणनाशक

क्वीजालोफॉप इथाईल ५ ई सी. ईथाइल २ (४-६-क्लोरोक्विनॉक्सेलिन-२-वाल्डोक्सी) फिनोक्सी प्रोपियोनेट निषडक तणनाशक आहे. ते सोयाबीन, उडिद, कांद, कापूस, भुईमुगाच्या विकसनधे येणाऱ्या तणांना अत्युच्च नियंत्रण करते.

पीक	नियंत्रण करणाऱ्या तणांचे नाव	मात्रा प्रति हेक्टर सक्रिय घटक (ग्राम)	उपचाराचे फटक (मि.ली.)	घागाचे प्रमाण (लिटर)	अंतिम फसलकी जाति कापणी वॉलिव अंतर (दिनस)
उडिद	गुह घास (इरुग्लिन इंडिका) घास नखी घास/मकरा घास बाईरघास घास (एफिनेकोलोा क्रसगाली), सांवा (एफिनेकोलोा कोलेनम) वाईर घास (डावनेबरा रेटुर्नक्लेन्सा) घास नखी मकड़ा/डिनेटेरिया मार्गिनाटा	3७.५-५०.०	७५०-1०००	५००	५२
कापूस	बाईरघास (एफिनेकोलोा क्रसगाली), सांवा (एफिनेकोलोा कोलेनम) वाईर घास (डावनेबरा रेटुर्नक्लेन्सा) घास नखी मकड़ा/डिनेटेरिया मार्गिनाटा	५०.०	१०००	५००	९४
कांद	जंदाजी नाचणी (इरुग्लिन इंडिका) घास नखी घास/मकरा घास लव घास, डिनेटेरिया सी., सांवा (एफिनेकोलोा कोलेनम), वाईर घास (डावनेबरा रेटुर्नक्लेन्सा) क्रो फूट घास/मकरा (डिनेटोलोनम स्प.)	3७.५-५०.०	७५०-1०००	3७५-५००	७
भुईमुगा	बाईरघास (एफिनेकोलोा क्रसगाली), सांवा/समेल (एफिनेकोलोा कोलेनम), लव घास (इराग्रोस्टीस सी.)	3७.५-५०.०	७५०-1०००	५००	८९
सोयाबीन	बाईरघास (एफिनेकोलोा क्रसगाली), सांवा/समेल (एफिनेकोलोा कोलेनम), लव घास (इराग्रोस्टीस सी.)	3७.५-५०.०	७५०-1०००	५००	८५

वापरसाठी निर्देश: **फवारणी इमपूरनली तयारी**: पाण्यात व्हड्लुख आवश्यक प्रमाणात तणनाशक टाका आणि सखई किंवा काडीने नीट डबवून घ्या. **फवारणीच्या सुचना**: १) वापरण्यापूर्वी पाटली हलवा. २) एकसमान फवारणी करा. ३) वायव्याच्या दिशेने फवारणी करा. ४) उभेसार उभेसार वापरण्यापूर्वी आणि नंतर पाण्याने धोले घ्या. **फवारणीची पद्धत आणि वेळ**: पेराग्रीनंतर २०-२२ दिवसांनंतर सोय्याकडून फलेट फॅन नोजल बसवलेल्या नॅसर्गिक स्प्रेमच्या सहाय्याने, पेराग्री नंतर १५-२५ दिवसांनी कपासकडून, पेराग्रीनंतर १५-२५ दिवसांनी भुईमुगावर फवारणी करावी, पेराग्रीनंतर १४-२२ दिवसांनी उडिद आणि १३-२७ दिवसांनी मूंगफलीवर लागणी नंतर फवारणी करावी. **रोज सुद्धा उपकरणे**: तणनाशकाची फवारणी पॅराट फॅन नोजलसह नॅसर्गिक स्प्रेअरची सहाय्य करेली जाते.

पुनः प्रवेश: २४ घंटे

फवारणीची पद्धत आणि वेळ : पेराग्रीनंतर २०-२५ दिवसांनी, फलट फॅन नॉझल असलेल्या नॅसर्गिक स्प्रेअरने फवार.

सावधानी : १. हे औषध हाताळताना, मिसलताना किंवा फवारताना योग्य सुरक्षित करणे, गंधित, खरी हातोटे, डूट, लांब बांधांचे टाई, लांब गिझर, मुकडटा आणि हॅट वापरा. २. तणनाशकाची वाफ नाका तोंडात जाऊ देऊ नका. तणनाशक कातडीला लागू देऊ नका, ते डाळ्यांना जाऊ देऊ नका. ३. वारा ज्या दिशेने वाहत असेल त्या दिशेने फवारणी करा. विषडूड दिशेने नको. त्यामुळे शरीरवार धितोडे येणार नाहीत. ४. फवारणी झाल्यावरही लगेच साबानाे हात-पाय स्वच्छ घुसा. ५. औषध फवारत असताना, काहीही खाऊ-पिऊ नका किंवा किंगे, रिफ्रेज ओईऊ नका. ६. वापरनंतर पंप, बाटल्या आणि झट मांडी पाण्याने आणि जूनांघासक औषधीने स्वच्छ घुसा.

निवारणार्थ उपकरणे : विषाधधेची निश्चित अशी लक्षणे नसतील. सूखी येणे, डोळे दुखाणे, मळमळणे, ओंखणे येणे आणि काळजी वाटत राहणे या गोष्टी होऊ शकतात.

प्रथमोपचार : घटयानां तसे अस्वस्थ ओंखारी काढू नका. भरपूर पाणी प्यायला घा. बेमुडूड माणसाना तोंडाकडून काहीही देऊ नका. जर कातडीला औषध लागले असेल तर बेमुडूड साबानाे आणि पाण्याने घुलून काढा. डोळ्यांना औषध गेले असेलस्य विमान १५ मिनिटे धुविलेले घुसा. जर बांस बंदबंद औषध गेले असेल तर त्या इमपूरना मोकळ्या हवेत घेऊन जा. जर बासोच्छासय तसे असेल तर शक्यतो तोंडाने कृत्रिम बासोच्छासय करा.

विष प्रतिकारक/उपाचार : निश्चित असा उपचार नाही. प्राथमिक अवस्थेमध्ये गॅस्ट्रिक लॅवेंजची शिफारस केली जाते. असेल. लवंगानुसार उपचार करा.

कीटनाशका वापरनंतरात रिक्तेये असे, ईतर सामग्री आणि उरलेले औषध वगैरे काणे : १. वापरानंतर फवारणी पाणी दूधित होऊ नये अशाप्रती मोठेकडे उबे किंवा उरलेले कीटनाशका नष्ट करणे ही उपायचार, तयार करणारे आणि वापरलाे यांचे क्म आहे. २. वापरलेले डबे दुसऱ्या प्रकारे वापर नसत नसून ते मोकळ्या जागी सूखू नयेत. ३. डबे तोंडून लोकरसती पापसू दुसऱ्या प्रकारे वापरावे.

विष प्रतिकारक/उपाचार : निश्चित असा उपचार नाही. प्राथमिक अवस्थेमध्ये गॅस्ट्रिक लॅवेंजची शिफारस केली जाते. असेल. लवंगानुसार उपचार करा.

कीटनाशका वापरनंतरात रिक्तेये असे, ईतर सामग्री आणि उरलेले औषध वगैरे काणे : १. वापरानंतर फवारणी पाणी दूधित होऊ नये अशाप्रती मोठेकडे उबे किंवा उरलेले कीटनाशका नष्ट करणे ही उपायचार, तयार करणारे आणि वापरलाे यांचे क्म आहे. २. वापरलेले डबे दुसऱ्या प्रकारे वापर नसत नसून ते मोकळ्या जागी सूखू नयेत. ३. डबे तोंडून लोकरसती पापसू दुसऱ्या प्रकारे वापरावे.

साठवण : १. तणनाशकांच्या मिश्रया, ईतर सामग्री ठेवण्याच्या जागेमसून किंवा खोल्यापासून दूरच्या स्वतंत्र खोल्यात घ्या. किंग कीटनाशका का साठ आणि स्वच्छ लक्षांत घेऊन ते स्वतंत्र कापाटित ठेवून त्यांना कुठसू लावा. २. तणनाशकें ठेवण्याच्या जागे किंवा खोल्या उपायचार, ओलेसर नसलेल्या आणि धांपाला जेडत तसेच हवा येणाऱ्या मोठ्या असतात. ३. रिगण्या, आग आणि जमपूा दूर साठवत राखा.

वेतापली : १. लेबल व लिफलेट वर शिफारस केलेली पिके आणि कीटनाशियाय इतर वर वापर करू नये. २. वीरर हावरेंवट अनुपयोगी करतील वापरण्यापाती नाही. ३. लिफलेट मधे निर्दिष्टित केल्या प्रमाण वापरनंतर डब्ब्याची विक्रेत्या लावा.

रासायनिक रचना :

क्विजालोफॉप एथिल परिणामकारी द्रव आहे :		०५.००% व/व
इमलीकॉपर :	सोरबोल (सोलाइकरी इथाइलिन इमलीकॉपर)	३२.००%
सोरबोल (पीओडीकरी इथाइलिन अल्काइल फिनाईल इथर	आणि अल्काइल बेन्झिले स्प्रेमनंतर यांचे मिश्रण :	३२.००% व/व
सॉल्वेंट :	सॉल्वेसो (सी-८/ सी-९ एरोमेटिक हायड्रोकार्बन सॉल्वेंट)	३०.००%
एणुस :		१००.००

ह्या लेखनातून/विषयमाध्य निदेशित पिकांना अतिरिक्त अन्य पिकांना तदो उपयोग प्रसिद्धित आहे. वापरलेल्या डब्ब्याचा पुनर्वापर धोकादायक.

ઇમપૂલ

કિવઝાલોફોપ ઇથાઇલ ૫% ઇ સી

કિવઝાલોફોપ-ઇથાઇલ ૫% ઇ.સી. (ક્લોરોક્વિનૉક્સેલિન-૨-વાલ્ડોક્સી) પ્રોપીયેટર પર આધારિત એ બુનિફિ નિદામણનાશક છે. જે સોયાબીન,એડ,ડુંગળી,કપાસ, મગફળી ના પાક માં ઘાસ સમૂહ ના નિદામણોના નિયંત્રણ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

પાક	નિદામણ સાધના નામ	માત્રા હેક્ટર ઢીઠ		પાણી	ઠંડેલા અને પાણી અંતર (દિવસમાં)
		સ.ત. (ગ્રામ)	ફર્મ્યુલેશન (એ.આ.)	પ્રમાણ (લિટર્સ)	ઠંડેલા અને પાણી અંતર (દિવસમાં)
એડ	ગુજ ઘાસ (ઇરુગ્લિન ઇંડિકા) વાઇલ્ડ ફ્રેયર એમ ઘાસ/મકરા ઘાસ (એફિનેકોલોા ક્રુસગાલી), સાંવા (એફિનેકોલોા કોલોનમ) વાઇર ઘાસ (હાવેનેરા રેટુર્નક્લેન્સા) વાઇ નખી મકરુ/ડિનેટેરિયા માર્ગિનાટા	3૭.૫-૫૦.૦	૭૫૦-1૦૦૦	૫૦૦	૫૨
કપાસ	વાઇર ઘાસ (હાવેનેરા રેટુર્નક્લેન્સા) વાઇર ઘાસ (હાવેનેરા રેટુર્નક્લેન્સા) વાઇ નખી મકરુ/ડિનેટેરિયા માર્ગિનાટા	૫૦.૦	૧૦૦૦	૫૦૦	૯૪
ડુંગળી	જંડાળી નાચળી (ઇરુગ્લિન ઇંડિકા) વાઇ નખી ઘાસ/મકરા ઘાસ લવ ઘાસ, ડિનેટેરિયા સી., સાંવા (એફિનેકોલોા કોલોનમ), વાઇર ઘાસ (હાવેનેરા રેટુર્નક્લેન્સા) ક્રો ફૂટ ઘાસ/મકરા (ડિનેટોલોનમ સ્પ.)	3૭.૫-૫૦.૦	૭૫૦-1૦૦૦	3૭૫-૫૦૦	૭
મગફળી	વાઇર ઘાસ (હાવેનેરા રેટુર્નક્લેન્સા) ક્રો ફૂટ ઘાસ/મકરા (ડિનેટોલોનમ સ્પ.)	3૭.૫-૫૦.૦	૭૫૦-1૦૦૦	૫૦૦	૮૯
સોયાબીન	વાઇર ઘાસ (હાવેનેરા રેટુર્નક્લેન્સા) ક્રો ફૂટ ઘાસ/મકરા (ડિનેટોલોનમ સ્પ.)	3૭.૫-૫૦.૦	૭૫૦-1૦૦૦	૫૦૦-૬૦૦	૮૫

ઉપયોગ માટે નિર્દેશ:ઇંડેલાવળા ઈમ્પુઅરની તૈયારી: નિંદાહળાહળની આવડઠલ આગ ધીમેથી પાણીમાં ઉમેરી અને ઠગિયો અથવા લાકડીની તે બહેનર ઈલિશાઈ નીકળે થવા લાં સુધી હલાવવા હશે. ઇંડેલાવ અને મુશળા. ૧. ઉપયોગ પૂર્વે બોટલને બાળેન હલાવો. ૨. એકસમાન ઇંડેલાવ હશે. ૩. પડવળી દિશાની વિરુદ્ધ ઇંડેલાવ બાઈં હશે. ૪. ઉપયોગ પૂર્વે અને પછી પાણીથી ઇંડેલાવ ધોઈને ઠાણે. ઇંડેલાવની પદ્ધતિ અને ભમવ: વાવાણી પછી ૨૦-૨૪ દિવસે સોયાબીન પર, વાવાણી પછી ૧૫-૨૭ દિવસે ઉડેલ આકાર પર, ડેંગણી પછી ૧૩-૨૪ દિવસે કાંડા પર ફેંટે કાં બોલકાડી પર ૧૪-૨૨ દિવસે પોષાક ઇંડેલાઈ બદલી ઇંડેલાવ હશે. ઠોડે સમુદ્રા ઉડેલાવ ફેંટે કાં બોલકાડી ફિટ હશેતે બોલકાં ઇંડેલાવ નિંદાહળાહળની ઇંડેલાવ હવામાં એકલાઈવા ઇંડેલાવ છે.

પુનઃપ્રવેશ: ૨૪ SGAIS

ઉપયોગ નો સમ