KONTROL

Propiconazole 25% E.C.

Systemic Fungicide

Propiconazole 25 % E.C. is a systemic fungicide is recommended for its use to control karnal bunt & rusts in Wheat, Sheath blight in rice & leaf spots, rust in groundnut, blister blight of Tea, rust of soybean, sigatoka leaf spot of banana and leaf rust of coffee. It contains 250 gm Propiconazole 1-2 (-2,-4-dichlorophenyl)-4-propyl-1, 3-dioxolan2-yl-methyl)-1H-1,2,4,-triazole) per liter of emulsifiable concentrate(EC) formulation.

Recommendation :

Crop(s)	Common name of pest	Dosage / Ha			Waiting Period between last spray to harvest (in days)
		A.I. (g)	Formu-lation (ml)	Dilution in water (Litre)	
Coffee	Leaf rust	0.02%	0.08%	1000	88
Banana	Sigatoka leaf spot	0.025%	0.10%	500-1000	45
Wheat	Karnal bunt (Neovossia Indica)	125	500	750	30
	Leaf rust/ Brown rust (Puccinia recondita f. tritici	125	500	750	30
	Stem rust, Black rust (B.graminis f .sp.tritici)	125	500	750	30
	Stripe rust/ Yellow rust (P.striformis)	125	500	750	30
Tea	Blister blight	31.25-62.50	125-250	175-250	7
Rice	Sheath blight (Rhizoctonia solani f. sesakii)	125	500	750	30
Groundnut	Early leaf spot (Cercospora arachidicola)	125	500	750	15
	Late leaf spot (C.personata)	125	500	750	15
	Rust(Puccinia arachidis)	125	500	750	15
Soyabean	Rust (Phakopsora Pachyrhizi)	125	500	500	26

Direction of Use : Measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for high volume of application through knapsack sprayers or high volume sprayers.

Precaution : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation of the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of Poisoning : Sedation, dyspnoea, abnormal posture may occur.

First Aid :1. If swallowed induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting, if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Antidote : No specific antidote. Treat symptomatically.

Disposal of Used Container : Disposal of used packages, surplus materials and washings of fungicide : 1. It shall be the duty of manufacturers, formulators and fungicide operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions : Conditions to be specified for storage of fungicide : 1. The package containing fungicides shall be stored articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending on the quantity and nature of fungicide. 2. The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, dry, well lit, ventilated and of sufficient dimension.

Warning : 1. Not to be used on crops and pests other than those mentioned on label and leaflets. 2. Not to be used for Post - Harvest Application. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

Caution : Not to be used on Crops other than specified on this label/leaflet. Read and understand leaflet before use.

Dangerous to re-use empty containers.

Chemical Composition :

Propiconazole (a.i.)	:	25.000 % W/W
Emulsifying agent : (Ethoxylated vegetable oil or equivalent)	:	10.000 % W/W
Surfactant /wetting agent : Alkyl aryl sulfonate of Ca / Na / Mg salt or equivalent	:	3.000 % W/W
Cyclohexanone	:	25.000 % W/W
Organic solvent (C-IX)	:	Q.S. % W/W
Total	:	100.000 % W/W

कन्ट्रोल

प्रोपीकोनाजोल २५% विलेय सान्द्रण

अन्तर्वाही फफूंदीनाशक

प्रोपिकोनाजोल २५ प्रतिशत विलेय सान्द्रण एक अच्छा अन्तर्प्रवाही फफूंदीनाशक है जिसका उपयोग गेहूं के करनाल बंट, गैरूआँ, धान के पर्णच्छद अंगमारी और मूँगफली में आने वाले लीफ स्पोटस और गैरूआँ, चाय के फफोला अंगमारी तथा सोयाबीन का गैरूआँ केला के सिगाटोका पत्तियों के दाग व कॉफी के पत्तियों का गेरूआ रोगों के नियंत्रण के लिए होता है। इसमे धुलनशील कॉन्स्ट्रेट इ.सी. रचना के प्रत्येक लीटर में २५० ग्राम प्रोपिकोनाजोल (१-(२-(२,४ डायक्लोरोफेनील)-४-प्रोपिल-१,३-डायओक्सोलेन-२-इल-मेथील)-१ एच १,२,४ ट्रायझोल) सम्मलित है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा			अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों में)
		स.तत्व (ग्राम)	संरचना (मि.ली.)	पानी की मात्रा (ली.)	
कॉफी	लीफ रस्ट	०.०२%	०.०८%	१०००	८८
केला	सिगाटोका लीफ स्पोट	०.०२५%	०.१०%	५००-१०००	४५
गेंहू	कर्नाल बंट (निओवोसिया इंडीका)	१२५	५००	७५०	३०
	लीफ रस्ट/ ब्राउन रस्ट (पाकसीनिया रिकान्डिटा एफ. एसपी. ट्रीटीसाइ), तना/ काली गेरूआ, ग्रामिनिस एफ. एसपी. ट्रीटीसाइ) धारी/पीली गेरूआ (पी. स्ट्राइफोर्मिस)	१२५	५००	७५०	३०
	स्टीम रस्ट, ब्लैक रस्ट (बी.ग्रामिनीस एफ. एसपी. ट्रीटीसी)	१२५	५००	७५०	३०
	स्ट्राइप रस्ट/ यलो रस्ट (पी.स्ट्रीफोर्मिस)	१२५	५००	७५०	३०
चाय	फफोला अंगमारी	३१.२५-६२.५०	१२५-२५०	१७५-२५०	७
धान	पर्णच्छद अंगमारी (राजोक्टोनिया सोलनाइ एफ. सासाकाई)	१२५	५००	७५०	३०
मूँगफली	अगेता पत्तियों के दाग (सरकोस्पोरा अराचीडिकोला), पछेता पत्तियों के दाग (सी. पर्सोनाटा), गेरूआँ (पुसीनिया अरेचिडिस)	१२५	५००	७५०	१५
	लेट लीफ स्पोट (C.personata)	१२५	५००	७५०	१५
	Rust(Puccinia arachidis)	१२५	५००	७५०	१५
सोयाबीन	गेरूआँ (फाकोप्सोरा पैचिराइजी)	१२५	५००	५००	२६

उपयोग के लिए निर्देश : उत्पाद की वांछित मात्रा लीजिए और उसे थोड़े से पानी के साथ अच्छी तरह से मिलाइए। पीत पर लादकर चलने वाला छिड़काव यंत्र तथा बड़ी मात्रा वाले छिड़काव यंत्र आदि में बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करने के लिए निर्दिष्ट मात्रा का बाकी पानी भी अच्छी तरह से हिला-हिलाकर मिला लीजिए।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : १. खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री, के खाली बर्तनों और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुंह, आँखों, त्वचा को सम्पर्क से बचायें। ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा मे छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपडो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नही चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहने।

विष के लक्षण : सुस्ती,सांस लेने में परेशानी, असामान्य अवस्था हो सकते है।

प्राथमिक चिकित्सा : १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करवा। यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराये। २. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जए तो दूषित कपड़ों को उतार दे दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोंए। ३. यदि आँखें दूषित हो जाए तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी में लगभग १०-१५ मिनट तक धोंए। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जावे।

विष नाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा: १. फफूंदनाशक निर्माताओं या उपयोग कर्ता का कर्तव्य है कि खाली डिब्बों को अच्छी तरह तोड़ फोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड देना चाहिए। २. उपयोग के बाद खाली डिब्बों को खुला बाहर न छोड़े और ना ही खाद्य पदार्थ व दूसरी चीजें रखने के काम न लाएं। ३. बची हुई फफूंदनाशक या रांको के घोलन का इस प्रकार निपटारा करें कि जिससे आसपास के वातावरण तथा पीने का पानी विषैला न हो।

संग्रहण की शर्तें : १. फफूंदनाशक रखे हुए डिब्बों आदि ऐसे कमरे या अन्य वस्तुओ के रखे जाने वाले कमरे या जगह से दूर हो या आलमारी मे ताला कुन्जी लगाकर प्रमाण व प्रकार के हिसाब से रखें। २. जिस कमरे या आलमारी में फफूंदनाशक का भण्डारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाशयुक्त, हवादार तथा पर्याप्त लम्बा चौडा होना चाहिए जिससे कि फफूंदनाशक के भाप से प्रदूषण होने का डर न हो।

चेतावनी : १. लिफलेट और लेबल में सिफारिश किये हुये फसलों और कीट के सिवा अन्य इस्तेमाल न करें। २. फसल कटाई के बाद किये जाने वाले अन्य उपचार मे शामील न करें। ३. इस्तेमाल के बाद डब्बों को लिफलेट मे दिये हुये तरीके से नष्ट करें। ४. पॉली हाउस और सिमीत क्षेत्र के लिये इस्तेमाल का तरीका और मात्रा के लिये लिफलेट पढ़ें।

चेतावनी : लिफलेट और लेबल मे सिफारिश किये हुये फसलों और कीट के सिवा अन्य इस्तेमाल न करें। इस्तेमाल से पहले लिफलेट पढ़ें और समझ लें।

खाली डिब्बों का दुबारा इस्तेमाल करना खतरनाक है।

रासायनिक संरचना :

प्रोपिकोनाजोल (स.त.)	:	२५.००% भार/भार
ईमल्सीफायर एजेंट (ईथोक्सीलेटेड वन्स्पति तेल या अनुरूप पदार्थ)	:	१०.००% भार/भार
धुलनशील तत्व (अल्काईल एरिल सल्फोनेट का कैलशियम/सोडियम/मैग्नीशियम सॉल्ट	:	३.०० % भार/भार
साइक्लोहैक्सानोन	:	२५.००% भार/भार
ऑर्गेनिक घोलक (सी-९)	:	पर्याप्त मात्रा % भार/भार
योग	:	१००.००% भार/भार

कन्ट्रोल

प्रोपीकोनाझोल २५% ईसी

आंतरप्रवाही बुरशीनाशक

प्रोपीकोनाझोल २५% ईसी. एक आंतरप्रवाही बुरशीनाशक असून ह्याची शिफारस गव्हातील कर्नाल बंट व तांबेरा, भातातील लीफी करपा व भुईमूगातील पानावरील ठीबके, तांबेरा, चहातील ब्लिस्टर ब्लाइट, सोयाबीन वरील तांबेरा, केळी वरील सिगाटोका लिफ स्पॉट आणि कॉफीवरील पानांचा तांबेरच्या नियंत्रणासाठी वापरला जातो. ह्यात २५० ग्रॅ प्रोपीकोनाझोल १-२ (-२,-४- डायक्लोरोफीनेल)-४-प्रोपिल-१, ३-डायऑक्सिलेन-२-वायएल-मिथेल)-१ एच-१,२,४- ट्रायझोल) प्रति लिटर प्रति लिटर इमल्सिफायेबल कॉन्सन्ट्रेट (ईसी)

शिफारश:

पीक	रोगाचे सामान्य नाव	प्रमाण/हेक्टर			शेवटची फवारणी ते काढणी पर्यंतचा प्रतिक्षा कालावधि
		स.त. (ग्रॅ.)	द्रावण (मि.ली.)	सौम्य करण्या -साठी पाणी (ली.)	
कॉफी	पानांचा तांबेरा	०.०२%	०.०८%	१०००	८८
केळी	सिगाटोका लिफ स्पॉट	०.०२५%	०.१०%	५००-१०००	४५
गहू	कर्नाल बंट (निओवोसिया इंडीका)	१२५	५००	७५०	३०
	पानावरील तांबेरा/ तपकिरी तांबेरा (प्युसिनीया रिकंडाइट एफ. एसपी ट्रीटीसी)	१२५	५००	७५०	३०
	स्टीव्ह तांबेरा, काळा तांबेरा (बी.ग्रामिनीस एफ. एसपी. ट्रीटीसी)	१२५	५००	७५०	३०
	पट्टेरी तांबेरा/ पिवळा तांबेरा (पी. स्ट्रिफोर्मिस)	१२५	५००	७५०	३०
चहा	ब्लिस्टर ब्लाइट (खवल्या)	३१.२५-६२.५०	१२५-२५०	१७५-२५०	७
भात	आवरणाचा अंगक्षय (राझोक्टोनिया सोलानि एफ. सिसकोकी)	१२५	५००	७५०	३०
भुईमुग	प्रारंभिक पानावरील ठिपके (सर्कोस्पोरा आर्कीडीकोला)	१२५	५००	७५०	१५
	उशिराचे पानावरील ठिपके (सि. पर्सोनाटा)	१२५	५००	७५०	१५
	तांबेरा (प्युसिनीया आर्कीडीस)	१२५	५००	७५०	१५
सोयाबीन	तांबेरा (फाकोस्पोरा पाचीरिझी)	१२५	५००	५००	२६

वापरासाठी निर्देश आणि वापरासाठी रोप सुरक्षा उपकरणी: फवारणीसाठी आवश्यक तेवढं औषध मोजून घ्या आणि थोड्याशा पाण्यात मिसळा. नंतर पाण्याचे निर्धारित प्रमाणाचे राहिलेला अंश मिसळून ह्या मिश्रणाला व्यवस्थित एकत्र करा. आता हाय व्हॉल्यूम स्प्रेयरने किंवा नॅपसॅक स्प्रेयरने फवारणी करा.

खबरदारी: १) अन्नपदार्थ, अन्नपदार्थाचे रिकामी डबे आणि जनावरांच्या चाऱ्यापासून दूर ठेवा. २) तोंड, डोळे आणि त्वचेशी संपर्क होंदू देंवू नका. ३) फवारणीचे तुषार श्वासाद्वारे आत घेंदू नका. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा. ४) फवारणी नंतर दूषित झालेले कपडे आणि शरीराचा भाग स्वच्छ धुवा. ५) फवारणी करताना धुम्रपान, खाद्र-पीयू वा चबाद्रू नये. ६) फवारणी द्वारा बनविताना संपूर्ण संरक्षित कपडे वापरावेत.

विषबाधेची लक्षणे : शांत अवस्था, श्वास घेण्यास त्रास, असामान्य मुद्रा होंदू शकते

प्रथमोपचार: १) जर गिळले गेले असेल तर, प्रशाश बोट घालून उल्टी करवावी तीच क्रिया पुन: पुन: करीत स्वाही जो पर्यंत उल्टी साफ होत नाही. जर रुग्ण बेशुद्ध असेल तर उल्टी करवू नये. २) जर कपडे व त्वचा दूषित झाल्यास दूषित कपडे काढा व त्वचा भरपूर साबण व पाण्याने धुवा. ३) जर डोळ्यात गेले तर भरपूर प्रमाणात सलाइन/स्वच्छ पाण्याने जवळ-जवळ १०-१५ मिनीटे धुवा. ४) जर श्वासाद्वारे आत गेल्यास रुग्णास मोकळ्या हवेत आणा.

औषधोपचार: कोणताही खास उपचार ज्ञात नाही. लक्षणानुसार उपचार करा.

रिकाम्या डब्यांची विल्हेवाट: १) रिकामी डबे मोडून-तोडून मानुष वस्तीपासून दूर जमिनीत पुरावेत. २) रिकामी डब्यांचा पुर्नवापर होंदू नये म्हणून उघड्यावर टाकू नयेत. ३) पॅकेजेस व उरलेले द्रावण तसेच साफसफाईच्या पाण्याची अशा पद्धतीने विल्हेवाट लावायी जेणेकरुन पर्यावरण व पाणी दूषित होणार नाही.

साठवण : १) बुरशीनाशकाची साठवण करतेल्या पॅकेजेसची साठवण वेगळ्या खोलीत किंवा जाणेत जेथे इतर वस्तू किंवा खाद्य पदार्थ ठेवले जात नसतील अशा ठिकाणी कुलूपबंद कपाटात ठेवावे. २) हे बुरशीनाशक साठविण्याची जागा मजबूत बांधणीची, कोरडी, भरपूर हवा खेळती असणारी आणि भरपूर लांब रुंद असावी जेणेकरुन वापरने होणारे प्रदूषण टळेल.

चेतावनी : १. लेबल व लिफलेट वर शिफारस केलेली पिके आणि कीटकांशिवाय इतर वर वापर करु नये. २. पोस्ट हार्वेस्ट अनुप्रयोग करीता वापरण्याजोगी नाही. ३. लिफलेट मधे निर्देशित केल्या प्रमाणे वापरानंतर डब्यांची विल्हेवाट लावा. ४. दिशा आणि पॉली हाऊससाठी प्रमाण आणि मर्यादीत बंधासाठी लिफलेट पहा.

सावधगिरी : ह्या लेबल / पत्रिकेवर निर्देशित पीका व्यतिरिक्त इतर पीकावर वापरु नये.

रिकामी डब्यांचा पुर्नवापर धोकादायक आहे.

रासायनिक संरचना :

प्रॉपिकोनाझोल (स.त.)		२५.०% व्ह/व्ह
इमल्सिफाईंग एजंट (एथोक्सायलेटेड व्हेजिटेबल ऑईल ऑर इक्विवॅलेंट)		१०.०% व्ह/व्ह
सर्फेक्टंट/वेटिंग एजंट (अल्काइल एरिल सल्फोनेट ऑफ कॅल्शियम सॉल्ट)		३.०% व्ह/व्ह
सायक्लोहेक्साझान		२५.०% व्ह/व्ह
ऑर्गेनिक द्रावक - सी १		क्यू.एस % व्ह/व्ह
एकूण		१००.०% व्ह/व्ह

ಕನ್ಟ್ರೋಲ್

ಪ್ರೊಪಿಕೊನಾಝೋಲ್ ೭೫ % ಇ. ಸಿ.

ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಿ

ಪ್ರೊಪಿಕೊನಾಝೋಲ್ ೭೫% ಇ. ಸಿ. ಎಸೆ ಒಂದು ಅಂತರ್ವಾಹಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಿ. ಗೆದ್ದು ಗೆಡುಸು ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಗೆಂಬಾಣುಸು ಕಾಯಿಲೆ, ಅಕ್ಕುರಲೀಗ, ಸರ್ಕಾಕೆಂ ಎಲೆಚುಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಸೆಂಡಸಗಾಳಿನ ಅಕ್ಕುರಲೀಗ, ಕೆಂಪಾದ ಗಾಳಿನ ಮತ್ತು ಎಂಬಸೆಗಾಯಿ, ಸೌಯಾಬೆನ್ ಗಾಳಿನ ಅಕ್ಕುರಲೀಗ, ಅಂಬುಸೆಂದೆ ಸಿಗಟೋಕಾ ಎಲೆಚುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕಾಫೀಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಕ್ಕು ಸಚ್ಚೆ ಅಕ್ಕುರಲೀಗ್ಸು ಅರಿತುಕ್ಕುತ್ತೆ ಇದು 250 ಗ್ರಾಮು (ಪ್ರೊಪಿಕೊನಾಝೋಲ್ 1-2 (-2,-4-ಡೈಕ್ಲೋರೊಫೆನೈಲ್)-4-ಪ್ರೊಪಿಲ್-1,3- ಡಯಾಕ್ಸೊಲಾನ್-2-ಯಿಲ್, ಮೆಥೈಲ್)-1 ಹೆಚ್-1,2,4,-ಟ್ರಯಾಜೋಲ್)ಅನು ಒಂದರ್ ಎಮಲ್ಸಿಫಯಬುಲ್‌ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್(ಇಸಿ)ಸಾಂದ್ರತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಿಫಾರಸುಗಳು

ಸಂಬಂಧ	ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರೆಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸ್ಗಳು ಹೆಕ್ಟೇರ			ಮಾಯ ಕೊಯ್ಯಲು ಸಂಬಂಧ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸಿಂಪಡಣೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮಯ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
		ಎಐ. (ಗ್ರಾ)	ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಎಂ.ಎಲ್)	ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ನೀರು (ಲೀಟರ್)	
ಕಾಫಿ	ಎಲೆ ತುಕ್ಕು	0.02%	0.08%	1000	88
ಅಂಟೆ	ಸಿಗಟೋಕಾ ಎಲೆಚುಕ್ಕೆ	0.025%	0.10%	500-1000	45
ಗೆಂಬು	ಕರ್ನಲ್ ಕಾಯಿಕ (ನಿಯೋವೊಸಿಯಾ ಇಂಡಿಕಾ)	125	500	750	30
	ಎಲೆ ತುಕ್ಕು/ ಕಂದು ತುಕ್ಕು/ ಗೆಂಬು (ಪ್ಯುಸಿನಿಯಾ ರಿಕಾಂಡಿಟಾ ಎಫ್. ಎಸ್ಪಿ ಟ್ರಿಟಿಸಿ)	125	500	750	30
	ಕಾಂಡ ತುಕ್ಕು, ಕಪ್ಪು ತುಕ್ಕು (ಬಿ.ಗ್ರಾಮಿನಿಸ್ ಎಫ್. ಎಸ್ಪಿ. ಟ್ರಿಟಿಸಿ)	125	500	750	30
	ಪಟ್ಟೆ ತುಕ್ಕು/ ಹಳದಿ ತುಕ್ಕು (ಪಿ. ಸ್ಟ್ರಿಫಾರ್ಮಿಸ್)	125	500	750	30
ಟೀಯಾಸು	ಸಸಿಯ ಬೆಂಕಿ (ರಿಜೊಕ್ಟೋನಿಯಾ ಸೋಲಾನಿ ಎಫ್. ಸೆಸಕೀ)	31.25-62.50	125-250	175-250	7
ಭತ್ತ	ಸಸಿಯ ಕಂದು ಕಲೆ (ಎಫ್ಸ್ಪಿಯಾ ಸೇಸಾಮಿ)	125	500	750	30
ಶೇಂಗಾ	ಆರಂಭದ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ (ಸರ್ಕೊಸ್ಪೋರಾ ಅರಾಚಿಡಿಕೋಲಾ)	125	500	750	15
	ಕೊನೆ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ (ಸಿ. ಪರ್ಸೊನಾಟಾ)	125	500	750	15
	ಕಂದು ರೋಗ (ಪ್ಯುಸಿನಿಯಾ ಅರಾಚಿಡಿಸ್)	125	500	750	15
ಸೋಯಾಬೀನ್	ಕಂದು ರೋಗ (ಫಕೊಪ್ಸೊರಾ ಪಾಚಿರಿಜಿ)	125	500	500	26

ಬಳಸುವ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಗಳು: ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡ್ಡಿ ಕಿಟ್ಟಾಗ ನೀರು ಹೌಗಿ ಬಳಿಯಬೆಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ಸುರು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಂಡಾರುವೆಯೆಗೆಗೆ. ರಾಡಿ ಬಿಳಾ ನೀಟಿ ಬರಿಯಾಕ್ಕು ಕಿರಿ ಬಾಗಾ ಬಿಯಬೆಡ್ತಿ ವ್ಯೌಸಿಯ್ ಸ್ಪ್ರೆಯರ್ ಗಳಾ ಇ ಸಾಮ್ಯಾ ಇರಬೆಗಾಗಿರಾಗಿರಿ.

ಮುಂದಿನ ಜಾಗ್ರತೆಗಳು: 1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಾಲು, ಖಾಳಿ ಇರುವ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮತ್ತುಯು ಇತರುವುಂ ದಾನಾಲು, ಮೊಕ್ಕು ದೂರಂಗಾ ಕಿಟ್ಟು ಪುಂದುಂದೆ. 2. ಕಿಟ್ಟುದೆಬೆತ್ತಿ, ಬಣ್ಣದುಂ ಅಂಟುಂದಾ, ಕಳ್ಳದೆ ಬೆಸೆಂದಾ ಜಾಗ್ರತ್ತೆ ಮೌಂದಾಲಿ. 3. ಸ್ಪ್ರೆ ಪ್ರಾಣುವು ಪೌಷ್ಟಿಕುಂದು ಸಿಂಪ್ರಾದು. ಬೆದೊಡು ಗಾಳಿಯಾಲು ಮಾಯುಗೆಗೆ ಬೆದೊಡು ಮೌಯೆಗೆಗೆ. 4. ಕಿಟ್ಟುಪ್ಪಿನ್ನು ಬಟ್ಟುನ್ನು ಕಳುಕ್ಕೆಗಾಲಿ ಕಿಟ್ಟುಂ ಕುಡಿಗೆಗಾಲಿ. 5. ದೆಂಪ್ರ ಬೆದೊಡು ಮೌಯೆಗೆಲ್ಲುಯು ಬೆದ್ದಾಲಾ ಕೊಂಡ್ರೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮುಂದಾಲಾ ಚಾಂಬೆ ಮೌಯೆಗೆ. 6. ಮಿಶ್ರಮಾನ್ನು ಕಿಟ್ಟುಪ್ಪಿಯೆಲ್ಲುಯು ಮತ್ತುಯು ಬೆದೊಡು ಮೌಯುವೆಗೆಲ್ಲುಯು ಧ್ಯಾನ್ನಾ ಕಟ್ಟುವ ಮಾನ್ನುಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವುದು.

ವಿಷಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು: ಸುಸ್ತು, ಶರೀರಲಾಗದ ಮತ್ತುಯು ಅಪೌಷ್ಟಕರ ಛಂಗಿಯಂತ ಸಂಭವಿಂದಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ವಿತಿಕ: 1. ಒಟೆಗೆ ಮಿಂಗಿನ್ನುಂದೆ, ತಾಂತಿ ರೆಯಿಂದರಾ ಕೆರ ಮೌಟಾಗ್ರಾ ಬಿಡ್ತಾ ಪ್ರಯಾಣಾರ್ಥಂ ಇಳ್ಳಾರುವು. 2. ಬಟ್ಟಲು ಮತ್ತುಯು ದೇಹ ಕಿಂಬಿಯಿಂದೆ ಬಟ್ಟೆಲ್ಲು ಕೆಳಿಸಿ ನೀಲುವೆ ನಿಂಬು ತಾಯಿಂದಾ ಕುಡಿಂದಾ ಕಳ್ಳಂಗಾ ಸ್ನಾನಂ ಮೌಯೆಗೆ. 3. ಒಟೆಗೆ ಕಂಗಿನ್ನುಂದೆ ಬಳ್ಳೆಂದು ಕಿಂಬಿಯಿಂದೆ ಬಟ್ಟೆಲ್ಲು ಕೆಳಿಸಿ ನೀಲುವೆ ನಿಂಬು ತಾಯಿಂದಾ ಕುಡಿಂದಾ ಕಳ್ಳಂಗೆ ಕೆಳ್ಳುಕೊಂಬಾ ಕುಡುಮೌಯೆಗೆ. 4. ಒಟೆಗೆ ಲೌಕಿ ಪೆಲ್ಲಿಂದುಂದೆ, ನೆಂಬುವೆ ಲೌಗಿ ಅಂಬುಂದುಂದು ಅಂಗಿಂದಾಲಿ.

ಔಷಧಿ ಉಪಚಾರ: ಯಾವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿರಿ.

ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಯ ವಿಲೇವಿಯ ವಿಧಾನ: 1) ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಿಯ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಳ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಿ ಮಾಡುವುದು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2) ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮರುಬಳಕೆಯಾಗದಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. 3) ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಗಮನದಿಂದ ಮತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಹೂತಿಡಬೇಕು.

ಶೇಖರಣೆ ಸ್ಥಿತಿಗಳು: 1) ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಿಯ ಪೊಟ್ಟಣ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೀಲಿ ಕೈ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಶೇಖರಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. 2) ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಣಗಿದ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಕು ಬರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಗಲ ಇರಬೇಕು.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: 1. ಈ ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. 2. ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. 3. ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳಂತೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು. 4. ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಕರಪತ್ರ ನೋಡಿರಿ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಲೇಬಲ್/ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಬೆಳೆಗಳ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮುಂಚೆ ಕರಪತ್ರ ಓದಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕರ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ :

ಪ್ರೊಪಿಕೊನಾಝೋಲ್(ಎ. ಐ)		25.0 % ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ : (ಎಥಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಸಮಾನ)		10.0 % ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಸರ್ಫಕ್ಟಂಟ್/ ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ (ಆಲ್ಕಿಲ್ ಆರಿಲ್ ಸಲ್ಫೊನೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್)		3.0 % ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸಾನೋನ್		25.0 % ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ - ಸಿಕ್ಸ್		ಕ್ಯೂ. ಎಸ್. % ಡಬ್ಲ್ಯೂ

கன்ட்ரோல்

ப்ரொபிகோனஜோல் 25% இ.சி.

ஊடுருவிச் செயல்படும் பூஞ்சாணங்கொல்லி

ப்ரொபிகோனஜோல் 25% இ.சி. ஊடுருவும் பூஞ்சாணக்கொல்லியாகச் செயல்பட்டு கோதுமைப் பயிரில் சாம்பற்புட்டை மற்றும் துரு நோய்கள், நெற்பயிரில் இலையுறைக்கருகல் நோய், நிலக்கடலை பயிரில் இலைப்புள்ளி மற்றும் துரு நோய்கள், தேயிலையில் கொப்புக்கருகல் நோய், சோயாபீன் பயிரில் துரு நோய், வாழையில் சிகடோகா எலைப்பும் இலைப்புள்ளி, காபி பயிரில் துரு நோய் ஆகியவைகளைக் கட்டுப்படுத்தும். திரட்டு குழம்பாகக் கரைக்கப்படும் இதில் ஒரு விட்டர் தயாரிப்பில் ப்ரொபிகோனஜோல் 1-2 (-2,-4-டைகுளோரோஃபீனைல்) -4-புரொபைல்-1, 3-டையக்சோலான்-ஒய்லம்-மிதைல்)-1எச்-1,2,3,-டிஆசபோல்)

சிபாரிசு :

பயிர்கள்	பூச்சிகளின் பெயரும் பெயர்	டோஸ்/ஹெக்டேர்			கடைசி தெளிப்பிற்கும் அறுவடைக்கும் இடைவெளி (நாட்களில்)
		இலை (கிராம்)	மருந்து (மிலி)	கலந்தநீர் அளவு (லிட்டர்)	
காபி	இலைத்துரு	0.02%	0.08%	1000	88
வாழை	சிகடோகா இலைப்புள்ளி	0.025%	0.10%	500-1000	45
கோதுமை	சர்னால் பண்ட் (சிடோபாலவியா இண்டிகா)	125	500	750	30
	இலை துருநோய்/ பிரவுன் துருநோய்	125	500	750	30
	புதுவிலியா ரேகோர்னட்ட் எஃப் எஸ்பி)				
	டர்டிசி தண்டு துருநோய்,	125	500	750	30
	கறுப்பு துருநோய் (பி. கிராமினிஸ் எஃப் எஸ்.பி. டர்டிசி)				
	லீஃப் ரூட் துருநோய் மஞ்சள் துரு நோய் (பி. ஸ்ட்ரீபோர்மிஸ்)	125	500	750	30
தேயிலை	பிளிஸ்டா கருகல்	31.25-62.50	125-250	175-250	7
தென்	தோகை கருகல் (சிஜோக்டோனியா சோலானி எஃப்சோலானி)	125	500	750	30
நிலக்கடலை	ஆரம்ப இலைப்புள்ளி (செர்கோஸ்போரா அராச்சிடி கோவா)	125	500	750	15
	பின் நிலை இலைப்புள்ளி (சி. பெர்சோனாட்டா)	125	500	750	15
	துரு நோய் (புரசுனியா அராச்சிடிஸ்)	125	500	750	15
சோயாபீன்	துருநோய் (பக்கோரோனா பிரிஷி)	125	500	500	26

பயன்படுத்தத் குறிப்புகள்: தேவையான அளவு மருந்தை மற்றுத்தண்ணீரோடு அதில் சிறிதளவு நனை வளரி சேர்த்து ஒரு குக்கியால் நன்கு கலக்கவும். பிறகு தெளிப்பு அளவுக்குத் தேவையான மீதி தண்ணீரையும் சேர்த்து நன்கு குலுக்கி அதில் அளவு தெளிப்புக்கு நாப்கால் தெளிப் பான் மூலம் தெளிக்கலாம்.

முன்னெச்சரிக்கைகள்: 1. உணவு பண்டங்கள், வெற்று உணவு பாத்திரங்கள் மற்றும் கால் நடைகளுக்குத் அப்பால் வைக்கவும். 2. வாயிலும், கண்களிலும் மற்றும் சருமத்திலும் படுவதை தவிர்க்கவும். 3. தெளிப்பு சாறலை உட்கவாசிக்கக் கூடாது. காற்று வீசும் திசையிலேயே தெளிக்கவும். 4. தெளிப்பு முடிந்த பின் நாமாடப் பயன்படுதலும், உடல் பாகங்களையும் நன்றாக கழுவவும். 5. மருந்துகூடங்கும்போது, புகை பிடிக்கவோ, பருகவோ, உண்ணவோ மற்றும் மெல்லவோ கூடாது. 6. கலவை தயாரிக்கும் போதும், தெளிக்கும்போதும் முழுமானகப்பான அணுகலைன் அணியவும்.

நச்சுப்பட்ட அறிகுறிகள்: மயக்கமடைதல், மூச்சுத்தினறல், அசாதாரண விழைப்பு தோன்றுதல்.

முதலுதவி: 1. விழுங்கியிருப்பவர், தொண்டையிலிருந்து விரைவாகவிடு வாந்தி எடுக்கத் தூண்டவும். வாந்தி நிரவம் நிங்கும் வரை அப்படியே செய்யவும். தாக்குண்டவர் மயக்கத்திலிருக்கும் பொழுதோ வாந்தி எடுக்கக் கொடுக்கவோ கூடாது. 2. ஆடைகளும் சருமமும் மாசுபட்டால், ஆடைகளை நீக்கி, சோப்பு மற்றும் அதிக நீரினாலும் சருமத்தை கழுவவும். 3. கண்கள் மாசுபட்டால், 10-15 நிமிடங்களுக்கு ஊப்பு/சுத்தமான நீரினால் கழுவவும். 4. உட்கவாசித்தால், பாதிக்கப்பட்டவரை சுத்தமான காற்றோட்டமுள்ள இடத்திற்கு கொண்டு செல்லவும்.

நச்சு முறிவு: குறிப்பிட்ட தக்க முறிவு எதுவும் கிடையது. அறிகுறிகளுக்கேற்ப சிகிச்சைகளிக்கவும்.

கொள்கலன்களை அப்புறப்படுத்தல்: (1) பேக்கேஜுகள் அல்லது எஞ்சிய பொருட்கள் மற்றும் எந்திரத்தின் கழுவு நீர் முதலியவற்றை கற்றுப்பு குழம் அல்லது நீர் நிலைகளுக்கு மாக ஏற்பாடாகவாறு பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்தவும் (2) உபயோகித்த பேக்கேஜுகளை மறுமறை பயன்படுத்தவே வேளியில் விட்டு வைக்கக் கூடாது. (3) பேக்கேஜுகளை உடைத்து வசிப்பிடங்களுக்குக் அப்பால் புதைக்கவும்.

லேபிடு: 1) பூச்சுக்கொல்லி உள்ள பேக்கேஜுகளை இதர பொருட்களை பத்திரப்படுத் தும் அறைகளில் அல்லது கட்டிடத்தில் இருக்கும் அப்பால் பத்திரமாக தனி அறைகளில் வைக்க வேண்டும். அல்லது பூச்சுக்கொல்லியின் அளவு மற்றும் தக்கமைப்பைப் பொறுத்து தனி அமாரியில் பூட்டி வைக்கலாம். 2) பூச்சுக்கொல்லி கலக்கைன பத்திரப் படுத்தி வைக்கப்படும் இடம் நல்ல கட்டுமானம், உலர்வு, நல்ல வெளிச்சம் மற்றும் காற்றோட்டம் உடன் மருந்து ஆவியாகி காற்றை மாக பத்திரமாக தனிக்க போது மான பரப்பளவு இருக்க வேண்டும்.

எச்சரிக்கை: 1. கேரேம் மற்றும் ஆவியாகி காற்றை மாக பத்திரமாக தனிக்க போது மான பரப்பளவு இருக்க வேண்டும். 2. அதுமைக்கும் மற்றும் இதுவே மருந்தைப் பயன்படுத்தக் கூடாது. 3. கையுடைக்கும் மற்றும் தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு இடங்களிலிருக்கவும்,குறிப்புகளுக்கு - கையேடுகட்டாயக்கவும்.

எச்சரிக்கை : இந்த லேபிலில் / கையேட்டில் குறிப்பிட்டு இருக்காத பயிர்கள் மீது பயன்படுத்தக்கூடாது.

காலி கொள்கலன்களை மறுபயோகம் செய்வது அபாயத்தை விளைவிக்கும்.

ரசாயனக் கலவை:

ப்ரொபிகோனஜோல் (w)	25.0% w/w
வைல்ட்.அயரில் ஏஜெண்ட் (எந்தரசாகவிருப்பட் வெஜிடேபிள் ஆய்ல் அல்லது அதற்குச் சமானவது)	3.0% w/w
எட்.பிளஸ்.நுனைகளும் ஏஜெண்ட் (கேல்சியம் உப்பின் அல்லைகள் ஆதில் சல்பொனேட்)	25.0% w/w
கலக்கியாக் கலவைகள் ஆர்கானிக் கரைப்பான்கிறுகள்	28% w/w
	100.00% w/w

வடஜல

ப்ரோபிகோனஜோல் ২৫% டீசி

ஊடுருவுறுவி தடுக்கிறானாசக

ப்ரோபிகோனஜோல் ২৫%டீ. ஸி. நிறை அந்தரவுறுவி தடுக்கிறானாசக வி. நிறை நீ வடக்க விசை வரடாக மிட் அடை ரமட்,நீரு விசை கீயூல் அங்கமரி,மூர்வலுடி கீவீல் பட்ரி மரமட்,ரமட் ரமட் விசை,நிறிஅமரிய விசை ரமட், அசே விசை ஸிகாரோகா பட்ரா ரமட் ரமட் அசே வகரி விசை பட்ரி ரமட் ரமட் கரு பரீடு ரமலி வரடரட லி சிஷாரண லிடி ரான்ரி வி. நிறை விசை ২৫০ ஜ்.பட்ரிவிசாரிக ৭-২(-২,-৪-ஜாரிக்கிரேக்கிரோஸ்ரில்) -৪-பூப்ரமில ৭,৩-ஜாரிவரமாரா ২-ஹில-ஸிகாரில்)-৭ ஸிக ৭,২,৪,-ட்ரயாரில்) பூதி லிடரு ஆலுகமில ஸ்மேட்ரு (லிரி)ஜாரமுலிக ஜாரமுடி.

சிபாரிசு:

ரமட்	ரோக வா ஆம நா	மாரமா/பி.			அரமரி ஸிபு ட் வடரி ரக ரூபிரி (நிரம)
		நி.ரு. (ஜ்.)	ஜாரமு. (நிலி.)	ஹில ரா பரி (நி.)	
வாரி ரிலே	பட்ரி ரமட்	০.০২%	০.০৫%	৭০০০	৫৫
	ஸிகாரோகா பட்ரா வாரி	০.০২৫%	০.৭০%	৭০০-১০০০	৪৭
வரக	வரமட ஸட் (ரிஜெஸிஸி ரிஜிர)	৭২ম	৭০০	৭৫৪৩	৪৩
	பட்ரி ரமட் / ரூவ ரமட் (பூரிபிரிய ஸிகாரோட ஸிஜ.ஸம.)	৭২ম	৭০০	৭৮০	৪৩
	ரூடிரிபிரி ரமட் ரமட், வரா ரமட் (ஸி. ஜூரிபிரிய ஸிஜ ஸம. ரூடிரிபிரி)	৭২ম	৭০০	৭৮০	৪৩
ரூவ	ஹரிஸரவ அகாபரி	৪৩.২৮-৫২.৭০	৭২৮-২৫০	৭৩৮-১৭৫	১
தான	ஸரபிய ரமட்/ பிலா ரமட் (பி. ஸட்ரிஜரானிஸ)	১২৫	৫০০	৭৫০	৩০
பூர்வலுடி	அரிவா பட்ரா வாரி (ஸரவிஸபொ ஆரஸிஜிலிஜ்)	৭২ম	৭০০	৭০০	৭৮
	ஷடுவா பட்ரி வாரி (ஸி. பஸரிநாட)	৭২ম	৭০০	৭০০	৭৮
	ரமட	৭২ম	৫০০	৭৫০	১৫
	(பூரிபிரிய ஆரஸிஜிரி)				
ஸிநாபிரி	ரமட (ரரிஸபிர பரிஸிரி)	৭২ম	৭০০	৭০০	৭৫

வரடக ஜரி ரமரிஜர் அடை பிரா ஜுரிபிரி லீர் மரிர்: ஜுஜிரிநாரக ரி ரிஜிரி மாரரா நாப வ ரி ஷிக் நிரி பாரி ரிவ நிமாரி। நிர வி.ரமிக ஸம்பூரக ரரக ரரி ஜாரிஜூ। ரிவ ஜிரவரக வரட ஜரி ரிஜிரி பாரி ரி ஜாரி மாரரா ரி மிரா வ பூரி ஜரு-மிரா ஜரி।

மாஜரிரி: ৭) ঈரக, ঈரக வரக் ஜாரி வரடரா அடை பூரு ரரக் ரி ஜுரு ரரி। ২) ঈரு, அடை ரிவ ரு ஸாரி ரி ரு ரிஜரட ரிரி। ৩) ஸபூ ஜுரு ரு ரரு ரரி அரிவ ரா ரிரி। ஸபூ ரவா வரட ரு ஜுரு ரிவ ரி வரி। ৪) ஸபூ ரு ரிஜரட ரு ரரு ரரி ரிரி ரி ரிஜரி। ৫) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৬) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৭) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৮) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৯) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ১০) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ১১) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ১২) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ১৩) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ১৪) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ১৫) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ১৬) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ১৭) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ১৮) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ১৯) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ২০) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ২১) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ২২) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ২৩) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ২৪) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ২৫) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ২৬) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ২৭) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ২৮) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ২৯) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৩০) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৩১) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৩২) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৩৩) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৩৪) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৩৫) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৩৬) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৩৭) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৩৮) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৩৯) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৪০) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৪১) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৪২) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৪৩) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৪৪) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৪৫) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৪৬) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৪৭) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৪৮) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৪৯) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৫০) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৫১) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৫২) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৫৩) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৫৪) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৫৫) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৫৬) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৫৭) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৫৮) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৫৯) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৬০) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৬১) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৬২) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৬৩) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৬৪) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৬৫) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৬৬) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৬৭) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৬৮) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৬৯) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৭০) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৭১) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৭২) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৭৩) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৭৪) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৭৫) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৭৬) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৭৭) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৭৮) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৭৯) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৮০) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৮১) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৮২) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৮৩) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৮৪) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৮৫) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৮৬) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৮৭) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৮৮) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৮৯) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৯০) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৯১) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৯২) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৯৩) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৯৪) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৯৫) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৯৬) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৯৭) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৯৮) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৯৯) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ১০০) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி।

கன்ட்ரோல்

ப்ரோபிகோனஜோல் ২৫% ই.সি.

அந்தரவிரி ஜுரக்கானாசக

ப்ரோபிகோனஜோல் ২৫% ই.সি ரி ரிஜிரி மாரரா நாப வ ரி ஷிக் நிரி பாரி ரிவ நிமாரி। நிர வி.ரமிக ஸம்பூரக ரரக ரரி ஜாரிஜூ। ரிவ ஜிரவரக வரட ஜரி ரிஜிரி பாரி ரி ஜாரி மாரரா ரி மிரா வ பூரி ஜரு-மிரா ஜரி।

மாஜரிரி: ৭) ঈரக, ঈரக வரக் ஜாரி வரடரா அடை பூரு ரரக் ரி ஜுரு ரிவ ரி। ২) ঈரு, அடை ரிவ ரு ஸாரி ரி ரு ரிஜரட ரிரி। ৩) ஸபூ ஜுரு ரு ரரு ரரி அரிவ ரா ரிரி। ஸபூ ரவா வரட ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৪) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৫) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৬) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৭) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৮) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৯) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ১০) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ১১) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ১২) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ১৩) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ১৪) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ১৫) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ১৬) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ১৭) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ১৮) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ১৯) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ২০) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ২১) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ২২) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ২৩) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ২৪) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ২৫) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ২৬) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ২৭) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ২৮) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ২৯) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৩০) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৩১) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৩২) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৩৩) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৩৪) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৩৫) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৩৬) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৩৭) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৩৮) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৩৯) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৪০) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৪১) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৪২) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৪৩) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৪৪) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৪৫) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৪৬) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৪৭) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৪৮) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৪৯) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৫০) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৫১) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৫২) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৫৩) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৫৪) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৫৫) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৫৬) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৫৭) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৫৮) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৫৯) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৬০) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৬১) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৬২) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৬৩) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৬৪) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৬৫) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৬৬) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৬৭) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৬৮) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৬৯) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৭০) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৭১) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৭২) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৭৩) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৭৪) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৭৫) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৭৬) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৭৭) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৭৮) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৭৯) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৮০) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৮১) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৮২) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৮৩) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৮৪) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৮৫) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৮৬) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৮৭) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৮৮) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৮৯) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৯০) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৯১) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৯২) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৯৩) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৯৪) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৯৫) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৯৬) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৯৭) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৯৮) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ৯৯) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி। ১০০) ஸபூ வரட ரிவ ரு ஜுரு ரிவ ரி।

கந்ட்ரோல்

ப்ரோபிகோனாஜோல் 25% ஈசி

அந்தரவ்யாபி ஶீலிந்த்ரனாசக

ப்ரோபிகோனாஜோல் 25% ஈசியை ஒடம் பிரகாசன்காக்ஸ்ஸுக்கு ஶீலிந்த்ரனாசக்காரனுடு ஸுமரியா ஶக்கரஃபுலம் மற்று ஶுக்கு ரோக்கள் ஶுக்கு ஸ்லாக்கள் மற்று ஸ்லாக்கள் ஒலிக்கு ரோக் பாக்க ஶுக்கு ரோக், ஶுபாக ஶுக்கு ஆபாக்கும், ஸுமரியாக்கு ஶுக்கு ரோக், ஶுபாக ஶுக்கு ஆபாக்கும் ஸுமரியாக்கு ஶுக்கு ரோக் பாக்க