MAXXCOTT

Pyrithiobac Sodium 3.1% w/w + Pendimethalin 34% w/w ZC (Herbicide)

(For agricultural use)

Pyrithiobac Sodium 3.1% w/w + Pendimethalin 34% ZC is a broad spectrum pre-emergence herbicidal formulation containing 3.1 % of Pyrithiobac sodium, 34% of Pendimethalin with other relevant ingredients. It effective for the control of broad leaf and grassy weeds in cotton crop.

Chemical Composition:	**Contents% w/w**
Pyrithiobac sodium a.i.	3.10
Pendimethalin a.i.	34.00
Lignosulfonic acid sodium salt	7.55
Polycondensate of Sulfonated alkyl naphthalene sodium salt and formaldehyde polymer	0.50
Poly phenyl hexyl urea	2.21
Xantham Gum	0.03
Silicon antifoam emulsion	0.30
Mixture of Benzisothiazolinone and methyl Isothiazolinone solution	0.10
Propylene glycol	1.50
Demineralized Water	Q.S.
Total	100

Recommendation:

Crop	Weed species	Dosage / ha a.i. (gm)	Dosage / ha Formulation (lt)	Dilution in Water (lt)	Waiting period between last application & harvest (days)	Crop Stage	Re-entry Period	Frequency
Cotton	Digitaria sanguinalis – Crab grass, Commelina benghalensis – Tropical spiderwart, Amaranthus viridis- Green Amaranth, Parthenium hysterophorus- Congress grass, Celosia argentia, Cockcomb,	649.25 - 742.00	1.75- 2.00	500	152	Within 1-3 days after sowing	24 hours	1

Directions for Use: Measure out requisite quantity of the herbicide and mix it well with small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation. Do not spray facing the wind. Do not apply Pyrithiobac Sodium 3.1% w/w + Pendimethalin 34% ZC under hot weather and moisture stress conditions. Extent and duration of weed control depends upon soil and moisture conditions.

Time of Application: Pre-emergence application within 1-3 days of sowing (in assured soil moisture conditions).

Application Techniques: Should be applied as spray.

Application Equipment & Nozzle: High volume sprayer viz. Knapsack sprayer with proper nozzle (flat-fan/ flood jet) nozzle.

Safety Precautions: 1. Keep away from food and feedstuff. 2. Avoid contact with skin and eyes. 3. Avoid inhalation of the spray mist. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing, while handling.

Symptoms of Poisoning: No specific symptoms of poisoning. Headache, giddiness, nausea, vomiting, sweating, excessive lacrimation and salivation may occur.

First Aid Measures: If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. **If inhaled:** Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician. **In case of skin contact:** Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. **In case of eye contact:** Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists. Consult your specialist.

Antidote: No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Phytotoxicity: Non-phytotoxic when used as recommended dosage.

Disposal of Used Containers: 1. It shall be the duty of manufacturer/ formulators and operators to dispose packages or surplus materials & washings from the machine and container shall be disposed-off in a safe manner so as to prevent environment and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent the re-use 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Condition: 1. The herbicide should be stored in original packaging and separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles specially food stuff. It should be kept in separate almirah under lock and key depending upon the quality and nature. 2. The packages containing the herbicide should be stored/ transported in such a manner that they do not come in contact with foodstuffs and animal feeds and store away from fire and open flame. 3. The rooms or premises meant for storing herbicides should be well lit, well built, cool, and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Dosages: 649.25–742.00gm a.i. /ha (1.75 – 2.00 l/ha formulation).

Instruction for Mixing: Measure out requisite quantity of the herbicide and mix it well with small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crop with suitable sprayer.

Spraying Instruction: Spray uniformly in the direction of wind. Ensure thorough coverage of the weeds.

Application Timing: No restriction. Avoid application under high wind, before rain.

Crop Stage: Before germination of cotton crop.

Frequency including Maximum Number of Sprays: One application only refer to the above recommendation only.

Stage during which Pesticide should not be applied for on any crop: Refer to the above recommendation only.

Re-entry Period: 24 hours after spray.

Pre-harvest Index (PHI): Cotton – 152 days.

Weather Condition: Weather should be clear, calm, no rains and no strong winds. Avoid applications hot weather and moisture stress conditions.

Soil & Water: No specific soil conditions are prescribed. Clean water to be used for spray.

Cautionary Statement: Not to be used on crops other than mentioned on this label/leaflets. This product is very toxic to the fish and aquatic organisms and thus its use in and around water bodies must be avoided. Destroy the container after use as directed on leaflet. Dangerous to use the empty container.

मैक्सकॉट

पायरिथायोबेक सोडियम ३.१% भा/भा + पेन्डीमेथलीन ३४.० % भा/भा जेड. सी.

खरपतवारनाशक

(केवल कृषि उपयोग के लिये)

पायरिथायोबेक सोडियम ३.१% + पेन्डीमेथलीन ३४.० % जेड सी एक बहुमुखी अंकुरण पूर्व खरपतवारनाशी संयोजन है जिसमें ३.१ % पायरिथायोबेक सोडियम एवं ३४.० % पेन्डीमेथलीन के अलावा अन्य आवश्यक सहयोगी पदार्थ है। यह फसल की फसल में चौड़ी पत्ती और घास के खरपतवार के नियंत्रण के लिए प्रभावी है।

रसायनिक सरंचना:	**घटक % भा./भा.**
पायरिथायोबेक सोडियम स.त.	३.१०
पेन्डीमेथलीन स.त.	३४.००
लिग्नोसल्फोनिक एसिड सोडियम नमक	७.५५
सल्फोनेटेड अल्काइल नेफथलीन सोडियम नमक और फॉर्मलडेहाइड पॉलिमर के बहुसंघनन	०.५०
पॉली फिनाइल हेक्साइल यूरिया	२.२१
ज़ेंथम गम	०.०३
सिलिकॉन एंटीफोम इमल्शन	०.३०
बेंजिसोथियाजोलिनोन और मिथाइल आइसोथायज़ोलिनोन घोल का मिश्रण	०.१०
प्रोपलीन ग्लइकोल	१.५०
अखनिजी जल	पर्याप्त मात्रा
कुल	१००

सिफारिश:

फसल	खरपतवार	मात्रा प्रति हेक्टर स.त. (ग्रा)	मात्रा प्रति हेक्टर संयोजन (ली)	पानी की मात्रा (ली)	आखरी छिड़काव और फसल कटाई में अंतर(दिन)	फसल अवस्था	पुनः प्रविष्टि (घंटे)	आवृत्ति
कपास	बड़ा मकड़ा, बोरवा, जंगली चौलाई, गाजर घास, गरुवा घास	६४९.२५ - ७४२.००	१.७५ -२.००	५००	१५२	बोवाई के १ से ३ दिन के भीतर	२४ घंटे	१

उपयोग संबंधी निर्देश: निश्चित मात्रा में ली हुई खरपतवार नाशक को पहले थोड़े पानी में डाल कर घोल लें तत्पश्चात आवश्यक पानी डालकर पूरा घोल बना लें व अच्छी तरह हिला लें। छिड़काव करते समय ध्यान रखें की हवा का रुख सामने से अपनी तरफ नहीं हो। गर्म मौसम व मिट्टी मे नम नमी की अवस्था मे पायरिथायोबेक सोडियम ३.१ % + पेन्डीमेथलीन ३४.० % जेड. सी. का उपयोग न करें। खरपतवार नियंत्रण की अवधि मिटटी और नमी की स्थिति निर्भर करती है।

छिड़काव का समय: बुवाई के १ से ३ दिन के भीतर, कपास के अंकुरण पूर्व (सुनिश्चित नमीं की अवस्था में) छिड़काव करें।

आवेदन तकनीक: छिड़काव ही करना चाहिए।

छिड़काव उपकरण व नोजल: फ्लॅट फैन/ फ्लड जेट नोजल लगे नैपसैक छिड़काव यंत्र।

सुरक्षा सावधानियाँ : १.खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें । २. मुँह, त्वचा और आंखों के संम्पर्क से बचायें । ३. प्रयोग करते समय सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें । हवा की दिशा में प्रयोग न करें ।४. प्रयोग के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोए । ५. प्रयोग के समय धूम्रपान, खाना पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए । ६. प्रयोग के समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहने ।

विषाक्तिकरण के लक्षण : विष लक्षण ज्ञात नहीं है । सिरदर्द, चक्कर आना ,मितली, उल्टी ,पसीना आना, अत्यधिक आँसू आना और लार टपकाना आदि हो सकते है।

प्राथमिक चिकित्सा : गिगले जाने पर: यदि मरीज व्यक्ति सजग और सतर्क है तो पानी से कुल्ला कराएं और १ या २ गिलास पानी पीने के लिये दें । बेहोस मरीज व्यक्ति को मुँह से कुछ ना दें । चिकित्सक को बुलायें । जब तक चिकित्सक की सलाह न हो मरीज व्यक्ति को उल्टी नहीं कराये। **सूंघे जाने पर:** मरीज व्यक्ति को ताजी हवा में ले जायें ओर उसके शरीर के तापमान का ध्यान रखें । मरीज व्यक्ति यदि सांस नहीं ले पा रहा हो या सांस लेने में कठिनाई हो तो मुँह से मुँह द्वारा कृत्रिम सांस दें । चिकित्सक की सलाह लें । **त्वचा के सम्पर्क आने पर:** प्रदूषित कपड़ों को उतार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबुन ओर पानी से अच्छी तरह धोयें । यदि दर्द, लाली अथवा जलन हो तो चिकित्सक को दिखायें। दूषित कपड़ों को अलग करें व दोबारा इस्तेमाल करने से पहले अलग से साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें । **आँख के सम्पर्क आने पर:** आंखों को १५ मिनट तक साफ पानी मे अच्छी तरह छपछपाये । यदि दर्द, लाली अथवा जलन हो तो चिकित्सक की सलाह लें ।

प्रतिकारक : कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है । लक्षणानुसार उपचार करें ।

पौध विषाक्तता : सुझायी गई मात्रा में कोई पौध विषाक्तता नहीं है।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. यह खरपतवारनाशक निर्माता व उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि वह डिब्बों या बचे हुए खरपतवारनाशक तथा साधनों के धोवन का निपटारा सुरक्षित ढंग से करे जिससे वातावरण या पानी प्रदूषित न हो। २. उपयोग किये गये डिब्बों को बाहर न फेंके जिससे उनका दुबारा प्रयोग न हो। ३.उपयोग किये गये डिब्बों को तोडकर आबादी से दूर जमीन में गाड़ दें।

खरपतवारनाशक के संग्रह हेतु निर्धारित शर्तें : १. खरपतवारनाशक रखे हुए डिब्बों/ पैकेजेस की अलग जगह या उन कमरों या जगहों जिसमें अन्य वस्तुएं रखी जाती हैं, उनसे दूर रखना चाहिए या अलग अलमारियों में ताल चाबी लगाकर खरपतवारनाशक की प्रमाण व प्रकार से हिसाब से रखें। २. डिब्बों का भंडारण तथा परिवहन इस प्रकार करें कि खाद्य पदार्थ या पशु आहार के संपर्क में न आये चूंकि यह उपलब्धीशेर है इसलिये आगे से दूर रखें। ३. जिस कमरे या अलमारी में खरपतवारनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सुखा, प्रकाशमय, हवादार तथा पर्याप्त आकार का होना चाहिये जिससे खरपतवारनाशक के भाप से वातावरण प्रदूषित होने का खतरा न रहे।

खुराक: ६४९.२५ – ७४२.०० ग्रा. स.त. /हे. (१.७५ – २.०० ली. /हे.संरचना)।

मिश्रण संबंधी निर्देश: निश्चित मात्रा में ली हुई खरपतवार नाशक को पहले थोड़े पानी में डाल कर घोल लें तत्पश्चात आवश्यक पानी डालकर पूरा घोल बना लें व अच्छी तरह हिला लें।

छिड़काव संबंधी निर्देश: छिड़काव करते समय ध्यान रखें की हवा का रुख सामने से अपनी तरफ नहीं हो।

उपयोग का समय निर्धारण: निर्धारित नहीं है। तेज हवा व बारिश होने की संभावना हो तो छिड़काव नहीं करना चाहिए।

फसल की अवस्था: कपास की फसल के अंकुरण पूर्व।

आवृत्ति जिसके अंतर्गत छिड़काव की अधिकतम संख्या: उपरोक्त अनुशंसा का संदर्भ से केवल एक आवेदन करें।

प्रस्थिति जिसके दौरान खरपतवारनाशक किसी फसल पर अनुपयुक्त नहीं होंगे : ऊपर दिए गए परामर्श का पालन करें।

पुनः प्रविष्टि: छिड़काव के २४ घंटो के बाद।

अंतिम छिड़काव ओर फसल की कटाई के बीच का अंतर: कपास १५२ दिन।

मौसम की स्थिति: खरपतवारनाशक का छिड़काव के समय मौसम साफ, शांत हो तथा बारिश व तेज हवा ना हो। गर्म मौसम और तथा मिट्टी में कम नमी की स्थिति में छिड़काव नहीं करना चाहिए।

मृदा व जल : मिट्टी की कोई विशिष्ट स्थिति निर्धारित नहीं है। छिड़काव के लिए साफ पानी का उपयोग किया जाना चाहिए।

सावधानी कथन : लेबल और पर्चों पर जो अभिदत है, उससे भिन्न अन्य फसलों में उपयोग के लिए नहीं है । यह उत्पाद मछली और जलीय जीवों के लिए बहुत विषैला होता है और इस प्रकार जल निकायों में और इसके आसपास इसके उपयोग से बचना चाहिए। उपयोग के बाद कंटेनर / खाली डिब्बे को पत्रक में दिए निर्देश के अनुसार नेष्ट कर दें। खाली डिब्बों का पुन : उपयोग खतरनाक है।

मॅक्सकॉट

पायरिथायोबेक सोडियम ३.१% व/व + पेन्डीमिथालीन ३४%व/व झेडसी

(तणनाशक)

(कृषि वापरासाठी)

पायरिथायोबेक सोडियम ३.१% व/व + पेन्डीमिथालीन ३४%व/व झेडसी हे एक तणनाशक फॉर्म्यूलेशन आहे ज्यामध्ये पायरिथायोबेक सोडियम ३.१% आणि पेन्डीमिथालीन ३४% सियाय अन्य आवश्यक सहाय्यक पदार्थ आहेत. ह्याचा उपयोग कपाशी मधिल व्यापक प्रभावी तणांच्या नियंत्रणासाठी केला जातो.

रासायनिक संरचना:	
प्रमाण :	**% व/व**
पायरिथायोबेक सोडियम स.त.	३.१०
पेन्डीमिथालीन स.त.	३४.००
लिग्नोसल्फोनिक ॲसिड सोडियम सॉल्ट	७.५५
पॉलीकन्डेन्सेट ऑफ सल्फोनेटेड अल्केल नेफ्थालीन सोडीयम सॉल्ट ॲण्ड फॉर्मलडीहाइड पॉलिमर	०.५०
पॉली फिनाइल हेक्साइल यूरिया	२.२१
झॅन्थम गम	०.०३
सिलिकॉन ॲन्टीफोम इमल्शन	०.३०
मिथाइल आइसोथायझोलिनोन आणि मिथाईल आईओसोथायाझोलिनोन सोल्युशनचे मिश्रण	०.१०
प्रोपलीन ग्लायकोल	१.५०
डीमिनरलाइज्ड वॉटर	क्यू. एस.
एकूण	१००

शिफारस:

पीक	तण प्रजाती	दर हेक्टरी प्रमाण स.त. (ग्रॅम/ग्रॅ)	दर हेक्टरी प्रमाण द्रावण (लीटर)	कापण्या साठी पाणी (लीटर)	शेवटची फवारणी ते कापणी मधिल वाट पाहण्याचा कालावधि दिवसात	पीकाचा टप्पा	पुनः प्रवेश काला वधी	वारंवारता
कपास	डिजिटेरिया सानगुइनलिस- क्रॅब ग्रास, कॉमेलिना बेंगालेन्सिस- ट्रोपिकल स्पाईडरवॉर्ट, ॲमॅरन्थस विरिडीस, ग्रीन ॲमॅरन्थ, पार्थेनियम हिस्टरफोरस, कॉंग्रेस ग्रास, सेलोसिया अर्जेन्टिआ- कॉकऱ्यांस	६४९.२५ - ७४२.२५	१.७५ - २.००	५००	१५२	बी पेरणीच्या १-३ दिवसांच्या आत	२४ तास	१

वापरासाठी निर्देश: तणनाशकाची आवश्यक मात्रा मोजा आणि थोडया प्रमाणात पाण्यात मिसळा. सांगितल्याप्रमाणे उरलेले पाणी पूर्ण पणे हलवाये. वाऱ्याकडे तोंड करून फवारणी करू नये. गरम ह्वामान आणि ओलावा तणावाच्या परिस्थितीत पायरिथायोबेक सोडियम ३.१% व/व + पेन्डीमिथालीन ३४%व/व झेडसी लागू करू नका. तण नियंत्रणाचा कालावधी आणि माती आणि आर्द्रतेवर अवलंबून असतो.

फवारणीचा कालावधि: बी पेरणीच्या १-३ दिवसांच्या आत अंकूरण पूर्वी (खात्रीशीर मातीचा ओलावा असलेल्या परिस्थितीत).

फवारणीचे टेक्निकस: फवारणीच केळी पाहिजे.

फवारणीची उपयुक्त आणि नोझल: हाई वॉल्यूम स्प्रेयर जसे, नॅपसॅक स्प्रेयर योग्य (फ्लॅट–फॅन/फ्लड जेट) नोझलसह.

सुरक्षा खबरदारी: १. अन्न पदार्थ व खाद्यान्य पासून दूर ठेवा. २. त्वचा व डोळे यांच्याशी संपर्क टाळा. ३. फवाऱ्याच्या वाफेचा श्वास घाला नका. ४. फवारणीनंतर दूषित कपडे व शरीराचे अवयव पाण्याने नीट धुवून टाका. ५. फवारणी करतानां धूम्रपान, खाणे पीणे करू नका किंवा काहीही चबाळू नका. ६.) हातालाणी करतानां संपूर्ण सुरक्षित कपडे घाला.

विषबाधेची लक्षण: कोणतेही खास विष लक्षण नाही. डोकेदुखणे, चक्कर, मळमळ, उल्टी, घाम येणे, जास्त अश्रु येणे आणि लाळ निर्माण होवू शकते.

प्रथमोपचार: जर गिळले गेल्यास: व्यक्ती शुध्दीवर असेल तर, पाण्याने तोंड स्वच्छ धुवा आणि १ किंवा २ ग्लास पाणी पिण्यास दया.व्यक्ती जर बेशुध्द असेल तर तोंडाद्वारे काहीही देवू नये. डॉक्टरला बोलवा.जोपर्यंत उपस्थित चिकित्सक द्वारे उल्टी करण्यास सांगितले जात नाही तो पर्यंत उल्टी करू नये. **जर श्वासाद्वारे आत गेल्यास:** रूग्णास मोकळ्या हवेत आणा आणि शरीर तापमानावर लक्ष ठेवा. जर रूग्ण श्वास घेत नसेल या श्वास घेण्यास जास त होत असेल तर कृत्रिम श्वसन द्या, शक्यतो तोंडाने तोंडास श्वासोच्छ्वास दया. चिकित्सकाचा सल्ला घ्या . **जर त्वचेशी संपर्क आल्यास:** शरीराशी संपर्क आलेला भाग साबण व भरपूर पाण्याने धुवा, यासह केस व नखे देखील धुवा, जर वेदना, लालसरपणा किंवा जळजळ कायम राहील्यास डॉक्टरचा सल्ला घ्या सर्व दूषित झालेले कपडे वेगवेगळे आणि वापर करण्यापूर्वी व्यवस्थित पणे साबण व पाण्याने वेगळे धुतले पाहिजेत. **जर डोळ्यांशी संपर्क झाल्यास:** तर डोळे भरपूर पाण्याने जवळ–जवळ १५ मिनिटे स्वच्छ धुवा, जर वेदना, जळजळ सहन होत नसेल लालसर पणा व प्रकाश अतिवेदन होत असेल तर नेत्र चिकित्सकाचा सल्ला घ्या.

विषरोधकता: कोणतही खास उपचार माहीत नाही, लक्षणानुसार उपचार करा.

पानांना विषारीपणा: शिफारस केलेल्या मात्रेत वापरलेअसता रोपांच्या पानांना विषारी नाही.

वापरलेल्या डब्यांची विल्हेवाट: १) निर्माता, उत्पादन बनविणाऱ्याचे आणि हाताळणाऱ्यांचे कर्तव्य आहे की पॅकेजिस किंवा उरलेले द्रावण किंवा मशीनीतील धाण/ पाणी यांची विल्हेवाट पर्यावरण किंवा पाण्या प्रदुषित होणार नाही आणि सुरक्षित पद्धतीने लावावी. २) पुन्हा कामासाठी वापरली जाऊ नयेत म्हणून रिकामी पॅकेजिस उद्ध्वस्थ टाकू नयेत. ३) रिकामी पॅकेजिस मोडून–तोडून वस्तीपासून दूर जागी जमिनीत खोल पुरावी.

साठवण : १. तणनाशक ठेवलेल्या पॅकेजीसना वेगळ्या खोलीत वा त्या खोलीत वा जागेत जिथे इतर वस्तू ठेवल्या जातात त्या पासून दूर ठेवले पाहिजे वा वेगळ्या कपाटात कुलूप चाबीत तणनाशकाच प्रमाण व प्रकाराच्या हिशोबाने ठेवावे. २. पॅकेजिसची साठवण आणि परिवहन अशा प्रकारे करावी की अन्य पदार्थ वा जनावरांच्या चाऱ्याशी संपर्क होव देव नका. कारण हे उत्कलशील आहे म्हणून आणी पासून दूर ठेवा.३. ज्या खोलीत वा कपाटात तणनाकाची साठवण करायची असेल ती मजबूत बांधणीची, भरपूर प्रकाशाची थंड आणि पूरशी ओबलंड असावी जेणे करून तणनाशकाच्या वाफेने वातावरण दूषित होण्याचा धोका होणार नाही.

प्रमाण: ६४९.२५–७४२.०० ग्रा स.त./ हेक्टर.(१.७५–२.०० लि./हेक्टर द्रावण.)

मिश्रण संबंधी निर्देश: तणनाशकाची आवश्यक मात्रा मोजा आणि थोडया प्रमाणात पाण्यात मिसळा. सांगितल्याप्रमाणे उरलेले पाणी पूर्ण पणे हलवून टाकाये. संपूणा शेतासाठी योग्य स्प्रेयर.

फवारणीच्या सुचना: वाऱ्याच्या दिशेने एकसमान फवारणी करा. तणांच्या संपूर्ण कव्हरेजची खात्री करा.

फवारणीचा कालावधि: कोणतेही बंधन नाही. पावसापूर्वी, सोसाट्याच्या वारा असेल तेव्हा फवारणी टाळा.

फवारणीसाठी पीकाची अवस्था: कपाशी पीकाची उगवण होण्यापूर्वी.

फवारणीच्या कमाल संख्येवरह वारंवारता: फक्त एक फवारणी वरील शिफारसी पहा.

कोणत्याही पिकावर कीटकनाशके फवारू नयेत अशी अवस्था: फक्त वरील शिफ्रस पहा.

पुन: प्रवेश कालावधी: २४ तासांनंतर

वेचणीपूर्व निर्देशांक (पीएचआई): कापूस– १५२ दिवस.

ह्वामानाची स्थिति: फवारणीच्या वेळी ह्वामान स्वच्छ, शांत असेल व पाऊस व सोसाटयाचा वारा नसेल. उष्ण ह्वामान आणि मातीत कमी दमट पणाच्या स्थितिस फवारणी करू नये.

माती आणि पाणी: मातीची कोणतीही विशेष स्थिती निर्धारित नाही.फवारणी साठी स्वच्छ पाण्याचा वापर केला गेला पाहिजे.

सावधगिरीचे विधान: १) लेबल आणि पत्रकांवर निर्देशित केलेल्या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरले जावू नये.२) हे उत्पादन मासे आणि जलचर जीवांसाठी खूपच विषारी असते आणि जल आणि त्याभुवती उपयोग करावा वापर पाण्याच्या साठयात आणि आसपास टाळावा.३) पत्रकावरील निर्देशानुसार वापरल्यानंतर डबे नष्ट करा. ४)रिकाम्या डब्यांचा पुर्नवापर धोकादायक आहे.

मेक्सकोट

पायरिथायोबेक सोडियम ३.१% भार /भार + पेन्डिमिथालिन ३४% भार /भार ॲडसी

(तिंडणाशक)

(कृषि उपयोग मटे)

पायरिथायोबेक सोडियम ३.१% भार /भार + पेन्डिमिथालिन ३४% भार /भार ॲडसी ओड तिंडणाशक फोर्म्यूलेशन जेथे पायरिथायोबेक सोडियम ३.१%असी पेन्डिमिथालिन ३४% असी इतर संबंधित साभग्रीओ सही समाविष्ट होय ते. हयाप्रमां पड़ोया पानगां तिंडणोने शिंयित्रित हदया मांटे आली उपयोग हदयांमां आये ते.

हामायाद्रिक मिश्रण:	
मात्रा :	**% भार/ भार**
पायरिथायोबेक सोडियम ए.आई.	३.१०
पेन्डिमिथालिन ए.आई.	३४.००
लिग्नोसल्फोनिक ॲसिड सोडियम मीठ	७.५५
सल्फोनेटेड आल्काईल नैप्थालीनचे पोलीकन्डेन्सेट सोडियम मीठ अने फोर्मलडिहाईडचे पोलीमर	०.५०
पोली फिनाईल हेक्सिल युरिया	३.३१
ॲक्थम गम	०.०३
सिलिकोन ॲन्टीफोम इमल्शन	०.३०
बेंझिसोथायझोलीनोन अने मिथाईल आईओसोथायाझोलिनोन सोल्युशनचे मिश्रण	०.१०
प्रोपायलीन ग्लायकोल	१.५०
डिमिनरलाईज्ड वोटर	पूइटी मात्रा
कुल	१००

भलामणो:

पाक	तिंडणाशी जातिओ	हेक्टर दीठ मात्रा स.ट. ग्राम	हेक्टर दीठ मात्रा द्राव (लीटर)	मंड पलावया पाणी ली.	तेहा गाम छंटवाणी उणुणी शुंपि प्रतिष्ठा गाळो (दिवसो)	पाकवा तबक्का	पुनः प्रवेश समय गाळो	भाग व्हया
ऽयाम	डिगेटेरिया सेंगुइनालिस- ऽंग घास, सेंबेलिया बेंगालेंसिस- ट्रोपिकल स्पाईडरवेऽर, ॲमेरेंनेस विरिडीस, ग्रीन ॲमेरेंथ, पार्थेनियम हिस्टरफोरेंसस, कोंग्रेस ग्रास, सेंलोसिया अर्जेन्टिआ- कॅऽऽोम	६४९.२५ - ७४२.००	१.७५ - ३.००	५००	१५२	पावणी पछी १-३ दिवसे	४४ ऽकाऽ पछी	१

उपयोगनी निर्देश : मिंडणाशाऽकनी आवश्यऽक मात्रा मापमां लो अने थोडी मात्राओं पाणी माथे भलेभर मिश्रण ऽरो. ह्येये सगत ह्लावयां रहीने मिर्डिंद अशुन्नार भाडी पाणी पण ऊमेरी शे. पवनणी दिशामां ह्लभमुभ रहीने छंटवाय नहीं ह्लरयो. गरम ह्वायामां अने ह्लेषनी पाणुणी स्थितिमां पायरिथायोबेक सोडियम ६% भार/ भार + ऽियोऽेलोशेथ ईथायोऽ ४% भार/ भार ओमर्ल्शनी छंटवाय नहीं ऽरो. मिंडणा मिंडांग्रणनुं प्रमाण अने मुऽत भाटी अने ह्लेषनी स्थिति पर आधार राये शे.

छंटवानो समय: पावणीना १-३ दिवसेमां ऊभरया पूर्व छंटवाय (आदीवाऽ भाटीनी नमीनी स्थितिमां).

छंटवानी टेऽनिऽ: छंटवाय पहीऽे ऊपयोग हदयो फोईजे.

छंटवानुं ऊपऽरण अने नोझऽ: हाई वोल्युम स्प्रेयर, नेपटो रे, योग्य नोऽझल साथे नैपसेऽ स्प्रेयर (ऽ्लेट ह्रेन/ ऽ्लड ऽेट) नोझल.

सुऽह्यानी सावचेतीओ: १. भाथ पऽडयाँ अने फोडाने ना मिश्रणथी दूऽ राखो. २. त्वचा अने आंख नो स्पर्ऽ टाळो. ३. छंटवायना प्रवाहीनी श्वासमां न लो. ४. छंटवाय पछी दूषित ऽपडां ऽाटीनां भागोने ल्हाभर धोई नाखो. ५. छंटवाय ऽरती वखते धूम्रपान ना ऽरो, ऽंईपणा खाओ,पीओ अथवा चावी नऽहि. ६. ह्लाश घेरती वखते संपूर्ण सुऽह्यात्मऽ ऽपडां पऽेरो.

ऽेरनां लक्षणो: ऽेरनां ऽोई फोक्ष्ऽस लक्षणो ज्ञात नथी. माथामां ऽर्ऽ, थक्ष्ऽ, ऊभऽा, ऊेतटी, पऽेसो, वधु पऽऽुं लागभग्याणा अने आंखमांथी आंसु ऊेभवी शके छे.

प्राथमिऽ सात्यात : **भो जणी ग्यावुं ह्येय तो :** व्यऽिती ह्लागमां ह्येय अने सगर्ऽ ह्येय तो, पाणी ऽे मोऽुं धूणो अने पाणी ऽे भरवा ने ल्हाल पाणी पाणी पीवा आपो. भेहुथ व्यऽिती ऽ्याथेय ऽंईपणा भें पाऽे ना आपयुं. डॉक्टरेनो बोलावो. साथवार आपणहा डॉक्टरनी ईच्छा ह्येय तो ह्लाय ऽरो. **जर ऽपडामां आऽ ह्येय तो :** ऽेरनां ऽपडां ऽाढी नाखो. **जर श्वासाद्वारे आत गेल्यास:** रूग्णाय मोकळ्या हवेत आणा आणि शरीर तापमानावर लक्ष ठेवा. जर रूग्ण श्वास घेत नसेल या श्वास घेण्यास जास होत असेल तर कृत्रिम श्वसन द्या, शक्यतो तोंडाने तोंडास श्वासोच्छ्वास दया. चिकित्सकाचा सल्ला घ्या . **जर त्वचेशी संपर्क आल्यास:** शरीराशी संपर्क आलेला भाग साबण व भरपूर पाण्याने धुवा, यासह केस व नखे देखील धुवा, जर वेदना, लालसरपणा किंवा जळजळ कायम राहील्यास डॉक्टरचा सल्ला घ्या सर्व दूषित झालेले कपडे वेगवेगळे आणि वापर करण्यापूर्वी व्यवस्थित पणे साबण व पाण्याने वेगळे धुतले पाहिजेत. **जर डोळ्यांशी संपर्क झाल्यास:** तर डोळे भरपूर पाण्याने जवळ–जवळ १५ मिनिटे स्वच्छ धुवा, जर वेदना, जळजळ सहन होत नसेल लालसर पणा व प्रकाश अतिवेदन होत असेल तर नेत्र चिकित्सकाचा सल्ला घ्या.

विषरोधकता: कोणतही खास उपचार माहीत नाही, लक्षणानुसार उपचार करा.

पानांना विषारीपणा: शिफारस केलेल्या मात्रेत वापरलेअसता रोपांच्या पानांना विषारी नाही.

वापरलेल्या ऽव्यांची विल्हेवाट: १) निर्माता, उत्पादन बनविणाऱ्याचे आणि हाताळणाऱ्यांचे कर्तव्य आहे की पॅकेजिस किंवा उरलेले द्रावण किंवा मशीनीतील धाण/ पाणी यांची विल्हेवाट पर्यावरण किंवा पाणी प्रदुषित होणार नाही आणि सुरक्षित पद्धतीने लावावी. २) पुन्हा कामासाठी वापरली जाऊ नयेत म्हणून रिकामी पॅकेजिस उद्ध्वस्थ टाकू नयेत. ३) रिकामी पॅकेजिस मोडून–तोडून वस्तीपासून दूर जागी जमिनीत खोल पुरावी.

साठवण : १. तणनाशक ठेवलेल्या पॅकेजीसना वेगळ्या खोलीत वा त्या खोलीत वा जागेत जिथे इतर वस्तू ठेवल्या जातात त्या पासून दूर ठेवले पाहिजे वा वेगळ्या कपाटात कुलूप चाबीत तणनाशकाच प्रमाण व प्रकाराच्या हिशोबाने ठेवावे. २. पॅकेजिसची साठवण आणि परिवहन अशा प्रकारे करावी की अन्य पदार्थ वा जनावरांच्या चाऱ्याशी संपर्क होव देव नका. कारण हे उत्कलशील आहे म्हणून आणी पासून दूर ठेवा.३. ज्या खोलीत वा कपाटात तणनाकाची साठवण करायची असेल ती मजबूत बांधणीची, भरपूर प्रकाशाची थंड आणि पूरशी ओबलंड असावी जेणे करून तणनाशकाच्या वाफेने वातावरण दूषित होण्याचा धोका होणार नाही.

प्रमाण: ६४९.२५–७४२.०० ग्रा स.त./ हेक्टर.(१.७५–२.०० लि./हेक्टर द्रावण.)

मिश्रण संबंधी निर्देश: तणनाशकाची आवश्यक मात्रा मोजा आणि थोडया प्रमाणात पाण्यात मिसळा. सांगितल्याप्रमाणे उरलेले पाणी पूर्ण पणे हलवून टाकाये. संपूणा शेतासाठी योग्य स्प्रेयर.

फवारणीच्या सुचना: वाऱ्याच्या दिशेने एकसमान फवारणी करा. तणांच्या संपूर्ण कव्हरेजची खात्री करा.

फवारणीचा कालावधि: कोणतेही बंधन नाही. पावसापूर्वी, सोसाट्याच्या वारा असेल तेव्हा फवारणी टाळा.

फवारणीसाठी पीकाची अवस्था: कपाशी पीकाची उगवण होण्यापूर्वी.

फवारणीच्या कमाल संख्येवरह वारंवारता: फक्त एक फवारणी वरील शिफारसी पहा.

कोणत्याही पिकावर कीटकनाशके फवारू नयेत अशी अवस्था: फक्त वरील शिफ्रस पहा.

पुन: प्रवेश कालावधी: २४ तासांनंतर

वेचणीपूर्व निर्देशांक (पीएचआई): कापूस– १५२ दिवस.

ह्वामानाची स्थिति: फवारणीच्या वेळी ह्वामान स्वच्छ, शांत असेल व पाऊस व सोसाट्याचा वारा नसेल. उष्ण ह्वामान आणि मातीत कमी दमट पणाच्या स्थितिस फवारणी करू नये.

माती आणि पाणी: मातीची कोणतीही विशेष स्थिती निर्धारित नाही.फवारणी साठी स्वच्छ पाण्याचा वापर केला गेला पाहिजे.

सावधगिरीचे विधान: १) लेबल आणि पत्रकांवर निर्देशित केलेल्या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरले जावू नये.२) हे उत्पादन मासे आणि जलचर जीवांसाठी खूपच विषारी असते आणि जल आणि त्याभुवती उपयोग करावा वापर पाण्याच्या साठय

மேக்ஸ்காட்

பைரிதியோபேக் சோடியம் 3.1% எ/எ + பெண்டிமிதலின் 34% எ/எ + இசட்சி (களைக்கொல்லி)

(வேளாண் பயன்பாட்டிற்கு)

பைரிதியோபேக் சோடியம் 3.1% எ/எ + பெண்டிமிதலின் 34% எ/எ இசட்சி களைக்கொல்லி தயாரிப்பில் பைரிதியோபேக் சோடியம் 3.1% + பெண்டிமிதலின் 34% இசட்சி மற்றும் பொருத்தமான மூலப்பொருள்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. பருத்தி,பயிரில் பயறுப்பட்டக்களைகளை அகற்ற இதைப் பயன்படுத்தலாம்.

இராசாயனச் சேர்க்கை: **அடக்கம்: (% எ/எ)**

பைரிதியோபேக் சோடியம் ஏ.ஐ.	3.10
பெண்டிமித்தலின் ஏ.ஐ.	34.00
லிகோனோல்ப்பேமோனிக்ஆசிட், சோடியம்சால்ட்	7.55
பாலிஆல்டன்சேட் ஆப்சல்ப்பேமோனேட் அல்கைல் நப்தலீன் சோடியம்சால்ட்-அண்ட்-பார்மல்டிஹைடுட் பாலிமர்	0.50
பாலி ப்பிரைன் ஹொக்லைம்ஸ் யூரியா	2.21
சிலாற்றுக்கம்	0.03
சிலிகான்ஆன்டி-ஃபோம் எமல்சன்	0.30
மிக்ஸன் ஆப் பென்றிஷியாஜோஸலினோன் அண்ட் மிதைல் ஐசோதியாஜோஸலினோன் சொல்யுஷன்	0.10
புரோபைலன்கிளைகோல்	1.50
டிஸ்டில்டு வாட்டர்	Q.S
மொத்தம்	100

பரிந்துரைகள்

பயிர்	களை வகைகள்	அளவு ஹெக்டேருக்கு - லிட்டர் (கிராம்)		கலவை தகவும்	களைகளின் தொகுப்பின் பிற்தோன்றல் அலுவலகம் வளர்ச்சியுக்கு நாட்கள்	அறுவடைக்கு முன்னான நாட்கள்	அடிக்கடி பயன்படுத்து
		லிட்டர் (கிராம்)		மாவின் அளவை % ஏஐ			
பருத்தி	புதிதாகவிள்ள சம்பகுமெல்லிட, கிராப் கிராஸ், கம்மலினா பெங்கலென்சிஸ், டிராகேல் லெப்டோக்லோவா, அமரந்தஸ் விரிடிஸ், கிரீன் அமரந்த், பார்தெனியம் ஹிஸ்டிரோபோரஸ், காங்கிரஸ் கிராஸ், செலோசியா அர்ஜென்டியா, காக்கொலப்	(60-140) (75-150)	1.0 1.25	500	152	1-3	24	1
அரிசி	நெல்லிலிருக்கும் ஆகாய தாமரை, ஈரமான நிலம் மற்றும் நீர்நிலைகளில் வளரும் அனைத்து களைகளை கட்டுப்படுத்தும்	649.25-742.00	1.75-2.00	500	152	பருத்தியுடன் 1-3 பிறகாக மாற்றம்	24 மாதங்கள்	1

பயன்படுத்தும் விதம்: சிறிதளவு தண்ணீரில் தேவையான அளவு களைக்கொல்லி மருந்தை சேர்த்து நன்றாகக் கலக்க வேண்டும். மீதுள்ள தண்ணீரை இந்தப் கரைசலுடன் சேர்த்து குலுக்கி குலுக்கி நன்றாகக் கலக்கி பயிர்கள் மீது வரும் நுனையும் அளவுக்குத் தேவையான கரைசலைத் தயாரித்துக்கொள்ள வேண்டும். காற்றுக்கும் திசையில் மருந்தை தெளிக்கக் கூடாது. பைரிதியோபேக் சோடியம் 6.0% எ/எ குறிஞ்சோடு,பேப்ப இதைல் 4% எ/எ எம்இதி மருந்தை வெப்பம் அதிகரித்திருக்கும் வாளிலையில் மற்றும் காற்றுக்கும் குறைந்தக்காற்றுக்கும் காலத்தில் தெளிக்கக் கூடாது. மண் மற்றும் காற்றுப்தத்தின் அளவைப் பொருத்து களைத் தாவரங்கள் கட்டுப்படுவதும் கட்டுப்படாகலாமும் ஆகவதும் நிகழும்.

பயன்படுத்தும் காலம்: விதைத்த தினத்திலிருந்து 1-3 நாட்களுக்குள் களைகள் வளரவிடும் எனர் தெளிக்க வேண்டும் (நிலத்தில் போதுமான காற்றுப்பம் இருக்க வேண்டும்).

மருந்து பயன்படுத்தும் முறை: இழைத் தெளிப்பாகப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

பயிர் பாதுகாப்பு கருவிகள் மற்றும் கூடிய எல்லை: அதிக கொள்ளளவு தெளிப்பான், அதாவது தாப்பாக் லம்பொயினில் பொருத்தமான கூடிய எல் பொருத்தப்பட்டது(துட்டை விசிரி) (வெள்ளப்பாவ்).

பாதுகாப்பு வெளைச்சிகளைக்காண்: 1. உணவு பண்டங்கள், வெற்று உணவு பாத்திரங்கள் மற்றும் கால் நடைகளுக்கு அப்பால் வைக்கவும். 2. வாயிலும், கண்களிலும் மற்றும் சருமத்திலும் படுவதை தவிர்க்கவும். 3. தெளிப்பு சாறுவை உட்கொள்ளக்கூடாது. காற்று வீசும் திசைவிலேயே தெளிக்கவும். 4. தெளிப்பு முடிந்த பின் மாசுபட்ட ஆடைகளையும், உடல் பாகங்களையும் நன்றாக கழுவவும். 5. மருந்துகுக்கும்போது, புகை பிடிக்கவோ, பருகவோ, உண்ணவோ மற்றும் மெல்லவோ கூடாது. 6. களைவை தயாரிக்கும் போதும், தெளிக்கும்போதும் முழு பாதுகாப்பான ஆடை,கண்ணாடியாவும்.

நச்சுப்பட்ட அறிகுறிகள்: குறிப்பிட்ட நச்சு பட்ட அறிகுறிகள் எதுவுமில்லை. தலைவலி, கிறுகிறுப்பு, தலைசுற்றல், குமட்டல், வாந்தி, வியர்வை பெருக்கம், கண்களில் நீர் வழிதல் மற்றும் அதிக உமிழ்நீர் சுரத்தல் ஆகியவை நிகழக்கூடும்.

மருந்துகள்: 1. பைரிதியோபேக் சோடியம் 3.1% எ/எ + பெண்டிமிதலின் 34% எ/எ + இசட்சி களைக்கொல்லி தயாரிப்பில் பைரிதியோபேக் சோடியம் 3.1% + பெண்டிமிதலின் 34% இசட்சி மற்றும் பொருத்தமான மூலப்பொருள்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. பருத்தி,பயிரில் பயறுப்பட்டக்களைகளை அகற்ற இதைப் பயன்படுத்தலாம்.

மருந்து பயன்படுத்தும் அளவு: ஒரு ஏக்கருக்கு 400 லிட்டர் தண்ணீரில் கரைத்து தெளிக்க வேண்டும். 2. தெளிப்பு முடிந்தவுடன் கருவியை சுத்தம் செய்யவேண்டும். கையிலையை வாய் வழியாக எதையும் கொடுக்கக் கூடாது. மருந்துவாசக் கூப்பிட வேண்டும். மருந்துவரின் மேற்பார்வை இல்லாமல் நோயாளியை வாந்தி எடுக்கத் தூண்டக் கூடாது.

கவனிக்கிறுகுறுகள்: நோயாளியை நல்ல காற்றோட்டமான இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்ல வேண்டும். உடைப்பட்டிருக்கக் கூடாது. ஒருவேளை நோயாளி சுவாசிக்கவில்லை அல்லது சுவாசிக்க சிரமப்படுகிறார் என்றால், வாயுடன் வாய் வழியாக ஊதி செயற்கை சுவாசம் கொடுக்கவேண்டும். மருந்து உதவியைப் பெற வேண்டும். **மருந்து குறுகத்தில் படுடிருந்தால்:** நன்றாகக் குலுக்கி வெளியிடுக. கொப்பு பொட்டு நிறைவாக தண்ணீர் ஊற்றிக் கொள்ளவேண்டும். நுக இடுக்குகள், உணவைத்தை மற்றும் நன்றாகச் கத்தும் செய்து குடிக்கவேண்டும். வலி, காண்டிதம் அல்லது உறுத்தல் உணர்வுகள் தொடர்ந்திருந்தால், மருத்துவரிடம் சிகிச்சையிற ஆலோசனை பெறவேண்டும். **நச்சுப்பட்ட அறிகுறிகள்:** குறிப்பிட்ட நச்சு பட்ட அறிகுறிகள் எதுவுமில்லை. தலைவலி, கிறுகிறுப்பு, தலைசுற்றல், குமட்டல், வாந்தி, வியர்வை பெருக்கம், கண்களில் நீர் வழிதல் மற்றும் அதிக உமிழ்நீர் சுரத்தல் ஆகியவை நிகழக்கூடும். **கலைகளி: விழுமங்கியிருக்கலாம்:** சோயாவி கயிலையைவுடன் விழிப்பட்டுள்ள மற்றும் மெல்லவோ கூடாது. 6. லைவை தயாரிக்கும் போதும், தெளிக்கும்போதும் முழு பாதுகாப்பான ஆடைகளை அணியவும்.

நச்சுப்பட்ட அறிகுறிகள்: குறிப்பிட்ட நச்சு பட்ட அறிகுறிகள் எதுவுமில்லை. தலைவலி, கிறுகிறுப்பு, தலைசுற்றல், குமட்டல், வாந்தி, வியர்வை பெருக்கம், கண்களில் நீர் வழிதல் மற்றும் அதிக உமிழ்நீர் சுரத்தல் ஆகியவை நிகழக்கூடும்.

கலைகளி: விழுமங்கியிருக்கலாம்: சோயாவி கயிலையைவுடன் விழிப்பட்டுள்ள மற்றும் மெல்லவோ கூடாது. 6. லைவை தயாரிக்கும் போதும், தெளிக்கும்போதும் முழு பாதுகாப்பான ஆடைகளை அணியவும்.

தலுதுகள்: விழுமங்கியிருக்கலாம்: சோயாவி கயிலையைவுடன் விழிப்பட்டுள்ள மற்றும் மெல்லவோ கூடாது. 6. லைவை தயாரிக்கும் போதும், தெளிக்கும்போதும் முழு பாதுகாப்பான ஆடைகளை அணியவும்.

மேக்ஸ்காட்

பைரிதியோபேக் சோடியம் 3.1% எ/எ + பெண்டிமிதலின் 34% எ/எ + இசட்சி

(களைக்கொல்லி)

(ஏகீர்நாசினி)

(कृषि उपयोगिता)

பைரிதியோபேக் சோடியம் 3.1% ஏஐ/ஏஐ + பெண்டிமிதலின் 34% ஏஐ/ஏஐ + பெண்டிமிதலின் 34% மற்றும் பயிர் சம்பந்தப்பட்ட பொருள்களுடன் உள்ளடக்கியுள்ள கலவை. பருத்தி பயிரில் பயறுப்பட்ட களைகளை அகற்ற இதைப் பயன்படுத்தலாம்.

மாதாமயின் சம்மேளனம்:

஘ாயனங்ப: % ஏஐ/ஏஐ

பைரிதியோபேக் சோடியம் ஏ.ஐ.	3.10
பெண்டிமித்தலின் ஏ.ஐ.	34.00
லிகோனோல்ப்பேமிக்ஆசிட், சோடியம்சால்ட்	7.55
பாலிஆல்டன்சேட் ஆப்சல்ப்பேமோனேட் அல்கைல் நப்தலீன் சோடியம்சால்ட்-அண்ட்-பார்மல்டிஹைடுட் பாலிமர்	0.50
பாலி ப்பிரைன் ஹொக்லைம்ஸ் யூரியா	2.21
சிலாற்றுக்கம்	0.03
சிலிகான்ஆன்டி-ஃபோம் எமல்சன்	0.30
மிக்ஸன் ஆப் பென்றிஷியாஜோஸலினோன் அண்ட் மிதைல் ஐசோதியாஜோஸலினோன் சொல்யுஷன்	0.10
புரோபைலன்கிளைகோல்	1.50
டிஸ்டில்டு வாட்டர்	Q.S
மொத்தம்	100

பரிந்துரைகள்

பயிர்	களை வகைகள்	அளவு		கலவை	களைகளின் தொகுப்பின் பிற்தோன்றல் அலுவலகம் வளர்ச்சியுக்கு நாட்கள்	அறுவடைக்கு முன்னான நாட்கள்	அடிக்கடி பயன்படுத்து
		லிட்டர் (கிராம்)		மாவின் அளவை % ஏஐ			
பருத்தி	நெல்லிலிருக்கும் ஆகாய தாமரை, ஈரமான நிலம் மற்றும் நீர்நிலைகளில் வளரும் அனைத்து களைகளை கட்டுப்படுத்தும்	649.25-742.00	1.75-2.00	500	152	பருத்தியுடன் 1-3 பிறகாக மாற்றம்	24 மாதங்கள்	1
ஆரிசி	(ரிஸிகிரிரிரிரி ஹைலாரிஸ் ஹைலாரிஸ்) ஸ்கொக்ஸ் (ஸ்கொக்ஸ்லிசிஸ்) ஸ்ரீ ஜாமாஸ்ரூ, ஆயுமுறுஜான் ஸிமிஸ் - ஜாம் ஆயுமுறுஜான், ஜாஜுஸ்ரூயான் ஆஸ்ரமுப்ப, ஜாஜுஸ்ரூயான் ஸ்ரீமுஸ்ரூயான், ஜாஜுஸ்ரூயான் ஸ்ரீமுஸ்ரூயான் - ஜாம் ஆயுமுறுஜான் ஸ்ரீம