Pesticide for agriculture use

Oryzon

Flubendiamide 39.35% m/m SC

(Insecticide)

Flubendiamide 39.35% m/m SC contains 393.5g of Flubendiamide active ingredient per kg of formulation, which is equal to 480 g of Flubendiamide active ingredient per litre of Formulation. Flubendiamide 39.35% SC is recommended for control of American Bollworm & spotted Bollworm of cotton, Stem borer and Leaf folder in Rice, fruit borer in tomato and Diamond back moth of cabbage, pod borers in pigeon pea, black gram and Bengal gram, fruit borers in chilli and shoot & fruit borer in brinjal.

Recommendation:

Crop(s)	Common name of pest	Dosage/ha			Waiting period between last spray to harvest (days)
		AI (gram)	Formulation (ml)	Dilution Water (Litres)	
Pigeon Pea	Pod borers (Helicoverpa armigera and Maruca Sp.)	48	100	500	10
Black gram	Pod borers (Helicoverpa armigera and Maruca Sp.)	48	100	500	10
Cotton	Bollworms (American Bollworm and spotted Bollworm)	48-60	100-125	375-500	25
Bengal gram	Pod borer	48	100	500	5
Tomato	Fruit borer	48	100	375-500	5
Rice	Stem Borer, Leaf folder	24	50	375-500	40
Cabbage	Diamond back moth	18-24	37.5-50	375-500	7
Brinjal	Shoot and fruit borer	72-90	150-187.5	500	5
Chilli	Fruit borer (Helicoverpa armigera and Spodoptera Sp.)	48-60	100-125	500	7

Caution: Not to be used on crops other than specified on this Label/ Leaflet.

Direction of Use : Hand operated Knapsack sprayer fitted with hollow cone or triple action nozzles are recommended for spraying.

Precaution : Handle with care. Do not touch or inhale the contents. While handling the contents use rubber gloves and face mask.

Symptoms of Poisoning : Diarrhoea observed.

First Aid : If the chemical is inhaled, get the victim into fresh air immediately. If breathing has stopped, apply artificial respiration. If swallowed, do not induce vomiting, wash mouth with water. If the chemical has splashed into the eyes, flush eyes with plenty of cold water. In case of skin contact, wash the skin with soap and plenty of water call a physician immediately.

Antidote : There is no known specific antidote. Follow attached directions. Treat symptomatically.

Disposal of used container : 1. The packages shall be broken and buried away from habitation or incinerated. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages or surplus material and washing should be disposed off in safe manner so as to prevent environment and water pollution.

Storage conditions : 1. The packages containing the insecticide shall be store in separate rooms or premises, away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticide. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticides shall be well built, well lit, dry, well ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour/air.

Chemical Composition:

Flubendiamide Active Ingredient	39.35% m/m
Ethoxylated tristyryl phenol	1.00% m/m
Co-polymer of acrylic acid glycol derivative	3.00% m/m
Glycerin	10.00% m/m
Xanthane gum, aqueous solution	12.00% m/m
Blend of isothiozolone & its chloro derivative	0.08% m/m
Sodium salt of Benzisothiazol-3(2H)-one in propanol & water	0.12% m/m
Aqueous solution of Polydimethyl siloxane	0.10% m/m
Water, demineralised	Balance% m/m
Total :	**100.000% m/m**

कृषि उपयोग के लिए कीटनाशक

ओरीजोन

फ्लुबेनडाईअमाईड ३९.३५% भार/भार एस.सी.

(कीटनाशक)

फ्लुबेनडाईअमाईड ३९.३५% भार/भार एस.सी. में ३९३.५ ग्राम फ्लुबेनडाईअमाईड सक्रिय तत्व समाहित है, जो ४८० ग्राम फ्लुबेनडाईअमाईड सक्रिय तत्व प्रति लीटर फार्मुलेशन के समान है। फ्लुबेनडाईअमाईड ३९.३५% भार/भार एस.सी. का उपयोग कपास में आने वाले अमेरिकन सुंडी और चितकबरी सुंडी, धान में आने वाले तना छेदक और पत्ता लपेट सुंडी, टमाटर में आने वाले फल छेदक, बंद गोभी में आने वाले हिरा पीठ पतंगे, अरहर, उडद और चना में आने वाले फली छेदक, मिर्च में आने वाले फल छेदक और बैंगन के तना व फल छेदक की रोकथाम के लिए किया जाता है।

अनुशंसा:

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा			आखिरी छिड़काव एवं फसल काटने के बीच अंतराल (दिनों में)
		स. तत्व (ग्राम)	संरचना (मि.ली.)	पानी की मात्रा (लीटर)	
अरहर	फली छेदक (हैलीकोवहरपा आर्मीजेरा और मारुका स्पीशीज़)	४८	१००	५००	१०
उडद	फली छेदक (हैलीकोवहरपा आर्मीजेरा और मारुका स्पीशीज़)	४८	१००	५००	१०
कपास	अमेरिकन सुंडी और चितकबरी सुंडी	४८-६०	१००-१२५	३७५-५००	२५
चना	फली छेदक	४८	१००	५००	५
टमाटर	फल छेदक	४८	१००	३७५-५००	५
धान	तना छेदक और पत्ता लपेट सुंडी	२४	५०	३७५-५००	४०
बंद गोभी	हीरा पीठ पतंगा	१८-२४	३७.५-५०	३७५-५००	७
बैंगन	तना व फल छेदक	७२-९०	१५०-१८७.५	५००	५
मिर्च	फल छेदक (हैलीकोवहरपा आर्मीजेरा और स्पोडोप्टेरा स्पीशीज़)	४८-६०	१००-१२५	५००	७

सावधान : इस लेबल/लीफ़लेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें।

उपयोग के लिए निर्देश : हाथ से चलाने वाले नैपसेक स्प्रेयर जिसमें होलोकोन या ट्रिपल एक्शन नोजल लगा हो उसका उपयोग करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : रसायन में सावधानी बरतें। इसे न तो छुए और न ही सांस से भीतर जाने दीजिए। रसायन के रखने में रबर के दस्ताने और मुखौटा इस्तेमाल करें।

विष के लक्षण : दस्त के लक्षण पाए गए।

प्राथमिक चिकित्सा : कीटनाशक श्वास द्वारा अंदर गयी हो तो, मरीज को तुरंत खुली हवा में लें जाइए। श्वास रुकने लगी हो तो कृत्रिम श्वासोच्छ्वास का इस्तेमाल करें। कीटनाशक पेट में निगल गया हो तो, उल्टी न कराएए, मुंह को पानी से धोइए। कीटनाशक आँखों में जाने पर, आँखे ठण्डे पानी से धोइए। कीटनाशक का त्वचा के साथ सम्पर्क होने पर, त्वचा साबुन और पानी से धो लें। तुरन्त डॉक्टर को बुलाए।

विषनाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक ज्ञात नहीं है। संलग्न आदेशों का पालन कीजिए। लक्षणानुसार उपचार करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. खाली डिब्बों को जानवरों तथा इन्सान के रहने वाली जगह से दूर नष्ट करें तथा जमीन में गाड दीजिए या इन सिनरेटर में जला दें। २. खाली डिब्बों को बाहर न रखिए ताकि दुबारा इस्तेमाल न हो सके। ३. डिब्बों, बचे हुए कीटनाशक तथा धोवन को सावधानी से एक तरफ फेंके ताकि वातावरण या पानी दुषित न हो।

संग्रहण की शर्तें : १. कीटनाशक के डिब्बों का भंडारण अलग कमरे में, या परिसरों में जो कि दूसरी चीजों के भंडारण हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले कमरों या परिसरों से दूर हो, में किया जाना चाहिए अथवा अलग अल्मारियों में ताला लगा कर रखा जाना चाहिए। २. कीटनाशकों के भंडारण हेतु बने कमरे या परिसर अच्छी तरह बने हुए हो, अच्छी रोशनीदार, सूखे, पर्याप्त बड़े होने चाहिए ताकि वाष्प/हवा के साथ प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न न हो।

रासायनिक संरचना :

फ्लुबेनडाईअमाईड सक्रिय तत्व	३९.३५% भार/भार
ईथॉक्सिलेटेड ट्राईस्टाइरील फिनॉल	१.००% भार/भार
कोपोलीमर ऑफ एक्रेलिक एसिड लाईकोल डेरिवेटिव	३.००% भार/भार
ग्लीसरीन	१०.००% भार/भार
झैनथेन गम, पानी में द्रावण	१२.००% भार/भार
मिश्रादल आइसोथायोझोलोन और इसके क्लोरोडेरिवेटीव का मिश्रण	०.०८% भार/भार
सोडियम सॉल्ट ऑफ बेन्झाइझसोथायोझोल-३(२-एच) -वन-(प्रोपेनॉल और पानी में)	०.१२% भार/भार
पोलीडायमिथाईल सिलोक्सेन का पानी में घोल	०.१०% भार/भार
पानी, डिमिनरलाईजड्	बाकी% भार/भार
योग	**१००.००० % भार/भार**

శెతివారాసరాయితి కీటనాశక

ఓరిజోన్

ఫ్లుబెన్డిఅమైడ్ ౩౯.౩౫% మ/మ ఎससी

(కీటకనాశక)

ఫ్లుబెన్డిఅమైడ్ ౩౯.౩౫% మ/మ ఎससी లో ఒక్క లిటర్ ఫార్ములేషన్ కి ౪౮౦ గ్రాం ఫ్లుబెన్డిఅమైడ్ సక్రియ పదార్థం కి సమానమైన ౩౯౩.౫ గ్రా ఫ్లుబెన్డిఅమైడ్ సక్రియ పదార్థం ఉన్నది. ఫ్లుబెన్డిఅమైడ్ ౩౯.౩౫% ఎससी కి శిफారసు కాయితీరిలో అమెరికన్ బోల్వర్మ్ మరియు చిత్రవర్మి బోల్వర్మ్, వరిలో కాండం తొలుచు పురుగు మరియు ఆకు ముడతకు, టొమాటోలో పచ్చ కాయ తొలుచు పురుగు పచ్చిబఠాణి పచ్చ పురుగు, శనగలో పచ్చ పురుగు, మిరపలో పచ్చ పురుగు మరియు వంకాయలో పచ్చ కొమ్మ మరియు కాయ తొలుచు పురుగుల నివారణకు వాడుకోవడానికి సిఫారసు చేయబడినది.

భలామాట :

పంట (పంటలు)	కీటకాలు సాధారణ నామం	మోతాదు/హెక్టర్			తొలగు దశకుముందు రసాయనపు స్ప్రేకు మధ్యలో అవధి (రోజులు)
		సా.మ. (గ్రామ్)	సంరచన (మి.లి.)	నిశ్రమ నీరు పాలీ (లీటర్)	
కందులు	కాయ తొలిచే పురుగు (హెలికోవర్పా ఆర్మిజెరా మరియు మెరుకా సెలాన్.)	४८	१००	५००	१०
మినుము	కాయతొలుచు పురుగు (హెలికోవర్పా ఆర్మిజెరా మరియు మెరుకా జాతి.)	४८	१००	५००	१०
పత్తి	కాయతొలుచు పురుగు (అమెరికన్ బోల్వర్మ్ మరియు చిత్రవర్మి బోల్వర్మ్)	४८-६०	१००-१२५	३७५-५००	२५
శనగలు	కాయ తొలిచే పురుగు	४८	१००	५००	५
టొమాటో	కాయ తొలుచు పురుగు	४८	१००	३७५-५००	५
వరి	కాండం తొలుచు పురుగు, ఆకుముడత	२४	५०	३७५-५००	४०
క్యాబేజీ	డైమండ్ బ్యాక్ మాత్	१८-२४	३७.५-५०	३७५-५००	७
వంకాయ	కొమ్మ మరియు కాయ తొలుచు పురుగు	७२-९०	१५०-१८७.५	५००	५
మిరప	కాయ తొలిచే పురుగు మరియు స్పోడ్ పురుగు (హెలికోవర్పా ఆర్మిజెరా మరియు స్పోడోప్టెరా స్పీషీస్)	४८-६०	१००-१२५	५००	७

హెచ్చరిక : ఈ లేబుల్/కరపత్రంలో నిర్దిష్టంగా పేర్కొనబడిన పంటలు కాకుండా వేరే పంటల్లో ఉపయోగించరాదు

ఉపయోగించాల్సిన నిర్దేశాలు : చేతితో నడిపే నేప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, హాలో కోన్ లేదా ట్రిపుల్ ఎక్షన్ నోజుల్ లగాడిలతో హస్తసంచాలిత నేప్‌సాక్ స్ప్రేయరు తప్పకుండా వాడాలి నిపుణుల సిఫారసు చేయబడుతున్నది

మీరుండాల్సిన జాగ్రత్తలు : జాగ్రత్తగా ఉపయోగించండి. లోపల ఉన్న పదార్థాలను ఆకర్షిస్తు లేదా పీల్చవద్దు. పదార్థాలను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు రబ్బరు చేతి తొడుగులు మరియు ముఖానికి ముసుగు ధరించాలి.

విషప్రక్రియ యొక్క లక్షణాలు : అతిసారం కలిగినట్టుగా గమనించబడింది.

ప్రథమిక చికిత్స : రసాయనాన్ని కనుక పీల్చినట్లయితే, రోగిని వెంటనే ఆశా గాలిలోకి తీసుకుని రావాలి. ఊపిరి ఆగితే, కృత్రిమంగా ఊపిరితిత్తులకు వేయాలి. మింగినట్లయితే, వాంతి చేసుకోమని ప్రోత్సహం చేయవద్దు, నోటిని నీటితో కడగాలి. దగ్గరికి సంరక్షుడుకుడి, వర్మాన్ని నెట్టు మరియు పెచ్చుంగా నీళ్లతో కడగాలి. దద్దురును వెంటనే పరీక్షించాలి.

విరుగుడు : తెలిసిన నిర్దిష్టమైన విరుగుడు ఏదీ లేదు. జతపరచబడిన సిఫారసులను అనుసరించాలి. లక్షణాను బట్టి చికిత్స చేయాలి.

వాడిన పాత్రల పై జరుగుతుంది : 1. పాత్రలను దగ్గరగొట్టాలి మరియు మనుష్యనివాసం లేని చోట పాతిపెట్టాలి లేదా కాల్చివేయాలి 2. వాడిన పాత్రలు వాడిన తరిగి ఉపయోగించకుండా ఉండడానికి బయట పడకుండ్లుగా ఉండాలి. 3. పాత్రలు లేదా మిగిలిన పదార్థాలు మరియు కడిగిన నీరు పర్యావరణం పై పదార్థాలు పాడ్కరుండ కుండా సురక్షితంగా పారవేయాలి.

నిల్వ స్థితిలు : 1. కీటకాలకు సంబంధించిన పాత్రలు ప్రత్యేక గదులు లేదా ఇతర వస్తువులు నిల్వ చేసే గదులు లేదా ప్రత్యేకంగా లాక్ చేయబడిన ఉండే చోట అల్మారాలలో, పరిమాణం మరియు క్రిమినాశకాలకి సంబంధించిన స్వభావాన్ని బట్టి. నిల్వచేయడం. 2. పురుగుమందులను నిల్వ ఉంచే గదులు బాగా నిర్మించి ఉండాలి, బాగా వెలుతురు వచ్చేలా, గాలి ఆడుతుండేలా, పొడిగా మరియు బాగా గాలివచ్చేలా ఉండాలి మరియు ఆవిరుల కోసం కలుతుకోకుండా ఉండాలి, బాగా పెద్దదిగా కలుపుకోవలసినదిగా ఉండాలి.

రసాయనిక సంరచన :

ఫ్లుబెన్డిఅమైడ్ సక్రియ పదార్థం	३९.३५% भार/भार
ఎథెక్సిలేటెడ్ ట్రయిస్టిరిల్ ఫెనోల్	१.००% भार/भार
యాక్రిలిక్ ఆసిడ్ గ్లైకాల్ డెరివేటివ్ కి కో-పాలిమర్	३.००% भार/भार
గ్లిసరిన్	१०.००% भार/भार
జాంథన్ గమ్, అక్వియస్ ద్రావణం	१२.००% भार/भार
ఐసోథియోజోలోన్ మరియు దాని క్లోరో డెరివేటివ్స్ మిశ్రమం	०.०८% भार/भार
ప్రొపానోల్ మరియు నీటిలో బెంజిసోథియాజోల్-3 (2హెచ్) - పనుగ్ సోడియం సోల్ట్	०.१२% भार/भार
పాలీడైమెథైల్ సిలోక్సేనుగ్ జలీయ ద్రావణం	०.१०% भार/भार
పాలీ (డిమినెరలైజ్డ్)	బాకీ% भार/भार
మొత్తం :	**१००.००० % भार/भार**

కృషి ఉపయోగ కొరకు క్రిమినాశక

ఓరిజోన్

ఫ్లుబెన్డియామైడ్ ౩౯.౩౫% ఎమ్/ఎమ్ ఎससी

(కీటకనాశక)

ఫ్లుబెన్డియామైడ్ ౩౯.౩౫% ఎమ్/ఎమ్ ఎससी లో ప్రతి కిలోకు ఫ్లుబెన్డియామైడ్ సక్రియ పదార్థం ౩౯౩.౫ గ్రా. ఉన్నది, ఇది ఫార్ములేషన్ లీటరుకు ౪౮౦ గ్రా. ఫ్లుబెన్డియామైడ్ సక్రియ పదార్థానికి సమానం. ఫ్లుబెన్డియామైడ్ ౩౯.౩౫% ఎससी పత్తిలో అమెరికన్ బోల్వర్మ్ మరియు చిత్రవర్మి బోల్వర్మ్, వరిలో కాండం తొలుచు పురుగు మరియు ఆకు ముడతకు, టొమాటోలో పచ్చ కాయ తొలుచు పురుగు పచ్చిబఠాణి పచ్చ పురుగు, శనగలో పచ్చ పురుగు, మిరపలో ఫలం పచ్చ పురుగు మరియు వంకాయలో పచ్చ కొమ్మ మరియు కాయ తొలుచు పురుగుల నివారణకు అదుపు చేయడానికి సిఫారసు చేయబడినది.

సిఫారసులు :

పంట(లు)	పేరు సాధారణ పేరు	మోతాదు/ హెక్టారు			చివరి పిచికారీ మరియు పంట కోతకు మధ్య వేచి ఉండవలసిన సమయం (రోజులలో)
		ఎ.ఐ (గ్రా)	సంరచన (మి.లి)	ఎంత నీటిలో కలపాలి (లీ)	
కందులు	కాయ తొలిచే పురుగు (హెలికోవర్పా ఆర్మిజెరా మరియు మెరుకా ఎస్పి.)	48	100	500	10
మినుము	కాయతొలుచు పురుగు (హెలికోవర్పా ఆర్మిజెరా మరియు మెరుకా జాతి.)	48	100	500	10
పత్తి	కాయ తొలిచే పురుగు (అమెరికన్ బోల్వర్మ్ మరియు చిత్రవర్మి బోల్వర్మ్)	48-60	100-125	375-500	25
శనగలు	కాయ తొలిచే పురుగు,	48	100	500	5
టొమాటో	కాయ తొలుచు పురుగు	48	100	375-500	5
వరి	కాండం తొలుచు పురుగు, ఆకుముడత	24	50	375-500	40
క్యాబేజీ	డైమండ్ బ్యాక్ మాత్	18-24	37.5-50	375-500	7
వంకాయ	కొమ్మ మరియు కాయ తొలుచు పురుగు	72-90	150-187.5	500	5
మిరప	కాయ తొలిచే పురుగు మరియు స్పోడ్ పురుగు (హెలికోవర్పా ఆర్మిజెరా మరియు స్పోడోప్టెరా ఇతరులు)	48-60	100-125	500	7

హెచ్చరిక : ఇచ్చిన లేబుల్/లీఫ్‌లెట్‌లో పేర్కొనబడిన పంటలకు తప్పిస్తు వేరు పంటలకు దీన్ని ఉపయోగించకూడదు

ఉపయోగించవలసిన నిర్దేశాలు : చేతితో నడిపే నేప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, హాలో కోన్ లేదా ట్రిపుల్ ఎక్షన్ నోజిల్స్ తో ఆమోదించబడినది

జాగ్రత్తలు : జాగ్రత్తగా ఉపయోగించండి. లోపల ఉన్న పదార్థాలను ఆకర్షిస్తు లేదా పీల్చవద్దు. పదార్థాలను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు రబ్బరు చేతి తొడుగులు మరియు ముఖానికి ముసుగు ధరించాలి.

విషప్రక్రియ లక్షణాలు : అతిసారం కలిగినట్టుగా గమనించబడింది.

ప్రథమ చికిత్స : రసాయనాన్ని కనుక పీల్చినట్లయితే, రోగిని వెంటనే ఆశా గాలిలోకి తీసుకుని రావాలి. ఊపిరి ఆగితే, కృత్రిమంగా ఊపిరితిత్తులకు వేయాలి. మింగినట్లయితే, వాంతి చేసుకోమని ప్రోత్సహం చేయవద్దు, నోటిని నీటితో కడగాలి. కళ్ళలో చికాకు కలిగితే, పుష్కలంగా నీళ్ళతో కడగాలి. చర్మానికి సంపర్కమయితే, చర్మాన్ని సబ్బు మరియు పుష్కలంగా నీళ్లతో కడగాలి. దద్దురును వెంటనే పరీక్షించాలి.

విరుగుడు : తెలిసిన నిర్దిష్టమైన విరుగుడు ఏదీ లేదు. జతపరచబడిన సిఫారసులను అనుసరించాలి. లక్షణాను బట్టి చికిత్స చేయాలి.

వాడిన పాత్రల పై జరుగుతుంది : 1. పాత్రలను దగ్గరగొట్టాలి మరియు మనుష్యనివాసం లేని చోట పాతిపెట్టాలి లేదా కాల్చివేయాలి 2. వాడిన పాత్రలు వాడిన తరిగి ఉపయోగించకుండా ఉండడానికి బయట పడకుండ్లుగా ఉండాలి. 3. పాత్రలు లేదా మిగిలిన పదార్థాలు మరియు కడిగిన నీరు పర్యావరణం పై పదార్థాలు పాడ్కరుండ కుండా సురక్షితంగా పారవేయాలి.

నిల్వ స్థితులు : 1. క్రిమినాశకాలకి సంబంధించిన పాత్రలను ఇతర వస్తువులను ప్రత్యేకంగా పెట్టబడ్డ గదులు లేదా ఇతరులు నిల్వ చేసే గదులు లేదా ప్రత్యేకంగా లాక్ చేయబడిన ఉండే చోట అల్మారాలలో, పరిమాణం మరియు క్రిమినాశకాలకి సంబంధించిన స్వభావాన్ని బట్టి. నిల్వచేయడం. 2. పురుగుమందులను నిల్వ ఉంచే గదులు బాగా నిర్మించి ఉండాలి, బాగా వెలుతురు వచ్చేలా, గాలి ఆడుతుండేలా, పొడిగా మరియు బాగా గాలివచ్చేలా ఉండాలి మరియు ఆవిరుల కోసం కలుతుకోకుండా ఉండాలి, బాగా పెద్దదిగా కలుపుకోవలసినదిగా ఉండాలి.

రసాయనిక సంరచన :

ఫ్లుబెన్డియామైడ్ సక్రియ పదార్థం	39.35% ఎమ్/ఎమ్
ఎథాక్సిలేటెడ్ ట్రయిస్టిరిల్ ఫెనోల్	1.00% ఎమ్/ఎమ్
కో-పాలిమర్ ఆఫ్ ఆక్రిలిక్ ఆసిడ్ గ్లైకాల్ డెరివేటివ్	3.00% ఎమ్/ఎమ్
గ్లిసరిన్	10.00% ఎమ్/ఎమ్
క్సాంథాన్ గమ్, అక్వియస్ ద్రావణం	12.00% ఎమ్/ఎమ్
ఐసోథియాజోలోన్ మరియు దాని క్లోరో డెరివేటివ్ మిశ్రమం	0.08% ఎమ్/ఎమ్
సోడియమ్ సాల్ట్ ఆఫ్ బెంజిసోథియాజోల్-3 (2హెచ్) - ఒకటి ప్రానాల్ మరియు నీటిలో ఒకటి	0.12% ఎమ్/ఎమ్
పాలీడైమెథైల్ సిలోక్సెనుగ్ యొక్క అక్వియస్ ద్రావణం	0.10% ఎమ్/ఎమ్
నీరు, డీమినరైలజ్డ్ చేయబడినది	మిగిలిన 96% ఎమ్/ఎమ్
మొత్తం :	**100.000% ఎమ్/ఎమ్**

வுவசாயப் பயன்பாட்டுக் பூச்சிக்கொல்லி

ஓரைஜான்

ஃப்ளுபென்டியமைடு 39.35% எ/எ எஸ்சி

(பூச்சிக்கொல்லி)

ஃப்ளுபென்டியமைடு 39.35% எ/எ எஸ்சி கலவை கிலோ ஒன்றுக்கு தீவிர மூலப்பொருள் ஃப்ளுபென்டியமைடு 393.5 கிராம் அடங்கியுள்ளது. இது கலவை லிட்டர் ஒன்றுக்கு ஃப்ளுபென்டியமைடு 480 கிராம் தீவிர மூலப்பொருளுக்கு சமமானது. ஃப்ளுபென்டியமைடு 39.35% எஸ்சி, பருத்தி வெடி புழு சிறுகாய் துளைப்பான் மேலும் சிறகி வெடி காண்ட கொலை புழுவை மற்றும் ஈசா மடிக்கை, வெண்டிகாய் வெடி காய் கொலை புழுவை பருப்பு கிராம் மற்றும் கடலை கொலை புழுவை மற்றும் கத்தரி காய் கொலை புழுவை மற்றும் மிளகாய் வெடி காய் கொலை புழுவை மற்றும் வெண்டைக்காய் வெடி கொம்பு மற்றும் காய் கொலை புழுவுக்கு எதிரான கலவைகளை கட்டுப்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பரிந்துரைகள்:

பயிர் (கள்)	பூச்சிகளின் பொதுப் பெயர்	அளவு/ ஹெ			கடைசி தெளிப்பிலிருந்து அறுவடைக்கு இடைப்பட்ட காத்திருக்கும் காலம் (நாட்கள்)
		தீ.மூ. (கிராம்)	கலவை (மிலி)	தீநிர அளவு (லிட்)	
கொண்டைக் கடலை	காய்த் துளைப்பான் (ஹெலிகோவெர்பா ஆர்மிஜிரா மற்றும் மருகா இனம்)	48	100	500	10
உளுந்து	காய்த் துளைப்பான் (ஹெலிகோவெர்பா ஆர்மிஜிரா மற்றும் மருகா இனம்)	48	100	500	10
பருத்தி	காய்ப்புழுக்கள் (அமெரிக்கன் காய்ப்புழு, புள்ளி காய்ப்புழு)	48-60	100-125	375-500	25
கொண்டைக் கடலை	காய்த் துளைப்பான்	48	100	500	5
தக்காளி	காய் துளைப்பான்	48	100	375-500	5
நெல்	தண்டு துளைப்பான், இலை சுருட்டுப்புழு	24	50	375-500	40
முட்டைகோஸ்	டைமண்ட் முதுகு பட்டாம்	18-24	37.5-50	375-500	7
கத்தரி	நுனிக்கண்டு துளைப்பான், காய் துளைப்பான்	72-90	150-187.5	500	5
மிளகாய்	பழத் துளைப்பான் (ஹெலிகோவெர்பா ஆர்மிஜிரா மற்றும் ஸ்பொடோப்டெரா இனம்)	48-60	100-125	500	7

எச்சரிக்கை : இந்த லேபிளில்/கிரிஃப்ட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பயிர்கள் தவிர வேறு பயிர்கள் மீது உபயோகிக்கக்கூடாது

உபயோகிப்பதற்கான வழிமுறை: மருந்து தெளிப்புக்காக கையால் இயக்கப்படும் தாப்சாக் தெளிப்பான் ஹாலோ கோன் அல்லது டீரிப்பிள் ஆக்ஷன் நாலில்ல் பொருத்தப்பட்டது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

முன்னெச்சரிக்கை : கவனமாக கையாளவும். மருந்தை தொட்டுக்கூடாது அல்லது உட்கவாசிக்கக்கூடாது மருந்தைகையாளும்போது ரப்பர் கையுறைகள் மற்றும் முகமூடி அணிந்து கொள்ளவும்.

விஷத்தன்மைக்கான அறிகுறிகள்: வயிற்றுப்போக்கு காணப்பட்டதும்.

முதலுதவி: மருந்து உட்கவாசிக்கப்பட்டிருந்தால். தோமாளியை நல்ல காற்றோட்டம் உள்ள பகுதிக்கு அழைத்துச் செல்லவும். சுவாசம் நின்றிருந்தால், செயற்கை சுவாசம் கொடுக்கவும். விழுங்கப்பட்டிருந்தால், வாந்தி எடுக்க வேண்டாம். தண்ணீரை கொண்டு வாய் கொப்பளிக்கவும். கண்களில் மாக பட்டிருந்தால் ஏராளமான குளிர்ந்த தண்ணீரை கொண்டு பாய்ச்சவும். சருமம் மாக பட்டிருந்தால், மாக பட்ட சருமத்தை அதிக அளவு சோப்பு மற்றும் தண்ணீரை கொண்டு கழுவவும். மருத்துவரை அழைக்கவும்.

மாற்று மருந்து : குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து ஏதும் அறியப்படவில்லை. இணைக்கப்பட்டுள்ள விதிமுறைகளை பின்பற்றவும். அறிகுறிக்குத்தக்க சிகிச்சை அளிக்கவும்.

உபயோகப்படுத்திய கொள் கலனை அப்புறப்படுத்துதல் : 1. பைக்கேஜுகள் வசிப்பிடங்களுக்கு அப்பால் உடைத்து புதைக்கப்பட வேண்டும் அல்லது எரிக்கப்பட வேண்டும். 2. உபயோகப்படுத்தப்பட்ட பேக்கேஜுகள் அதன் மறு உபயோகத்தை தவிர்க்க வெளியே விட்டு வைக்கக்கூடாது. 3. பேக்கேஜு அல்லது உபரிப் பொருள்கள் மற்றும் இயந்திரங்களையும் கொள்கலன்களையும் கழுவிய நீர் இவற்றை சுற்றுச் சூழல் அல்லது நீர்நிலை மாக படாதவாறு பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

கேப்பிட்டு நிலையங்கள்: 1. பூச்சிக்கொல்லி அடங்கிய பேக்கேஜுகள், இதர பொருள்கள் குறிப்பாக உணவுப்பண்டங்கள் சேமிக்கப் பயன் படுத்தப்படும் அறைகள் அல்லது இடங்களுக்கு அப்பால் தனி அறைகள் அல்லது இடங்களில் சேமித்து வைக்கப்பட வேண்டும் அல்லது பூச்சிக்கொல்லியின் அளவு மற்றும் தன்மை பொருத்து தனி அலமாரிகளில் பூட்டு வைக்கப்பட வேண்டும். 2. பூச்சிக்கொல்லி சேமித்து வைக்கப் பயன்படும் அறைகள் அல்லது இடங்கள் நன்றாக கட்டப்பட்டதாக, நல்ல வெளிச்சமுள்ளதாக, காற்றோட்டமுள்ளதாக, மற்றும் ஆவி/காற்றுடன் கலந்து மாக படுவதைத் தவிர்க்கும்தான அளவுடைப்பதாகு இருக்க வேண்டும்.

இரசாயனக் கலவை:

ஃப்ளுபென்டியமைடு தீவிர மூலப்பொருள்	39.35% எ/எ
இதாக்ஸிலேட்டட் டிரைஸ்டைரில் பீனால்	1.00% எ/எ
கோ-பாலிமர் ஆஃப் அக்ரிலிக் ஆசிட் கிளைகால் டிரைவேடிவ்	3.00% எ/எ
கிளைசரின்	10.00% எ/எ
வாற்றேன் கம், அக்வஸ் கொரூஷன்	12.00% எ/எ
பிசோன்டு ஆஃப் ஐஸோதைஆபோலோன் மற்றும் அதன் குளோரோ டெரிவேடிவ்	0.08% எ/எ
சோடியம் சால்ட் ஆஃப் பென்ஸிஸோதையாசோல்-3(2H)-ஒன் இன் புரோபேனால் மற்றும் தண்ணீர்	0.12% எ/எ
அக்வஸ் சொரூஷன் ஆஃப் பாலிடைமிதைல் சிலாக்ஸேன்	0.10% எ/எ
தண்ணீர், டமினரைலைஸ்டு	மீதமுள்ளது எ/எ
மொத்தம்:	**100.00% எ/எ**

Pesticide for agriculture use

Oryzon

Flubendiamide 39.35% m/m SC

(Insecticide)

ओरीजोन

फ्लुबेनडाईअमाईड ३९.३५% भार/भार एस.सी.

(कीटनाशक)

In case of complaints, please contact Manager consumer care cell located at the Registered Office address of Manufacturer or

Customer Care No.: 022-25194491
Email: customercare@godrejagrovet.com

Manufactured by: Godrej Agrovet Limited, Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (East) , Mumbai – 400 079, Maharashtra, Factory-Lane No 7, Industrial Growth Centre, Samba, Jammu – 184121, Jammu and Kashmir, India.

निर्माता: गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड,पिरोजशाह नगर, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, विक्रोली(पूर्व), मुंबई–४०० ०७९., महाराष्ट्र. फैक्टरी: लेन नं. ७, इंडिस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, साम्बा, जम्मू–१८४१२१, जम्मू और कश्मीर, भारत.

تیار کنندہ اور:
گودریج ایگرووِیٹ لمیٹیڈ گودریج ٹاؤن، نیسری منزلہ، فیروز شاہ نگر، ایسٹرن ایکسپریس ہائی وے، وکھرولی (ایسٹ)، ممبئی - ۴۰۰۰۷۹، مہاراشٹر، فیکٹری: لین نمبر ۷، انڈسٹریل گروتھ سینٹر، سامبا، جموں - ۱۸۴۱۲۱، جموں وکشمیر، انڈیا

Pesticide for agriculture use

Oryzon

Flubendiamide 39.35% m/m SC

(Insecticide)

ओरीजोन

फ्लुबेनडाईअमाईड ३९.३५% भार/भार एस.सी.

(कीटनाशक)

In case of complaints, please contact Manager consumer care cell located at the Registered Office address of Manufacturer or

Customer Care No.: 022-25194491
Email: customercare@godrejagrovet.com

Manufactured by: Godrej Agrovet Limited, Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (East) , Mumbai – 400 079, Maharashtra, Factory-Lane No 7, Industrial Growth Centre, Samba, Jammu – 184121, Jammu and Kashmir, India.

निर्माता: गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड,पिरोजशाह नगर, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, विक्रोली(पूर्व), मुंबई–४०० ०७९., महाराष्ट्र. फैक्टरी: लेन नं. ७, इंडिस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, साम्बा, जम्मू–१८४१२१, जम्मू और कश्मीर, भारत.

Dangerous to reuse empty containers at Bottom

ಕೃಷಿ ಬಯಸ�್ಟೋಜನ್ಗಾಗಿ ಕೀಟನಾಶಕ

ಆಕ್ಟಿಜನ್

ಫ್ಲೂಬೆಂಡಿಯಾಮೈಡ್ 39.35% ತೂ/ತೂ ಎಸ್‌ಸಿ

(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಫ್ಲೂಬೆಂಡಿಯಾಮೈಡ್ 39.35% ತೂ/ತೂ ಎಸ್ಸಿ. 393.5ಗ್ರಾಂ ಫ್ಲೂಬೆಂಡಿಯಾಮೈಡ್ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು , ಇದು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ರಾಸಾಯನಿಕ 480 ಗ್ರಾಂ ಫ್ಲೂಬೆಂಡಿಯಾಮೈಡ್ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಫ್ಲೂಬೆಂಡಿಯಾಮೈಡ್ 39.35% ಎಸ್‌ಸಿ ಇದನ್ನು ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಹಸಿರೆಳೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಹುಳುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಬಲ. ಕೀಟಾಣುಗಳು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯುವ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲೇ ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಎರೆಹುಳದ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವಿಷಕಾರಿ. ಉಪಯುಕ್ತ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಕಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬದಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊಗ್ಗು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆ (ಗಳು)	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಮಾಣ/ ಪ್ರ. ಹೆ			ಹಿಂಡಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಸಾಂದ್ರತೆ (ಪಿಪಿಎಂನಲ್ಲಿ)
		ಸಕ್ರಿಯ (ಗ್ರಾಂ)	ದ್ರವದ (ಮಿಲಿ)	ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿನ ಮಿಶ್ರಣ (ಲೀ.)	
ತೊಗರಿ	ಕಾಯಿಕೊರೆಯ (ಹೆಲಿಕೊವರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಗೆರಾ ಮತ್ತು ಮೆಲಂಜೆನಾ ಎಸ್‌ಪಿ.)	48	100	500	10
ಉದ್ದು	ಕಾಯಿಕೊರೆಯ (ಹೆಲಿಕೊವರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಗೆರಾ ಮತ್ತು ಮೆಲಂಜೆನಾ ಎಸ್‌ಪಿ.)	48	100	500	10
ಹತ್ತಿ	ಹತ್ತಿ ಹುಳು (ಹೆಲಿಕೊವರ್ಪಾ ಕಾಯಿಕೊರೆಯ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಕೊರೆಯ)	48-60	100-125	375-500	25
ಕಡಲೆ	ಕಾಯಿಕೊರೆಯ	48	100	500	5
ಬೆಮಿಮ್ಮಬೊ	ಕಾಯಿಕೊರೆಯ	48	100	375-500	5
ಚಟ್ಟ	ಕಾಯಿಕೊರೆಯ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಕೆ ಹುಳು	24	50	375-500	40
ಎರೆಹುಳು	ಎರೆಹುಳದ ಬೆಣ್ಣೆ ಹುಳು	18-24	37.5-50	375-500	7
ಬದನೆ	ಮೆಣಸು ಹುಳು ಕಾಯಿಕೊರೆಯ	72-90	150-187.5	500	5
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ	ಕಾಯಿಕೊರೆಯ (ಹೆಲಿಕೊವರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಗೆರಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೊಡೊಪ್ಟೆರಾ ಎಸ್‌ಪಿ.)	48-60	100-125	500	7

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಇದರ ಬಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ : ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಲು ಹಾಲಿನ ಕೊಳೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ವಿಕ್ಲೈಮ್ ಅಥವಾಯಿದೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಯರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಯರ್ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲಭೂತಕ್ರಿಯೆ ಕ್ರಮಗಳು: ಇದನ್ನು ಕಾಳಜಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಳಸಿ. ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು ಅಥವಾ ವಾಸನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿರಿ. ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ರಬ್ಬರ್ ಕೈ ಚೀಲ ಮತ್ತು ಮುಖವಾಡ ಬಳಸಿ.

ವಿಷಪೂರಿತ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ತಲೆನೋವು ಕಂಪನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಥಮೋಪಚಾರ ಕ್ರಮಗಳು: ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಕಾಯಿಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿರಿ. ಸಸಿಯನ್ನು ತಂಪು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಿಸಿಲಿ. ತೆಗೆದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಕೆಳಗೆ ಒಣಗಿಸಿ. ಸಸಿಯನ್ನು ತಂಪು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಿಸಿಲಿ. ತೆಗೆದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಕೆಳಗೆ ಒಣಗಿಸ