



OUTE[®]
Systemic Fungicide



Godrej agrovet



Technology from
Nissan
Chemical Corporation,
Japan

Thi fluzamide 24% SC
Systemic Fungicide



**Manufactured and Marketed
by : Godrej Agrovet Limited,**
Regd. Office : Godrej One, 3rd
Floor, Pirojshanagar, Eastern
Express Highway, Vikhroli (East),
Mumbai-400079, Maharashtra,
India. Manufacturing Premises :
Lane No, 7, Indl. Growth Centre,
Samba, Jammu- 184121, J&K,
India.

Godrej agrovet

Manufactured and Marketed by :

Godrej Agrovet Limited, Regd. Office : Godrej One, 3rd Floor, Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (East), Mumbai-400079, Maharashtra, India. Manufacturing Premises : Lane No, 7, Indl. Growth Centre, Samba, Jammu-184121, J&K, India.

निर्माता और विपणनकर्ता:

गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड, रजि. ऑफिस: गोदरेज वन, तीसरी मंजिल, पिरोजशाह नगर, इस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, विक्रोली (पूर्व), मुंबई - ४०० ०७९, महाराष्ट्र, इंडिया। उत्पादन परिसर : लेन नं.७, इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, साम्बा, जम्मू-१८४१२१, जम्मू एन्ड कश्मीर, भारत ।

In case of complaints, please contact our customer service executive at the Registered Office address of the Manufacturer and Marketer or email at gavlho@godrejagrovvet.com or call us at 022 –2519 4491. website: www.godrejagrovvet.com

OUTE[®]
THIFLUZAMIDE 24%SC
(SYSTEMIC FUNGICIDE)

It is used to control Sheath blight disease of Rice, Early blight on Tomato and Black scurf on Potato.

RECOMMENDATION FOR USE:

Crop(s)	Common name of the pests	Doseages per hectare			Waiting period between last spray & harvest (In days)
		A.I(gms)	Formulation (ml)	Dilution in water (Lt)	
Rice	Sheath blight, (<i>Rhizoctonia solani</i>)	90	375	500	28
Tomato	Early blight	120	500	500	7
Potato	Black Scurf (As seed treatment)	0.6 g. a.i./10 kg potato tuber	2.5 ml./10 kg potato tuber		Used as seed treatment in Potato

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet, the Product is very toxic to Aquatic organisms therefore not to be used in and around aquaculture.

Re-entry period : 24 hrs.

DIRECTIONS OF USE: Measure required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Then add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for high volume of application through knap-sack sprayer of high volume sprayers.

Time of Application : Thifluzamide 24% SC is a systemic fungicide to be applied at appearance of Sheath blight and early blight diseases in Rice and Tomato crop, respectively. In case of Black scurf disease of Potato it should be applied as seed treatment before sowing.

PRECAUTIONS: Read the label carefully before use and follow the instructions. Store the fungicide in its original containers under lock and key, away from foods stuff and animal feed & out of reach of children. Use protective clothing while handling. Remove clothing at once if contaminated. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body with soap and water. Do not eat, drink, smoke or chew tobacco while handling, the product, avoid inhalation and contact with eyes and skin

SYMPTOMS OF POISONING : Nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhea, irritation if swallowed.

FIRST AID MEASURES : 1) If inhaled remove the patient into fresh air. 2) If swallowed induce vomiting by tickling back of throat. 3) Remove contaminated clothes; wash contaminated skin and clothes with soap plenty of water. 4) If eyes are contaminated, wash for 15 minutes with clean water. 5) If the patient is unconscious please Consult a physician.

ANTIDOTE: No specific antidote is known, treat symptomatically.

Phytotoxicity : No phytotoxicity observed at recommended dose of Thifluzamide 24% SC in Rice, Tomato and Potato crops.

CONDITIONS TO BE SPECIFIED FOR STORAGE OF FUNGICIDE:

1 The package containing fungicides shall be stored in separate room or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicide.

2. The rooms or premises meant for storing fungicide shall be well built, dry, well-lit and ventilated and of sufficient dimension to prevent environmental contamination with vapor of fungicide.

DISPOSAL OF USED PACKAGES, SURPLUS MATERIALS AND WASHING OF FUNGICIDE :

1. it shall be the duty of manufacturers, formulators of fungicides and operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

CHEMICAL COMPOSITION :

1). thifluzamide A.I	24.00 % w/w
----------------------	-------------

Details of adjuvants:

1). Ethoxylated polymethacrylate in propylene glycol	3.00 % w/w
2). Fatty alcohol ethoxylate	2.00 % w/w
3). Poly dimethyl siloxane	0.50 % w/w
4). Propylene glycol	6.00 % w/w
5). Xanthane gum	0.40 % w/w
6). Demineralized water	Q.S
Total	100% w/w

Cautionary Statement: 1. It is toxic to honey bees, spray application should be avoided during the foraging period of bees. 2. toxic to fish, aquatic organisms hence should not be used near water bodies, aquaculture. 3. Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets. 4. Destroy the container after use as directed on leaflet.
Dangerous to re-use empty containers.

ओटे

थाईफलूज़ामाईड 24% एस सी

(अन्तर्ग्राही फफूंदनाशक)

यह धान के पर्णछद्म अंगमारी, टमाटर के अंगेती झुलसा एवं आलू के ब्लैक स्कॉर्फ रोगों के लिए अत्यंत प्रभावकारी है।

उपयोग के लिए सिफारिश :

क़सत	कीट सामान्य नाम	प्रति हेक्टेअर मात्रा			अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच में अंतर (दिनों में)
		स.त. (ग्रा.)	संरचना (मिली)	पानी की मात्रा (लीटर)	
धान	पर्णछद्म अंगमारी राइजोक्टेनिया खोत्तनी	90	375	500	28
टमाटर	अंगेती झुलसा	120	500	500	7
आलू	ब्लैक स्कॉर्फ (बीज उपचार)	0.6 ग्रा. स.त. /10 किग्रा आलू कंठ के लिए	2.5 लि.ली /10 किग्रा आलू कंठ के लिए		आलू में बीज उपचार के लिए उपयोग होता है।

चेतावनी : लेबल लीफलेट पर दी गई क़सतों के अलावा किसी अन्य क़सत पर इसका प्रयोग न करें यह जलीय जीवों के लिए विषाक्त है, इसलिए जलीय क्षुब्ध में और इसके आसपास इसका उपयोग नहीं करना चाहिए।

पुनः प्रवेश अंतराल : 24 घंटे

अंतिम छिड़काव या कटाई के बीच अंतराल : 28 दिन (धान) और 7 दिन (टमाटर)

उपयोग के लिए निर्देश : फंफूंदनाशक की आवश्यक मात्रा तब तक इसे पानी की थोड़ी मात्रा में अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें पानी की शेष मात्रा, जो बाकी रह गई है, अच्छी तरह हिलाते हुए मिलाएं और इसका उष्ण आबतन पिछकाव नैपथेक स्प्रेयर से करें।

प्रयोग का समय:

थाईपन्तुजामाइड 24 प्रतिशत एस सी एक अन्तर्पक्वही फंफूंदीनाशक है इसका प्रयोग धान और टमाटर की फसलों में क्रमशः पर्णच्छद अंगमारी एवं अंगुली मुलस रोग के प्रारम्भिक तसगतिखाई पर करें। आलू की फसल में ब्लैक स्क्वैक रोग के लिए इसका प्रयोग बुआई से पहले बीज उपचार के रूप में किया जाना चाहिए।

सावधानियां : उपयोग से पहले लेबल को अच्छी तरह पढ़ें और निर्देशों का पालन करें। फंफूंदनाशक को उल्टी मूल पैकेज में ढाला-बांधी लगाकर, खाद्य पदार्थों, पशु चारे और बच्चों की पहुँच से दूर संरक्षित करें। उपयोग करते समय सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। यदि कपड़े दूषित हो गए हो तो उन्हें पुराने बदल दें। दूषित कपड़ों तथा शरीर के भागों का अच्छी तरह साबुन और पानी से धोएं। फंफूंदनाशक के उपयोग के समय खाना-पीना धुषणन करना या तम्बाकू, धबाना आदि कार्य न करें। इसे तूँघे नहीं तथा आँखों एवं त्वचा को इसके संपर्क से बचाए।

विष के लक्षण : निगले जाने पर निचली, उल्टी, पेट में दर्द, दस्त खुजली आदि।

प्राथमिक चिकित्सा : 1. अगर सांस डाल अंदर से लिया हो तो चेनी का स्वच्छ हवा में ले जाएं। 2. निगले जाने पर तुरत खले से पिचले हिस्से में उंगली डालकर उल्टी करावें। 3. दूषित कपड़े उतार दें और दूषित त्वचा तथा कपड़ों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो डालें। 4. यदि आँखें दूषित हो गई हो तो स्वच्छ पानी से 15 मिनट तक धोएं। यदि रोगी बेहोश हो तो कृपया चिकित्सक से परामर्श लें।

विषनाशक : कोई विशेष विषनाशक नहीं। लक्षणानुसार ईलाज करें।

पौधविषालकता :

थाईपन्तुजामाइड 24 प्रतिशत एस सी की अनुमोदित की गई मात्रा से धान, टमाटर और आलू की फसलों में कोई पौधविषालकता नहीं पाई गई।

फंफूंदनाशक के संग्रह हेतु निर्धारित बातें : 1. फंफूंदनाशक रखे हुए डिब्बों / पैकेजस को असम कमरों या जगहों में उन कमरों या जगहों जिनमें अन्य दस्तुर रखी जाती है, उनसे दूर रखना चाहिए या अलग अलमारियों में ढाला-बन्दी लगाकर फंफूंदनाशक की प्रमाण व प्रकार की हिसब से रखें। 2. जिस कम्पे या अलमारी में फंफूंदनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बंद होना, सूखा, प्रकाशमय, हवादार तथा पर्याप्त आकार का होना चाहिए जिससे फंफूंदनाशक के भाग से वातावरण प्रदूषित होने का खतरा न रहे।

उपयोग किए गए डिब्बों/पैकेजस बचे हुए कफूंदनाशक तथा साधनों के धोवन का निपटारा : 1. यह कफूंदनाशक निर्माता तथा उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि यह डिब्बों/पैकेजस या बची हुई कफूंदनाशक तथा साधनों के धोवन का निपटारा-सुरक्षित ढंग से करें जिससे वातावरण या पानी प्रदूषित न हो। 2. उपयोग किए गए डिब्बों/पैकेजस को बाहर न फेंकें जिससे उनका दुबला प्रयोग न हो। 3. उपयोग किए गए डिब्बों/पैकेजस को लंदनार आसानी से दूर जमीन में गाड़ दें।

रसायनिक संघटन

थाइफ्लुनामाईड स.व.	:	24%00 भार/भार
अन्य घटक		
1) इताक्रीसोटेट पासीक्ताक्राइलेट इन प्रोपइलिन ग्लाइकोल	:	3.00% भार/भार
2) फेटी एन्कोहोत इथीसैलीलेट	:	2.00% भार/भार
3) पोली डाइमिथाइल सिलोक्सोन	:	0.50% भार/भार
4) प्रोपाईलीन ग्लाइकोल	:	6.00% भार/भार
5) जेथेन ग्ल	:	0.40.% भार/भार
6) डिमिनरलाईज्ड वाटर		मानानुसार
कुल	:	100.00% भार/भार

सावधानियाँ कथन: १. यह मधुमखियों के लिए हानिकारक है, जब मधुमखियाँ भोजन की तलाश में जाते हैं तब छिड़काव न करें। २. मछलियों, जलीय जीवों के लिए जहरीला है इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि के पास इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ३. लेबल लीफलेट में निर्दिष्ट किये गये फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। ४. उपयोग के बाद खाली डिब्बों को लिफलेट में दिये गये निर्देशों के अनुसार नष्ट करें।

खाली डिब्बों को दुबारा उपयोग करना खतरनाक है।

ओटे

थाईफ्लुझामाइड २४% एस सी (आंतरप्रवाही बुरशीनाशक)

हे भात पिकात पानांवरील करपा,टोमेंटो वरील लवकर येणारा करपा आणि बटाटाच्या पिकात काळी बुरशी प्रक्रिया करण्यासाठी म्हणून अत्यंत परिणामकारक आहे.

वापरासाठी शिफारस:

पीक	सोगाचे सामान्य नाव	प्रमाण प्रति हेक्टर			होवटवी फवारणी आणि कापणी मधील अंतर (दिवस)
		स.त. (ग्र.)	द्रवण (मि.ली)	अवसांझण (लीटर)	
भात	लॉबी करपा रिझोक्टोनिया शोल्यान्ही	90	375	500	28
टोमेंटो	लवकर अनिष्ट	120	500	500	7
बटाटे	काळी बुरशी (बियाण्यावरील उपचारसाठी)	0.6 ग्रॅ. स.त. / 10 किलो बटाटा कंद	2.5 मिली / 10 कि. बटाटा कंद		बटाटात बियाण्यांवर प्रक्रिया करण्यासाठी उपयोगात येते

वापरासाठी निर्देश : ह्या लेबल / पत्रकावर निर्दिष्ट पिकांशिवाय अन्य पिकांवर उपयोग करू नये. उत्पाद जलवर जीवांकरिता कार विधारी आहे म्हणून एक्सीकल्वर मध्ये किंवा त्याच्या जवळपास उपयोग करू नये.

पुनःप्रवेश अवधि : 24 तास

खबरदारी : वापरापूर्वी लेबल काळजीपूर्वक वाचा आणि सूचनांचे पालन करा. बुरशीनाशकाची साठवण मूळ डब्यात कुलपू चावीत, अन्नपदार्थ आणि जनावरांचा चारा आणि मुलांपासून दूर ठेवा. ह्याचा वापर करताना सुरक्षित कपडे वापरा. जरा कपडे एकदा सांफकात आले तर बदला.

शरीराचा संपर्कात आलेला भाग आणि कपडे साबण व पाण्याने स्वच्छ धुवा. ह्या उत्पादनाचा वापर करताना खाऊ, पीऊ, तंबाखू, चघळू, अथवा धूम्रपान करू नका, श्वासाद्वारे आत घेवू नका आणि डोळ्यांशी व त्वचेशी संपर्क होवू देवू नका.

विषबाधेची लक्षणे : अन्नावरची वासना उडणे, उलटी, पोटगत वळ येणे, अतिसार, गिळले गेल्यास जळजळ.

प्रथमोपचार : १) जर श्वासाद्वारे आत गेले तर रुग्णास मोकळ्या हवेत आणा. २) जर गिळले गेले तर, घासामध्ये गुदगली करून उलटी करावी. ३) दुषित कपडे बदला, संपर्कात आलेली त्वचा आणि कपडे साबण आणि भरपूर पाण्याने धुवा. ४) जर डोळ्यांशी संपर्क झाला तर, जवळजवळ १५ मिनिटे स्वच्छ पाण्याने धुवा. जर रुग्ण बेमुद्द असले तर कृपया डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

उपयोग करण्याची वेळ: थार्ईपलूजामाइट २४ टक्के एस सी एफ अंतरप्रवाही बुरशीनाशक आहे. ह्याचा उपयोग भात आणि टोमॅटोच्या पिकात क्रमशः पानांवरील करपा आणि लवकर येणारा करपा रोगांसाठी प्रारंभिक लक्षणे दिसून आल्यावर करावा. बटाट्याच्या पिकात काळी बुरशी रोगासाठी ह्याचा उपयोग पेरणी आधी विद्याण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी करावा.

सावधगिरी: वापर करण्याआधी लेबल काळजीपूर्वक वाचा आणि निर्देशांचे पालन करा. बुरशीनाशकाला त्याच्या मूळ डब्यात कपाटाला कुलूप लावून, खाद्यपदार्थ व जनावरांच्या चान्यापासून लांब आणि लहान मुलांच्या आवाक्याबाहेर साठवा. झाला हाताळताना संरक्षक कपडे घाला. जर कपडे दुषित झाले असतील तर लगेच काढून टाका. दुषित झालेले कपडे आणि शरीराचे अंग साबण आणि पाण्याने चांगल्या प्रकारे धुवा. बुरशीनाशक हाताळताना खाऊ, पीऊ व धूम्रपान करू नका आणि तंबाखू, चघळू नका. श्वासावाटे आत घेण्याचे व डोळे आणि त्वचेशी संपर्क टाका.

विषोपचार : कोणताही खास विषोपचार माहित नाही. न्हाणानुसार उपचार करा.

रोगविषाक्तता: थायपलूजामाइटच्या २४ टक्के एस सी च्या शिफारस केलेल्या प्रमाणात भात, टोमॅटो, आणि बटाट्याच्या पिकांवर कोणताही रोगविषाक्तता आढळलेली नाही.

दुरशीनाशक साठवणीची स्थिती: १) ह्या दुरशीनाशकाची साठवण केलेल्या पॅकेजेसची साठवण वेगळ्या खोलीत किंवा जागेत जेथे इतर वस्तू किंवा खाद्य पदार्थ ठेवले जात नसतील अशा ठिकाणी कुलुपबंद कपाटात ठेवावे. २) हे दुरशीनाशक साठविण्याची जागा मजबूत बांधणीची, कोरडी, भरपूर हवा खेळती असणारी आणि भरपूर लांब रूंद असावी जेणेकरून वाफेने होणारे प्रदूषण टाळेल.

वापरलेली पॅकेजेस, इतर साहित्य आणि दुरशीनाशक पुवणाच्या पाण्याची दिलेवाट:

१) दुरशीनाशक उत्पादकाचे आणि हस्ताळगान्याचे कर्तव्य आहे की पॅकेजेस किंवा उरलेले द्रावण किंवा फवारणीचे पाणी याची पिल्लेवाट पर्यावरण किंवा पाणी प्रदुषित होणार नाही अशा सुरक्षित पद्धतीने लावावी. २) पूर्णवापर होवू नये म्हणून वापरलेली पॅकेजेस उघडबाबर टाकू नयेत. ३) रिकाम्या डब्यांची गोडतोड करून कस्तीपासून दूर सुरक्षित ठिकाणी पुरून टाकावेत.

शासनात्मक संरचना:

थायपलुझामाझड स.त.

२४.०० % व/व

एडज्युव्हंट वइल अधिक

१) इथॉक्सीलेटेड पॉलीमेथाक्रायलेट इन प्रोपलेन ग्लायकोल

३.०० % व/व

२) फॅटी अल्कोहॉल इथॉक्सीलेट

२.०० % व/व

३) पॉली आयमिथिल सिलोक्सेन

०.५० % व/व

४) प्रोपलेन ग्लायकोल

६.०० % व/व

५) झॅन्केन गम

०.४० % व/व

६) डिमिनरलाइज्ड वॉटर

पुरेसे प्रमाण

एकूण

१००.०० % व/व

सावधगिरीचे विधान: १) हे मधमाशांसाठी विषारी आहे. मधमाशांच्या मध गोळा करण्याच्या कालावधी दरम्यान फवारणी टाळावी. २) मासे, जलचरांसाठी विषारी त्यामुळे जलचर, मत्स्यपालन किंवा मत्स्यपालनाजवळ वापरू नये. ३) लेबल आणि पत्रकांवर निर्देशित केलेल्या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरले जावू नये. ४) पत्रकावरील निर्देशानुसार वापरल्यानंतर डबे नष्ट करा.

रिकामी डबे पुन्हा वापरणे धोकादायक.

ઓટે

ધાયકલુગામાઈડ ૨૪% એસસી (ઑતરપવાઈ કુગનાશક)

આ ડાંગરના પાકમાં પાનાળો સુકારો, ટામેટાના પાકમાં આગોતરો સુકારો અને બટેટાના પાકમાં ઢાળી ફૂગ રોગસાટે નિયંત્રણ કરવામાં અત્યંત અસરકારક છે.

ઉપયોગ માટે ભલામણો:

પાક	રોગનું સામાન્ય નામ	માત્રા પ્રતિ હેક્ટર			છેલ્લા છંટકાવ થી લગાણી સુધીનો પ્રતિજ્ઞા સમય (દિવસોમાં)
		ચ.ઘ. (ગ્રામ)	રચના (મિ.લી.)	પાણીમાં મેદન (લીટર)	
ડાંગર	પાનાળો સુકારો <i>સ્પોટ બ્લિચ સીકની</i>	૬૦	૩૭૫	૫૦૦	૨૮
ટામેટા	આગોતરો સુકારો	120	500	500	7
બટેટા	કાળા ચાકા (બીજા ઉપચાર)	0.6 ગ્રા. સ.ત. / 10 કિલો બટેટા કદ	2.5 મિલી / 10 કિ. બટેટા કદ		

ચેતવણી: આ લેબલ / ચોપાનિયામાં નામનિર્દેશ કરેલા પાકો સિવાય અન્ય પાકો પર ઉપયોગ કરવો નહિ. આ કુગનાશક વળચર છુવો માટે ખૂબ જ ઝેરી છે અને તેથી તેનો એકવાડલ્ચરમાં અચાવ તેની સાતપાસ ઉપયોગ કરવો નહિ.

પુનઃપ્રવેશ અવધિ: ૨૪ કલાક

વપત્તશ માટેના નિર્દેશો: કુગનાશકની આવશ્યક માત્રાને માપી તેને થોડા પાણીમાં રચની રીતે ભેળવો, તે પછી બાકીની નિર્દેશિત પાણીની માત્રા ઉમેરી રચની રીતે ફલાવી ભેળવો અને ઢાઢ વોલ્યૂમ નેપરેક રપેચરની સહાયતાથી છંટકાવ કરો.

વપસનનો સમય: થાઈલંડનામાઈડ રજ ટકા એસતી એક આંતરપ્રવાહી ફૂગનાશક છે. તેનો વપરાશ કાંગર અને ટામેટાના પાકમાં અનુક્રમે પાલનો સુકારો અને આગોતરો પુકારો રોગના પ્રારંભિક લક્ષણો દેખાઈ આવે ત્યારે કરવો. બેટેટાના કાળી ફૂગ રોગની બાબતમાં તેનો વાવણી પહેલાં બિયારણની માવજત કરવા માટે ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

સાવચેતીઓ: ઉપયોગ પહેલાં લેબલ કાળજીપૂર્વક વાંચો અને સૂચનાઓનું પાલન કરો. ફૂગનાશકને એના મૂળ પાત્રમાં તાળાંચાવીમાં બંધ કરી ખાદ્યપદાર્થો અને પશુઆહાર તથા બાળકોની પહોંચથી દૂર સંગ્રહ કરો. સંભાળતી વખતે રક્ષણકારક કપડાં પહેરો. જો દૂષિત થાય તો કપડાં તરત કાઢી નાંખો. દૂષિત થયેલા કપડાં અને શરીરના ભાગો સાબુ અને પાણી વડે સંપૂર્ણ ધોઈ નાંખો. ઉત્પાદન સંભાળતી વખતે ખાતું, પીતું, ઘૂંમપાન કરતું અથવા તમાકુ ચાવવો નહીં. શ્વાસમાં લેવાનું અને આંખો તથા ત્વચા સાથે સંપર્ક ટાળો.

ઝેર ચઢવાના લક્ષણો: જો ગળવામાં આવે તો ઉબકા, ઉલટી, પેટમાં દુખાવો, અતિસાર, ચળ-બળતર.

છોડ વિપાકનતા : થાઈલંડનામાઈડ 24 ટકા એસ સી ની બનાવચિત માત્રા વડે કાંગર, ટામેટા અને બટાકાના પાકમાં છોડ પ્રત્યે કોઈ વિચાક્ષતા નથી જણાઈ.

પ્રાથમિક સારવારના પગલાં ૧) જો શ્વાસમાં બચ તો દરદીને તાજી હવામાં ખસેડો. ૨) જો ગળવામાં આવે તો ગળામાં આંગળા નાંખી ઉલટી કરાવો. ૩) દૂષિત થયેલા કપડાં કાઢી નાંખો; દૂષિત થયેલી ત્વચા અને કપડાં સાબુ અને પુકળ પાણીથી ધોઈ નાંખો. ૪) જો આંખો દૂષિત થાય તો ચોખ્ખા પાણીથી ૧૫ મિનિટ સુધી ધુવો. શ્વે કદાં લેલા જોય તો ફૂપા કદીને ડિસ્કલકલી કલદ લો.

ઘોરનું મારણ: કોઈ ચોક્કસ મારણ બાજમાં નથી, લક્ષણો અનુસાર સારવાર આપો.

કુળનાશકના સંગ્રહ માટે સુચવવાની શરતો: ૧) કુળનાશકો સ્થાવરા પેટેલુસ બીજી બીજવસ્તુઓ સંગ્રહવા માટે વપરાતા ઓરડાઓ અથવા જગ્યાઓથી દૂર અથવા ઓરડાઓ અથવા જગ્યાઓમાં સંગ્રહવા અથવા કુળનાશકના જથ્થા અને પ્રકાર ઉપર આધાર રાખીને અલગ કાળકાળી તાળાંચાવીમાં બંધ કરીને રાખવા. ૨) કુળનાશકો સંગ્રહવા માટે ઓરડા અથવા જગ્યા સાફ બાંધણીનાં, સૂકાં, સારો પ્રકાર ધરાવતાં અને હવાદાર તથા પૂરતી મોકળાશવાળા હોવા જોઈએ જેથી કુળનાશકની વરાળથી પર્યાવરણીય પ્રદૂષણ થતું નહીં.

વપરાયેલા પંકેલુસ, વધારાની સામગ્રી અને કુગનાશકોના લોવાઓનો નિઃશ્વ:

૧) કુગનાશકોના ઉત્પાદકો દ્વારા કરનારાનો અને સોંપરેટરોની એ કસ્ટવ બનશે કે પંકેલુસ અથવા વધારાની સામગ્રી અને ધોવાણનો એવી સલામત રીતે ભિકાલ કરવામાં આવે જેથી પર્વાવસ્થીય અથવા જળ પ્રદૂષણ થતું અટકે. ૨) વપરાયેલા પંકેલુસ તેમનો ફરીથી ઉપયોગ થતો રોકવા માટે બહાર રાખવા નહીં. ૩) પંકેલુસ ભાંગી નાખવા અને વસતિથી દૂર ઘટી દેવાં.

સામાયિક સ્વચ્છતા:

થાયડુલુગ્રામાઈડ સ.ઘ. ૨૪.૦૦% વ/વ

સહાયક દ્રવ્યોની વિગતો:

૧) પ્રોપિલીન ગ્લાયકોલમાં ઇથોક્સિલેટેડ પોલિમિથાક્રાયલેટ	૩.૦૦% વ/વ
૨) ફ્લેટી આલ્કોહોલ ઇથોક્સિલેટ	૨.૦૦% વ/વ
૩) પોલિડાયમિથાઇલ સિલોક્સેન	૦.૫૦% વ/વ
૪) પ્રોપિલીન ગ્લાયકોલ	૬.૦૦% વ/વ
૫) ગેન્થેન ગમ	૦.૪૦% વ/વ
૬) ડિમિનરલાઈડ પાણી	પૂરતું પ્રમાણ
કુલ	૧૦૦.૦૦% વ/વ

ભાવચેતીનું નિવેદન: ૧. મધમાખી માટે તે એટી છે. મધમાખી જાકિય હોય ત્યારે ઇંટકાવ ટાળવો જોઈએ. ૨. માછલી, સમુદ્રિ જીવો માટે એટી છે, જેથી પાણીનાં કુંડ, મજ્જાઉંદર અથવા પાલન કરાતું હોયત્યાં ઉપયોગ નહીં કરવો જોઈએ. ૩. લેબલ અને યત્રક પર કર્જાવ્યા ભિવાયના કોઈ પણ હેતુથી ઉપયોગ નહીં કરવો જોઈએ. ૪. ઉપયોગ પછી કન્ટેઈનર યત્રકમાં ભિર્દેશ અનુસાર નાશ કરો.

ઉપયોગ કરેલા ખાલી કન્ટેઈનર ફરીથી ઉપયોગ કરવાનું અતારનાક છે.

ਔਟੋ

ਬਾਈਫਲੂਜ਼ਾਮਾਈਡ ੨੪% ਐਸਸੀ (ਅੰਤਰਪ੍ਰਵਾਈ ਫਫੂਦੀਨਾਸ਼ਕ)

ਇਹ ਭੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਪਲ ਅੰਗਮਾਰੀ, ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਅਗ਼ੋਰੀ ਝੁਲਸਾ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਪਾਪੜੀ ਰੋਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ।

ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੁਚਾਉ:

ਫ਼ਸਲ	ਰੋਗ ਦਾ ਆਮ ਨਾਂ	ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰ. ਹੈ.			ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਤਕ ਉਭੀਕ (ਦਿਨ)
		ਕਿ.ਤ. (ਗ੍ਰਾ)	ਫ਼ਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ (ਮਿਲੀ.)	ਘੋਲ ਦਾ ਪਾਣੀ (ਲੀ.)	
ਝੋਨਾ	ਕੋਪਲ ਅੰਗਮਾਰੀ ਰਈਸਟੋਨੋਆ ਮਿਲਟਰੀ	੯੦	੩੭੫	੫੦੦	੨੮
ਟਮਾਟਰ	ਅਗ਼ੋਰੀ ਝੁਲਸਾ	੧੨੦	੫੦੦	੫੦੦	੭
ਆਲੂ	ਕਾਲੀ ਪਪੜੀ (ਬੀਜ ਉਪਰ)	੦.੬ ਗ੍ਰਾ ਕਿ.ਤ./ ੧੦ ਕਿ.ਗ੍ਰਾ ਆਲੂ ਦੇ ਲਈ	੨.੫ ਮਿ.ਲੀ / ੧੦ ਕਿ.ਗ੍ਰਾ ਆਲੂ ਦੇ ਲਈ		ਆਲੂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਉਪਰ ਲਈ ਫਰਿਤਿਆ ਸਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚੋਤਾਵਨੀ: ਲੋਬਲ ਲੀਫਲੈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹੀਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ੨੪ ਘੰਟੇ

ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ: ਫਫੂਦੀਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਪ ਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾਓ। ਫਿਰ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਨਾਲ ਹਾਈ ਵਾਲਿਊਮ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਵ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਾ-ਮਿਲਾ ਲਓ।

ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ:

ਥਾਈਫਲੂਜ਼ਾਮਾਈਡ ੨੪ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਸ ਸੀ ਇੰਕ ਐਂਡਪ੍ਰਵਾਈ PPUMidlineਫਲੂਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਟਮਾਕਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਮਵਾਰ ਡੰਡੀ ਦੀ ਅੰਗਮਈ ਅਤੇ ਅਗੋਤੀ ਝੁਲਸਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ। ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਸਕਾਫ਼ ਰੋਗ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਸਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੀਜ਼ ਉਪਰਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਤੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਫਲੂਈਨਾਸਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਵਰਤਣ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅਕਾਰੀ ਕਪੜੇ ਪਹਿਣੋ। ਕਪੜੇ ਢੁਸਿੰਭ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਡੋਰਨ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਢੁਸਿੰਭ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡੋਰਨ ਦੇ ਲਵੋ। ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਥੇ ਪੀਓ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਮਰਪਾਨ ਕਰੋ। ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਰਵਾਢਾ ਅਤੇ ਔਖਾਂ ਢੁਸਿੰਭ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ।

ਵਿਸ਼ੇਲੇ ਅਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਦਸਤ, ਨਿਗਲੇ ਜਾਣ' ਤੇ ਜਲਨ।

ਪੋਇਆਂ ਦਾ ਵਲੈਲਾਪਣ: ਥਾਈਫਲੂਜ਼ਾਮਾਈਡ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਸਸੀ ਦੀ ਦੋਸੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਚਾਵਲ, ਟਮਾਕਰ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸ਼ੇਲਾਪਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਫ਼ਸਟ ਏਫ਼ ਉਪਾਅ: ੧) ਦਵਾਈ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ੨) ਨਿਗਲੇ ਜਾਣ' ਤੇ ਛਲੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਕਰ ਕੇ ਉਲਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਓ। ੩) ਢੁਸਿੰਭ ਹੋਏ ਕਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਢੁਸਿੰਭ ਹੋਏ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਤਵਚਾ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਵੋ। ੪) ਔਖਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ੧੫ ਮਿੰਟਾਂ ਤਕ ਧੌਂਦੇ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ।

ਵਿਸ਼ਲਿਸ਼ਟਾਰਕ: ਕੋਈ ਨਿਰਾਪਭਿਤ ਵਿਸ਼ਲਿਸ਼ਟਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਢੁਟਿਆਂ ਦਾ ਬਹਿਰੀਲਾ ਹੋਣਾ:

ਥਾਈਫਲੂਜ਼ਾਮਾਈਡ ੨੪ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਸ ਸੀ ਦੀ ਦੋਸੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਝੋਨੇ, ਟਮਾਕਰ, ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹਿਰੀਲਾਪਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਫਲੂਈਨਾਸਕ ਦੀ ਸਟੋਰ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ: ੧) ਫਲੂਈਨਾਸਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਦੇ ਰੱਖੋ। ੨) ਫਲੂਈਨਾਸਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਖੁੱਲੇ ਅਤੇ ਹਵਾਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਭੰਡਿਆਂ, ਵਾਧੂ ਬਚੀ ਦਵਾਈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਧੋਣ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: ੧) ਇਹ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਫਾਰਮੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ flibAWਜਾਂ ਵਾਧੂ ਬਚੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬਚੇ ਘੋਲ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਏਦਾਂ ਨੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ੨) ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ੩) flibAWਓ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੇ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ dbw ਕਲੱਸਟ ਕਰ ਦਿਓ।

ਰਸਾਇਣਕ ਮਿਸ਼ਰਣ :

ਬਾਈਫਲੂਜਾਮਾਈਡ ਕਿ.ਤ.

੨੪.੦੦% ਵ/ਵ

ਸਹਾਇਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ :

੧) ਪ੍ਰਾਪੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਵਿਚ - ਈਥੋਦੀਲੋਟਿਡ ਪੋਲੀਮੈਥਰੀਲੈਟ

੩.੦੦% ਵ/ਵ

੨) ਫੈਟੀ ਅਲਕੋਹਲ ਈਥੋਕਸੀਲੇਟ

੨.੦੦% ਵ/ਵ

੩) ਪੋਲੀ ਡੀਮੈਥਾਈਲ ਸੀਲੋਕਸੇਨ

੦.੫੦% ਵ/ਵ

੪) ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ

੬.੦੦% ਵ/ਵ

੫) ਜ਼ਾਨਥੇਨ ਗੰਮ

੦.੪੦% ਵ/ਵ

੬) ਡੀਮਿਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਾਣੀ

ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ

ਕੁਲ

੧੦੦.੦੦% ਵ/ਵ

ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਿਆਨ: ੧. ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਵਰਤੇ। ੨. ਮੱਛੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ, ਜਲ-ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਥਾਨਾਂ ਨੇੜੇ ਨਾ ਵਰਤੇ। ੩. ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ੪. ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ।

ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣਾ ਮਤਰਨਾ ਕਰੋ।

ఉపయోగించాల్సిన సమయం: ఫిబ్రవరి 24 శాతం ఎస్సె ఒక అంతర్జాతీయ కేటలాగ్‌ను, షేర్ బ్రెడ్ మరియు పట్ల బ్రెడ్ వ్యాధులు పరిసరాల వరి మరియు అమెరికా పండ్ల కనిపించిన వెంటనే దీన్ని ఉపయోగించి, ఒకటి బంగారం దుంప నుండి భారీ పుష్కల వ్యాధి కోసం అయితే పత్తానికి ముందు దీన్ని పత్తానికి ఉద్దేశించి ఉపయోగించాలి.

ముందు బాగోతలు: వాడుకకు ముందు ఇవ్వబడిన సూచనలను బాగోతగా చదివి పాటించాలి. ఈ కేటలాగ్‌ను పాటి యొక్క ఒరిజినల్ రికార్డులలో పెట్టి అసలైన పదార్థాలు, పరిమళ దాతలు నిల్వ చేసే గదులు లేదా అవసరం కూడా వేరుగా తాళం వేసి విడిచి నిల్వ చేయాలి. అంతేగాక దీన్ని పెట్టకు దూరంగా నిల్వ చేయాలి. దీన్ని జలుకుగేటప్పుడు పూర్తి రక్షిత దుస్తుల్ని ధరించాలి. జలుకున్న పదనీ బట్టల్ని తీసివేసి ప్యాసం చేయాలి, సబ్బు వాడుతూ, దీన్ని వాడటానికి ఎవరైనా ఉంటే, త్రాగడం లేదా తాగనివ్వడం చేయరాదు. కేటలాగ్ అంటకుండా కళ్ళలో పడకుండా బాగోత వేసుకోవాలి.

పరిశోధనల అవకాశాలు: మెరిస్‌కులతో విశారం, జాతులు, కమ్యూనిటీస్, అభివృద్ధి, చిన్నారులు.

ప్రభుత్వ పరీక్షలు: 1) పరిశోధనలతో రోగిని తాజా గాలిలోకి తీసుకురావాలి. 2) మెరిస్ కోసం లోపం చేయి పెట్టి వాటిని తీసుకురావాలి. 3) కలుషితమైన దుస్తుల్ని తొలగించాలి ఎక్కువ నీరు మరియు సబ్బుతో కలుషితమైన చర్మం మరియు దుస్తుల్ని శుభ్రం చేయాలి. 4) కళ్ళు కలుషితమైతే, శుభ్రమైన నీటితో 15 నిమిషాలు కడగాలి. అనంతరం సైడ్‌స్ట్రాప్ నుండి దూరంగా ఉంచాలి.

పరిగుణాలు: ప్రత్యేకించి ఫలదాని పరిగుణం అంటూ ఏమీ లేదు. పని అవకాశం బట్టి చికిత్స జరిపించాలి.

విషయాలకు: పరి, అమెరికా మరియు బంగారం దుంప నుండి భారీ పుష్కల వ్యాధి 24 శాతం ఎస్సె పరిశోధన చేసే మోడలుతో ఉపయోగించినప్పుడు ఏలాంటి విషయాలకు కనిపించలేదు.

ఈ కేటలాగ్‌ను నిల్వ చేసే పద్ధతులు: 1) కేటలాగ్‌ను గల ప్యాకేజీ అతర పుష్కల వ్యాధి ప్రసారానికి ఉపయోగించే గదులు లేదా ప్రాంగణాలకు దూరంగా భద్రపెట్టాలి లేదా కేటలాగ్‌ను పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి తాళం వేసి అట్టెలాగే వేరుగా భద్రపెట్టాలి.

2) దీన్ని నిల్వ చేసే గదులు లేదా అవసరం గట్టి కట్టడములు, విశాలంగా పాతగా, మంచి గాలి వెలుతురు ప్రసరించేలా వుండాలి. తద్వారా దీని అపరి పరిసరాల కలుషితం కాకుండా కాపాడుకున్న వారవుతారు.

భాగీ పదార్థాలు, మెరిస్‌తోమున ముందు మరియు పరిపరాలు కడగాలి పద్ధతి నీటిని పారవేయడం విధానము:

1. ప్యాకేజీలు లేదా మెరిస్ పాతగాని మరియు యంత్రాలకు కడిగిన నీటిని సురక్షితమైన పదార్థంలో నీరు లేదా పదార్థాలకు కాలుష్యం కలిగించు పదార్థాలతో పడవేయడం కేటలాగ్‌ను తయారుచేయాలి.

సూక్ష్మకరణదారులు మరియు అవరేపిస్త బాధ్యత. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను తిరిగి ఉపయోగించకుండా వివారించడానికి వాటిని బయట వదిలి చేయరాదు. 3. ప్యాకేజీలన్ని పింగ్లొట్టి మరియు వివాసిక ప్రాంతాలకు దూరంగా పాతి పెట్టాలి.

తయారుచేశే మిశ్రమము:

ఎ) స్ప్రేయింగ్ మేడ్ స.న.	24.00% W/W
పహాషతాల వివరాలు:	
1) ఎటోగ్లెటిబెడ్ పాటిమిథాక్రైలేట్ ఇన్ ప్రొపిలీన్ గ్లైకోల్	3.00% W/W
2) ఫ్లోటి ఇల్లాహోల్ ఎటోగ్లెటిబెడ్	2.00% W/W
3) పాటి మెథైల్ ఇథోగ్లైస్	0.50% W/W
4) ప్రొపిలీన్ గ్లైకోల్	6.00% W/W
5) గ్లొబ్బేస్ బంక	0.40% W/W
6) క్రెమినెరైజ్డ్ బాలెస్	తయారీకి వాలిసంక
మొత్తం	100.00% W/W

హెచ్చరికలు : 1.ఇది చేపట్టగలము బాగా విషమూరితమైనది గునుక, అది పొలాలల్లో బాగా తిరిగే సమయాలలో దీన్ని పేచికారి చేయరాదు. 2. ఇది చేపలను, జలచరాలను విషమూరితమైనది గునుక , దీన్ని నికరైజ్ చే మట్టినిగ్రహము /చేపలు, రోయ్యల పెంపకం పుంబుండో అదోలు అందే కాలువలు, చెరువులు, గుంబలు, ప్రవాహాలు లాంటి వాటి దగ్గర్లో దీన్ని పేచికారి చేయరాదు. 3. దీన్ని చేతుల్ మరియు కవచిత్రంలో ఇష్టమయే ప్రకారంగా పేచికారి చేసుకోవాల్సే గాని మరే విధంగా వాడరాదు. 4. కవచిత్రంలో ఇష్టమయే ప్రకారంగా టాటి డబ్బాను ముసలకొట్టి వాడవలసి చేయాలి.

ఖాళీ డబ్బాలను మరలకొట్టి వాడవలసి చేయాలి, తిరిగి వాటిని ఏ విధంగానైనా వాడటం అనేది మిశ్కేలి ప్రమాదకరమైనది గుర్తించాలి.

ಪ್ರತಿ

ಫೈನುಯುಮ್ಸ್ 24% ಎಸ್.ಸಿ.
(ಅಂತರಜ್ಞಾಪಿ ತಿಲೀದ್ರ ನಾಶಕ)

ಇದನ್ನು ಭತ್ತ ಬೆಳೆಗೆ ಬರುವ ಕೀಟ ರೋಗ, ಟೋಮೋಟೋ ಬರುವ ಅರಂಭಕ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಲೂ ಬೆಳೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಮುಟ್ಟಿ ರೋಗವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸೀಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಿಧಾನಗಳು:

ಬೆಳೆ (ಗಂ)	ಕೀಟಗಳ ನಾಮಕರಣ	ಹೋಮ್/ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ			ಸಂವಿತ ಸಂಚಾರಿವಿಷದ ಪಾಲು ಕೆಲವು ತದನಿತ ಕೀಟವಿಕೆ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
		ಎ.ಎ. (ಗ್ರಾಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)	ಫ್ಯಾನ್‌ಲೆಟ್ (ಮಿಲಿ)	ಮಿಕ್ಸರ್ (ಲೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)	
ಭತ್ತ	ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ (ಸೀಡ್‌ಬೋರ್ನ್‌ನಿಮಾ ಕೀಟಾಂಶ)	90	375	500	28
ಟೋಮೋಟೋ	ಅರಂಭಕ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ	120	500	500	7
ಅಲೂಗಡ್ಡೆ	ಕಪ್ಪು ಮುಟ್ಟಿ ರೋಗ (ವೀಜೋಪಾತ)	೧೬ ಗ್ರಾಂ ಎನ್/10 ಕೀಟ ಅಲೂಗಡ್ಡೆ	2.5 ಮಿಲಿ/10 ಕೀಟ ಅಲೂಗಡ್ಡೆ		ಅಲೂಗಡ್ಡೆ ಸೀಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಔಷಧ/ದ್ರವ್ಯವು ತಿಳಿಸಿದ ಬಳಕೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬಳಕೆಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಇದು ಜಲಕವರ್ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಮರು-ಪ್ರದೇಶ ಅವಧಿ: 24 ಗಂಟೆಗಳು

ಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು: ಅದ್ಭುತವಾದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆಳಿತೆ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ. ಆ ಬಳಿಕ ಬೇಕಾದ ಉಳಿದ ನೀರನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸುರಿಯುತ್ತಲೇಕಡೆ ಹಬ್ಬಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿ. ಇದು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಇದು, ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೂಯರ್ ಬಳಸಬೇಕು.

ಕಿರೀಡ್, ಕಾಶಕದ ಪಾಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ವಿಂಟೇಜ್ ಪದಾರ್ಥ, ಮತ್ತು ತೊಳೆ ನೀರಿನ ವಿತರಣೆ:

1. ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್‌ನ್ನು ಅಥವಾ ಪಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮೊದಲೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಪರ್ಲಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬಲ-ಪಾಲಿಥಿನ್ ಅಥವಾ ಪರಸರ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಉಪಕರಣದ 0.50mm ಡಿಮೆಟರ್ ಗಳು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ತಯಾರಕರು, ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಟರು ಮತ್ತು ಸುಗಮಗಾರರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್‌ನ್ನು ಮರು-ಬಳಕೆಯಾಗದಂತೆ ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ವಿತರಿಸುವರು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್‌ನ್ನು ಬೆಕ್ಕಾಗಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಬಳವಳಿಸಿಕೊಂಡ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹುಳು ಹಾಕಬೇಕು.

ರಣಾಯನಿತ ಸಂಯೋಜನೆ

ಫೈಬ್ರಿಂಫೈಬ್ರಿಡ್

240.08% W/W

ಸಪ್ತಾಪಕಗಳ ವಿವರಣೆ

- | | |
|--|-----------|
| 1). ಇಥಾಕ್ರೀಲೇಟ್ ಪಾಲಿಮೆಥಾಕ್ರೀಲೇಟ್ ಫೈಬ್ರಿಡ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್ ಸರ್ಟಿ | 3.00% W/W |
| 2). ಫ್ಯಾಟೀಡ್‌ನಾಲ್ ಇಥಾಕ್ರೀಲೇಟ್ | 2.00% W/W |
| 3). ಪಾಲಿ ಫೈಮಿಥೈಲ್ ಸ್ಟೈರೋಕ್ಲೋನ್ | 0.50% W/W |
| 4). ಫೈಬ್ರಿಡ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್ | 6.00% W/W |
| 5). ಕ್ಲಾರ್ಫೇಟ್ ಗಮ್ | 0.40% W/W |
| 6). ಡಿಮೆನಲೈಸೆಡ್ ವಾಟರ್ | 99.99% |

ಒಟ್ಟು

100.00% W/W

ವಿಷಯಕೀಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ : 1. ಇದು ಜೇನು ನೋಣಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕರ, ಜೇನು ನೋಣಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಾರದು. 2. ಮೀನು ಮತ್ತು ಬಲಕದ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾದುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಸೆಲೆ ಇರುವಲ್ಲಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮತ್ಸ್ಯ ಕೃಷಿ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. 3. ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಲೀಫ್ ಲೀಟ್ ನೀಡಿರುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಜೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. 4. ಬಂದಿರುವ ಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಲೀಫ್ ಲೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ನಾಶಪಡಿಸಿರಿ. ಬಂದಿರುವ ಧಾರಣೆಗಳ ಮರುಬಳಕೆ ಅಪಾಯಕರ.

அவுட்

**தைப்லூஸமைட் 24% எஸ்.சி.
[உருவி செயல்படும் யூசாணக்கொல்லி]**

இது நெல்பயிரை பாதிக்கும் இலை உறை கருகலையும் தக்காளி பயிரில் ஆரம்ப இலை கருகலையும் மிகவும் பயனுள்ள வகையில் கட்டுப்படுத்துகிறது மற்றும் உருளைக்கிழங்கு பயிரில் ஏற்படும் பிளாக் ஸ்கப் நோயை கட்டுப்படுத்துவதற்காக விதைகளில் கலந்து உபயோகிக்கப்படுகிறது.

உபயோகிப்பதற்கான பரிந்துரை:

பயிர்கள்	தோப்பாளின் பொதுவான பெயர்	மருந்து அளவு/ஹெக்டேருக்கு			கடைசி தெளிப்பு தொடங்கி அறுவடை வரைக்குமான காலதாமதம் காலம்
		ஏ.ஐ (கிராம்)	ஃபார்முலேஷன் (மிலி)	கரைப்பான் (லிட்டர்)	
நெல்	இலைவறை கருதல்நெல் (ஸ்கோட்லிப்) நோயாளி	90	375	500	28
தக்காளி	இலைவறையுறை முன்கருக்கல்நெல்	120	500	500	7
உருளைக்கிழங்கு	பிளாக் ஸ்கப் மிஷ்கன்ஸ் நெளிந்த உயிரகத்தின்	15 க்கு மூன்று கிலோ பொட்டேடோ க்யூபஸ்	15 மீட்டர் கிலோ பொட்டேடோ க்யூபஸ்		உருளைக்கிழங்கு விதைகளில் கலக்கப்பட்டு உபயோகிக்கிறது

எச்சரிக்கை: இந்த வேபிள்ஃட்டெட்டில் குறிப்பிட்டுள்ளவற்றுக்கு நீங்கள் இதை வேறெந்த பயிரிலும் உபயோகிக்கக் கூடாது. இந்த புளாட்கட் நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு விஷத்தன்மையை ஏற்படுத்தக் கூடியது. ஆகவே இந்த மருந்தை மீள் வளர்ப்பு பண்ணை அருகே மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உபயோகிக்கக் கூடாது.

திரும்ப தாக்கும் காலம்: 24 மணி நேரம்

பயன்படுத்த குறிப்புகள்: தேவையான அளவு மருந்தை எடுத்துக்கொண்டு அதில் சிந்தித்து நள்ளி சேர்த்து ஒரு குச்சியால் நன்றி கலக்கவும். பிறகு தெளிப்பு அளவுக்குத் தேவையான மீதி தண்ணீரையும் சேர்த்து நன்றி குறுக்கி அதில் அளவு தெளிப்புக்கு நாளைக் தெளிப்பான் மூலம் தெளிக்கலாம்.

மருந்தை உபயோகிக்கும் காலம்: திப்புளாமைமடு 24% 5C முனற்பே நெல் மற்றும் தக்காளி பயிர்களைத் தாக்கும் இளம் உறை கருகல் மற்றும் ஆரம்ப இளம் கருகல் பயிர்களில் தோன்றத் தொடங்கியுமே உபயோகிக்க கூடிய எலிட்மிக் பூஞ்சைக்கொல்லியாகவும் உருளைப்பயிர் ஒருமேவளை மிகக் கீழ்க் கொடி நெல் தாக்கிவிடுகாமாள்.இதை விதைப்பதற்கு முன்பு விதைமிக் கலந்து தெளிக்கலாம்.

முன்னெச்சரிக்கைகள்: பயன்படுத்துவதற்கு முன் எலிட்மிக் உவமையாக படிக்கவும் மற்றும் குடிப்பதனால் பின்பற்றவும். பூசனங்கொல்லியை அசல் செளக்களங்களிலேயே உளவுப் போட்டுகள் மற்றும் எலிட்மிக் தீவனங்களில் இருந்து மற்றும் குழந்தைகளின் கைகளுக்கு எட்டாமல் பத்திரமாக பூட்டி வைப்புகள். கைபாலாம்பொது பாதுகாப்பான ஆடை அணிப்புகள்.

விஷமூட்டானதன்னை அறிகுறிகள்: மருந்தை விழுங்கிவிடுந்தால் குமட்டல், வாந்தி, அடிவயிற்றில் வலி வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் எரிச்சல்.

முதல்தவி நடவடிக்கைகள்: 1.உள்ளுக்குள் விழுங்கிவிடுந்தால் பாதிக்கப்பட்டவரை நல்ல சாற்றோட்டமுள்ள இடத்திற்கு கூட்டச்செல்வவும். 2) உள்ளுக்குள் விழுங்கிவிடுந்தால் தொண்டைக்குள் விரகம் விட்டு வாந்தி எடுக்கச் செய்யவும். 3) மசைத்த உருபுகளை அப்பாடுபடுத்தவும். அத்தகுமான துள்ளிகளை போப்பு போட்டு துளிக்கவும். மருந்து பட்ட, ஏறும்பு குதிரை போட்டு போட்டு சிறுரை கருவலும் 4) கண்களில் மருந்தி் தெறித்திருந்தால் நல்ல கத்திரை தண்ணீரில் 15 நிமிடங்களுக்கு கண்வை உருவம் தேவைப்படுவது போல் மருத்துவரின் உதவினைப் பெறவும்.

விஷ முறிவு மருந்து: குறிப்பிட்ட விஷறிவு மருந்து ஏதும் இல்லை. அறிகுறிக் சேற்றுகிள்கை அளிக்கவும்.

தாவர நச்சுத்தன்மை : நெல், தக்காளி மற்றும் உருளைக் கிழங்கு பயிர்களில் பரிந்துரைத்த டோஸில் திப்புளாமைமட் 24% ந.இ.இ. உபயோகிக்கும்போது இந்த தாவர நச்சுத்தன்மையும் கண்டறியப்படவில்லை.

பூஞ்சைக்கொல்லி கலன்களை பதிர்ப்படுத்த குறிப்பான பிந்தனைகள்:

1. பூஞ்சைக்கொல்லி அடங்கியுள்ள பேக்மேடுகளை தனிபறையினே அல்லது இதர பெருட்களை விடும் போது வைக்கும் மும் அல்லது இடத்தை விட்டு தூறாக பதிர்ப்படுத்தி வைக்கவும். அல்லது மருந்தின் அளவு மற்றும் பூஞ்சைக்கொல்லியின் தன்மையைப் பொறுத்து தனியே ஒரு அளவளியில் பூட்டு போட்டு பூட்டி வைக்கவும்.

2. பூசணப்பொல்லி கலன்களை பத்திரப்படுத்தி வைக்கப்படும் இடம் நல்ல உட்டுமானம், உள்வடிக் கால் வெளியீடு மற்றும் காந்தோட்டம் உடன் மருத்து ஆலிபாகி காந்தளமாக படுத்தாமல் தவிர்க்க போதுமான புறப்பாளவுடனும் இருக்க வேண்டும்.

பயன்படுத்திய கொள்கைகள், எஞ்சிய மருத்து மற்றும் பூஞ்சாணக்கொல்லி கழுவுதலை அப்பற்றப்படுத்துதல்:

1. மருத்தின் பேக்கேஜ்களை அல்லது உபரி மருத்து மற்றும் மெஷினை கழுவும் எஞ்சல்களை கற்றுக்குடும் அல்லது நீர்நிலைகளை மாகபடுத்தாத வகையில் பாதுகாப்பாக அப்பற்றப்படுத்துவது மருத்தின் உற்பத்தியாளர்கள், மருத்தின் ஸ்பரிசுலேட்டர்களின் கடமையாகும். 2. உபயோகித்த பேக்குகள் மறுஉபயோகம் ஆவாத நவீனக்கும்பொருட்டு அவற்றை அப்படியே வெளியில் போட்டு வைக்கக் கூடாது. 3. பேக்கேஜ்களை உடைத்து நகர்த்தி அல்லாது ஆன் நடமாட்டப்பிழைத்த இடத்தில் ஆழமாக குழி தோண்டி புதைத்து விட வேண்டும்.

இரசாயனக் கலவை கலவை:

1. எதர்ப்புலுலமைட் தீர்மானம்	24.00% W/W
துணைப்பொருட்களின் விபரங்கள்:	
1. எதரக்சிலேட்டட் பாமெந்தரக்சிலேட்டட் ப்ராஸ்பலின்களாகும்	
2. ஸ்டேப்டி ஆல்கஹால் எதேக்சிலேட்டட்	2.00% W/W
3. பா எட்டெயில் ஸ்டேப்டி	0.50% W/W
4. ப்ராஸ்பலின்களாகும்	6.00% W/W
5. எதரக்சிலேட்டட்	0.40% W/W
6. டிபென்டெயில் வாட்டர்	தேவையான அளவு
மொத்தம்	100.00% W/W

எச்சரிக்கை அறிவிப்பு: 1. இத்தயாரிப்பு தேனீக்களுக்கு நஞ்சாகும் என்பதால், தேனீக்கள் கறுகறுப்பாகப் பறந்து கொண்டிருக்கும் காலத்தில் மருத்தைத் தெளிக்கக் கூடாது. 2. நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு கொடிய நஞ்சாக செயல்படும் என்பதால், நீர் நிலைகள், செயற்கை மீன் வளர்ப்பு மற்றும் நீர் வேளாண்மை இடங்களுக்கு அருகில் பயன்படுத்தக் கூடாது. 3. இந்த லேபில் மற்றும் கையேட்டில் குறிப்பிட்டிருக்கும் பயிர்களைத் தவிர்த்து வேறு பயிர்கள் மீது தெளிக்கக் கூடாது. 4. கையேட்டிலுள்ள குறிப்புகளைப் பின்பற்றி கொள்கைகளை அழித்துவிடவும்.

காலி கொள்கைகளை மறுஉபயோகம் செய்வது அப்பத்தானது

ഒരു

തൊഴിലുടമയ്ക്ക് 24% SC (ആന്തരിക പ്രവർത്തനമുള്ള കുമിശ്രനാശിനി)

നെല്ലിലെ പൊതുവട്ടം, തക്കാളിയിലെ തുടക്കത്തിലുള്ള വാട്ടം തുലനീയമാക്കുന്നതിനും തുരുളക്കിഴങ്ങ് വിളയിലെ ബ്ലാക്ക് സ്കർഫ് രോഗം തടയുന്നതിന് വിത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. ഉപയോഗത്തിനുള്ള മൂലധനം:

വിളകൾ	കിടങ്ങയുടെ സാധാരണ പേര്	മോണെറ്റ്/ഹെ.			അവസാന തളിയാക്കിതും വളവേച്ചിതും തുടർന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാലാവധി (ദിവസം)
		സം. (ഗ്രാം)	മുപികളണം (മില്ലി)	തീർപ്പിടത്തി (മില്ലി)	
നെല്ല്	പൊതുവട്ടം (വിതാകടാബിതം തൊഴിലി)	90	375	500	28
തക്കാളി	തുടക്കത്തിലുള്ള വാട്ടം	120	500	500	7
തുരുളക്കിഴങ്ങ്	ബ്ലാക്ക് സ്കർഫ് (വിത്ത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ)	0.6 ഗ്രാം സെ. / 10 കിഗ്രാം തുരുളക്കിഴങ്ങ്	2.5 മില്ലി/10 കിഗ്രാം തുരുളക്കിഴങ്ങ്		തുരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ വിത്ത് ഉപയോഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു

മുന്നറിയിപ്പ്: ഈ ലേബലിൽ/ലേബലുകളിൽ എടുത്തു ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നവ ഒഴികെ മറ്റ് വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്, ഈ ഉല്പന്നം ജലജീവികൾക്ക് വളരെ വിഷകരമാണ് അതിനാൽ ജലകൃഷി ചെയ്യുന്നിടത്തും അതിന്റെ പരിസരങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കരുത്.

പുനഃപ്രയോജനകാലാവധി: 24 മണിക്കൂർ

ഉപയോഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ: ആവശ്യമുള്ള അളവ് അളന്നെടുത്ത് കുറച്ചു വെള്ളവുമായി കൂട്ടിമോശിയിക്കുക. തുടർന്ന് ബാക്കി വെള്ളവും ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം തുളക്കി മോശിയിക്കുക. കൂടുതൽ അളവിൽ തളിക്കാനുള്ള നാഗ്സാക് സ്ലേപയർ പോലെയുള്ള ഹെവി വോളം സ്പ്രേകൾ ഉപയോഗിക്കുക.

മുൻകൈയടിക്കൽ: ലോകത്ത് ശ്രദ്ധാർഹമായ വാഗ്ദാനം. നീക്കംമുഖേന അനുവാദം ലഭിക്കുക. മുൻപ്രതിപാദിനി അതിന്റെ തരണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൈയേറ്റെടുത്ത്, ആഹാരം സാധനങ്ങളിൽ നിന്നും കലശലായെടുക്കൽ നിന്നും മുരളിമുഖേന, കുടുംബത്തിൽ എത്താത്തതിൽ അത്യാവേശം സാധിക്കുക. തന്റെ കൈകളാൽ ലഭ്യമാകാൻ സാധിക്കാത്ത വാഗ്ദാനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. മേൽ നോക്കാതെ വാഗ്ദാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുക. മേൽനോക്കം വാഗ്ദാനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. യാദാർഹം സോപാദം സെന്ററലൈസേഷനിൽ ന്യൂനമൂലം കഴിയുക. ഇത് ഉൾപങ്കും കൈകളാൽ ലഭ്യമാകാൻ ഒന്നും നിന്നുകൊണ്ട്, കയ്യിൽനിന്നും, മുൻകൈയടിക്കുക, ഫലപ്രദം ലഭിക്കാത്ത ആദ്യം. പ്രതികരണം, കുടുംബം ചർച്ചയിലും പാർശ്വഭാഗം പ്രതികരണം

[illegible]

സംസ്കൃതികര്യം: തെളി, തക്കാളി, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വിളകളിൽ ഫിഫോസാറൈഡ് 24% എസ്സി
 ജുവെസ് ആപാർഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന രോഗാതിൽ സംസ്കൃതികര്യ

1. കൂമിൻതാമിനിയിലും അല്ലെങ്കിലെയും സ്വഭാവത്തെയും ആശ്രയിച്ച് കൂമിൻതാമിനിയിൽ അടങ്ങുന്ന പാക്കൽ മുറ്റ് വസ്തുക്കൾ സ്റ്റാർ ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മുറി അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടത്തിന് നിന്ന് അകന്ന് പ്രത്യേകം മുറിയിലോ കെട്ടിടത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകം അലവാരത്തിന് താഴെ പട്ടികയിൽ നൽകിക്കൊണ്ടു.

2. കൂടിയതിനായി സുരക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കെട്ടിടവും മറ്റിയും നല്ല കെട്ടുറപ്പുള്ളതും വെളിച്ചവും വായുസഞ്ചാരവും ഉള്ളതും, തുറപ്പേടിലാത്തതും ബാഷ്പ മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ആവശ്യത്തിന് വലിപ്പമുള്ളതും ആയിരിക്കണം.

ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ പാക്കേജുകൾ, അധികം വന്ന സാധനങ്ങൾ, കൂലിയിൽ നാശിതി കഴുതിയ വെള്ളം എന്നിവ കളയുന്ന വിധം:

1. പരിസ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം മലിനമാകുന്നത് തടയുന്നതിന് പാക്കേജുകളും മിഷ് മുള്ളു വസ്തുക്കളും കഴുതിയ വെള്ളവും സുരക്ഷിതമായ വിധത്തിൽ നശിപ്പിക്കേണ്ടത് കൂലിയിനാശിനിയുടെ നിർമ്മാണങ്ങളുടെയും രൂപീകരണക്കാലയളവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന വരുടെയും ചുരുങ്ങിയതായിരിക്കും. 2. ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ പാക്കേജുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് തടയാൻ അവ പുറമെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. 3. പാക്കേജുകൾ തകർത്ത് ആൽടാക്സ്റ്റുള്ള സ്ഥലത്തുനിന്ന് അകലെയാക്കി കുഴിച്ചുമാറ്റണം.

മാസയടനം:

1. മൈക്രോസാലൈഡ് സ.എ. 24.00% WW

സഹായ ഘടകങ്ങൾ

1. എഞ്ചനാക്സിഡൈഡ് പോളിമെറൈക്രിയേറ്റ് 3.00% WW

ഇൻ ഫെഫിലിൻ ഐസോക്യൻ

2. ഫാറ്റി ആൽകൈറാൾ എഞ്ചനാക്സിഡൈറ്റ് 2.00% WW

3. പോളി മൈഥിലൈഡ് സിലോക്സേൻ 0.50% WW

4. പ്രൊഫിലിൻ ഐസോക്യൻ 6.00% WW

5. ക്സാന്തേൻ ഗ്ലൂ 0.40% WW

6. ഡീഫിനാലൈസീഡ് വാട്ടർ 100% WW

ആകെ

മാറ്റമുള്ള പ്രസ്താവന: 1. ഈ ഉൽപ്പന്നം തേനിച്ചുകൾക്ക് ഉയർന്ന വിഷക്കാര്യം ഉള്ളതാണ്. തേനിച്ചുകൾ സജീവമായി ഭക്ഷണം തേടുന്ന സമയങ്ങളിൽ തളി പ്രയോഗം ലഭിക്കാത്തതും. 2. ഈ ഉൽപ്പന്നം മത്സ്യങ്ങൾക്കും മല ജീവികൾക്കും ഹാനികരമായതുകൊണ്ട് മലാറയങ്ങൾക്കും മലകൃഷി നടത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങൾക്കും മത്സ്യകൃഷി നടത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങൾക്കും അതികൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കരുത്. 3. മാരകമായും മൃഗമൃഗങ്ങളെയും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉപയോഗിക്കരുത്. 4. ഉപയോഗ ശേഷം മലയുടലിലായി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പോലെയെ കണ്ടെയ്നർ നശിപ്പിക്കുക.

ഒഴി കണ്ടെയ്നറുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്.

ওটে

থাইমুন্ডামাইড 24% এস সি
(অন্তর্বাহী ছত্রাকনাশক)

এটি ধানের শীথ ব্লাইট এবং টমেটোরে অগেস্তী বুলসা এবং আলু ফসলের ব্ল্যাক
স্ক্রিফ রোগ নিয়ন্ত্রণে অত্যধিক কার্যকরী।

ব্যবহারের সুপারিশ:

কন্যা (ওলি)	রোগের প্রচলিত নাম	মোটজল/হেক্টর:			সেখরার করা পের বোর দিয়ে গাছ (মিঃ) এর মধ্যে অপেক্ষার সময়
		এ. আই. (গ্রাম্ব)	ফল্‌লেন (মিলি)	ডাইনিক্স (লিটার)	
ধান	শীথ ব্লাইট (গ্রেইজকটলিয়া মালান্দি)	90	375	500	28
টমেটো	অগেস্তী বুলসা	120	500	500	7
আলু	ব্ল্যাক স্ক্রিফ (বীজ উপচার)	0.6 কি.এ আই./10 হেক্টর আলু চিটবার	2.5 লিটার/10 হেক্টর আলু চিটবার		আগতে বীজ উপচারের জন্যে ব্যবহার করা হয়।

সতর্কতা: লেবল লীফলেটে দেওয়া ফসল ছাড়া অন্য কোনো ফসলের ওপর প্রয়োগ করবেন না।
এটি জলীয় স্তরের জন্য বিখ্যাক। সেইজন্য জলীয় কৃষিতে আর তার আবেশপাশে এর ব্যবহার
করা উচিত নয়।

পুনঃ প্রবেশ অন্তরাল 24 ঘন্টা

ব্যবহারের নির্দেশ: প্রয়োজনীয় পরিমাণ উৎপাদ মেগে লিন এবং অম্ল পরিমাণ জলে উই
ভালোভাবে মুলান। তারপর উল্লিখ মতো বাদবাকী জলের পরিমাণ যোগ করে জোরদারভাবে
মিশ্রণ করে উক্ত ডলুম স্প্রে'র ব্যাকসাক স্প্রেয়ারের মাধ্যমে উক্ত জলুমে প্রয়োগের জন্যে।

প্রয়োণের সময়: খাইফুজামাইড 2-4% এস সি এক অরুপবাহী ছত্রাকনাশক। এর প্রয়োগ ধান আর চমেটোর ফসলে ক্রমশঃ শীঘ্র রাইট এবং অরুপজী কুলসা রোগের প্রারম্ভিক লক্ষণ দেখা দিলে করবেন। আলুর ফসলে ব্লাক ব্লাট ব্রোংহের জন্যে এর প্রয়োগ বপনের আগে বীজ উপচারের রূপে করতে।

সরুর্কজা: বাবহারের পূর্বে লেবেন লীফলেট মাল দিয়ে পড়ুন ও নির্দেশাবলী মেনে চলুন। ছত্রাকনাশকটি মূল পাত্রে জরে খাদ্য পদার্থ ও পশুখাদ্য থেকে দূরে রাখা শিশুদের নাপালের বাইরে তালো জ্বক করে মজুত করবেন। বাবহার করার সময়ে সুরক্ষামূলক পোশাক পরবেন। দূষিত হলে পোশাক বদলে দেবেন। দূষিত পোষাকও মেহাংশ জলোজ্জরে সাবান ও জল দিয়ে ধুয়ে নেন। উপপাদটি বাবহার করার সময়ে খাওয়া, জল পান, দূষণ বা তামাক চেবানো নিষেধ। শ্বাসে যাওয়া, এবং চোখেও ফুকের সংস্পর্শ এড়ান।

বিষাক্ততার লক্ষণ: পিলে ফেললে পারমি, বমি করা, তলাশেট বাথা, পেটউথারাপ, অস্থির হতে।

চারাপাছ বিষাক্ততা খাইফুজামাইড 2-4 শতাংশ এস সি এর অনুমোদিত করা মাছায় ধান, উমেটো আর আলুর ফসলের মধ্যে কোনো চারাপাছ বিষাক্ততা পাওয়া যায় নি।

প্রাথমিক চিকিৎসা: 1) শ্বাসে গেলে রোগীকে মুক্তবায়ুতে নিয়ে পোতহবে 2) পীলে ফেললে, টীপজায় অর্পুল চুকিয়ে বমি করবেন। 3) দূষিত পোষাক বদলে দেবেন, দূষিত ফু ও পোষাক সাবান ও প্রুর জল দিয়ে ধুয়ে নেবেন। 4) চোখ দূষিত হলে, 15 মিনিটের পরিস্থার জল দিয়ে চোখ ধুয়ে নেবেন। যদি প্রয়োজন হয় চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন।

প্রতিষেধক: দুর্নিষ্ট কোনও প্রতিষেধক জানা নেই, লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করবেন।

খাইফুজামাইড: 2-4 শতাংশ এস সি এর অনুমোদিত করা মাছায় ধান, উমেটো আর আলুর ফসলে কোনো চারাপাছ বিষাক্ততা পাওয়া যায় নি।

ছত্রাকনাশক মজুত করার জন্যে দুর্নিষ্ট বাবস্থা: 1. ছত্রাকনাশক সঞ্চালিত পাক অব্যাহা সামগ্রী মজুতের জন্য ব্যবহৃত ঘর বা স্থান থেকে দূরে পৃথক ঘর বা স্থানে মজুত করতে হবে অথবা ছত্রাকনাশকের পরিমাণ ও প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে পৃথক আলমারিতে তালো বন্ধ করে রাখতে হবে। 2. ছত্রাকনাশক মজুতের জন্যে ব্যবহৃত ঘর বা স্থানটি হাতে হবে দুর্নিষ্ট, শুকনো, সুঅবাসিত এবং বাতরিত তথা ছত্রাকনাশকের বাষ্পতার দ্বারা পরিবেশের দূষণ রোধ করতে পর্যাপ্ত পরিসরমুক্ত।

ছত্রাকনাশকের ব্যবহৃত প্যাকেজ, উদ্ভূত পদার্থ এবং তরলাদির বিনিষ্টকরণ: ১. ছত্রাকনাশকের নির্মাতা, ফর্মুলাকারী এবং প্রচলনকারীর অবশ্যই কর্তব্য হবে প্যাকেট বা উদ্ভূত পদার্থ এবং তরলাদি এমন নিরাপদ উপায়ে বিনিষ্ট করা হয় যাতে পরিবেশ বা জলের দূষণ প্রতিরোধ হয়। ২. ব্যবহৃত প্যাকের পূর্বব্যবহার রোধ করতে উঁচা যত্রতত্র ফেলে রাখবেন না। ৩ প্যাক ভেঙ্গে জনবসতি থেকে দূরে পুতে ফেলাতে হবে।

রাসায়নিক সংমিশ্রণ :

থাইটমিথাইল স: উ: 24.00% ওজন/ওজন

সংবাহকের বিবরণ

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| ১) প্রোপাইলিন প্রাইজিলেইট পলিমেরাথাইল | 3.00% ওজন/ওজন |
| ২) ফ্যাটি অ্যালকহল ইটথ্রয়েলেট | 2.00% ওজন/ওজন |
| ৩) পলি জাইটমিথাইল সিলোক্সেন | 0.50% ওজন/ওজন |
| ৪) প্রোপাইলিন গ্রাইটকল | 6.00% ওজন/ওজন |
| ৫) জ্যাক্সন গ্রাম | 0.40% ওজন/ওজন |
| ৬) ডিমিনারালেটজড জল | পর্যাপ্ত পরিমাণ |
| মোট | 100.00% ওজন/ওজন |

সতর্কতা মূলক বিবৃতি: ১. এই পণ্যটি মৌমাছদের জন্য বিষাক্ত, মৌমাছদের খাদ্যসংগ্রহের সময়কালে স্প্রে প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। ২. মাছ, জলজ প্রাণীদের জন্য বিষাক্ত তাই এই পণ্যটি জলাধার, জলজ চাষ এবং মস্যা চাষের নিকটে প্রয়োগ করা উচিত নয়। ৩. লেবেল এবং লিফলেটে উল্লিখিত ব্যবহার বাতীত অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিত নয়। ৪. লিফলেটের নির্দেশ অনুযায়ী খালি পাত্রগুলি নিষ্পত্তি করুন।

খালি পাত্রের পুনর্ব্যবহার বিপজ্জনক। 31

ওতে থাইফুজামাইড ২৪% এচ চি (অন্তর্বাহী ভেকুৰনাশক)

ঘনৰ শীথ ব্লাইট ৰোগ, বিশাহীৰ আৰ্লি ব্লাইট ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত আৰু আলু খেতিত হোৱা ব্ৰেক জাৰ্ফ ৰোগৰ বীজ প্ৰতিৰোধত ই অতিশয় কাৰ্য্যকৰী।

ব্যৱহাৰৰ অনুমোদন:

শস্যৰ (নাম)	কীটবোৰৰ সাধাৰণ নাম	পৰিমাণ প্ৰতি হেক্টৰ			অগ্ৰিমৰাৰ ছাটগুৰাৰ পৰা খসা চপোৱাজি (দিনত) ৪ৰ থকা সময়
		এ. আৰ্ছি (গ্ৰাম)	বিৰিগন্ধকৰণ (এম এল)	পানীৰ (পৰিমাণ)	
ধান	বীথ ব্লুথ (বিজিউমিয়া চ'লডি)	90	375	500	28
বিলাহী	আৰ্লি ব্লাইট	120	500	500	7
আলু	ব্ৰেক জাৰ্ফ (বীজ উৎপাদ হিচাপে)	0.6 জি.এ. আৰ্ছি/10 কেজি আলুৰ বীজ	2.5 এম এল/10 কেজি আলুৰ বীজ		আলুৰ বীজ প্ৰতিযেথক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়

সতৰ্কতা: এই জাৰ্ভেল/প্ৰচাৰপত্ৰত নিৰ্দ্ধাৰিত কৰি দিয়া শস্যৰ বাহিৰে আন শস্যত ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। এই উৎপাদন জালচৰ জীৱসমূহৰ বাবে অতিশয় বিষজনিত পণ্ডিকে মীনপালন কৰা গৈছে বা তাৰ ওচৰে-পাজৰে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে।

পুনৰ-প্ৰৱেশ সময়: 24 ঘণ্টা

ব্যৱহাৰৰ নিৰ্দেশ: প্ৰয়োজনীয় পৰিমাণৰ ভেকুৰনাশক ভূমি তৈ সামান্য পৰিমাণৰ পানীৰ সৈতে ভালদৰে ঘূৰি মিহলাব। তাৰপাছত নেপথ্যক পেয়াৰাৰ দৰে উচ্চ আঁহতলৰ পেয়াৰাৰ দ্বাৰা প্ৰয়োগ কৰাৰ বাবে উল্লেখিত কৰা অনুযায়ী বাকী পৰিমাণৰ পানী যোগ দি ভালদৰে লৰাই ব্যৱহাৰৰ বাবে মাজু কৰিব।

প্ৰৱেশৰ সময়: ঘাইফুজামাইড 24% SC হ'ল এটা প্ৰণালীগত ভেকুৱনাশক যিটো প্ৰয়োগ কৰিব লাগে ধান আৰু বিলাহীৰ খেতিত যথাক্ৰমে শীঘ্ৰে ব্লাইট আৰু আৰ্লি ব্লাইট ৰোগৰ আবিষ্কাৰৰ সময়ত। আনৰূপে ব্ৰেক ক্ল'ৰ্ক ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াক বীজৰোপণৰ আগতে বীজ উপচাৰ হিচাপে প্ৰয়োগ কৰা উচিত।

সৰ্ত্তকতা- ব্যৱহাৰৰ আগেয়ে সেলেলখন মনোযোগ দি পঢ়ি ল'ব আৰু নিৰ্দেশসমূহ মানি চলিব। এই ভেকুৱনাশক খাবা সামগ্ৰী আৰু পণ্ড খাদ্যৰ পৰা আঁতৰত, সৰু লৰা-ছোৱালীয়ে পাব নোৱাৰাকৈ কোঠাত তলা মাৰি ইয়াৰ মূল পেকেজত মজুত ৰাখিব। ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত সুৰক্ষিত সাজ-পোছাক পিন্ধি ল'ব। দূষিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত লগে লগে সাজ-পোছাক বুলিব, দূষিত কাপোৰ-কানি আৰু শৰীৰৰ অংশসমূহ চাবোন যিহে ভালদৰে ধু'ব। ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰি যাবাৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ ছোৱা-চোৱা বা ধূমপানকৰিব। ইয়াক উশাহ-আঁহৰে তথা চকু আৰু ছালত লাগিবলৈ নিদিব।

বিষাক্ৰিয়াৰ লক্ষণসমূহ: বমিভাৱ, বমি ছোৱা, উৰ্বৰীয় বিষ, অতিসাৰ, গিলিলে ছোৱা জ্বলন।

প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ ব্যৱহাসমূহ: 1) যদি উশাহত ভিতৰলৈ যায় তেন্তে বোগীক সতেজ বায়ুৰ মাজলৈ আঁতৰাই নিয়ক। 2) যদি গিলি দিয়া হয় তেন্তে ডিঙিত আঙুলি ভৰাই বমি কৰোৱাই দিয়ক। 3) সন্দেহিত কাপোৰ আঁতৰাই পেলাওক; প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ পানী লৈ চাৰোমেৰে সন্দেহিত ছাল আৰু বস্ত্ৰ প্ৰক্ষালন কৰক। 4) যদি চকু সন্দেহিত হয়, তেন্তে পৰিষ্কাৰ পানীৰে 15 মিনিটৰ বাবে প্ৰক্ষালন কৰক। যদি প্ৰয়োজন হয় এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব।

প্ৰতিবেদক: কোনো বিশেষ প্ৰতিবেদক বিষয়ে জানা নাযায়, লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা কৰিব।

উদ্ভিদ-বিষাক্ৰমতা: ঘাইফুজামাইড 24 শতাংশ এছ চী অনুমোদন দিয়া ছোৱা মাহাত ব্যৱহাৰ কৰিলে ধান, বিলাহী আৰু আনৰূপে ফলত কোনো ধৰণৰ উদ্ভিদ-বিষাক্ৰমতাৰ সৃষ্টি নহয়।

ভেকুৱনাশক মজুত ৰখাৰ বাবে উদ্দেশ্যীয় অৱস্থা: 1. ভেকুৱনাশক থকা পেকেজ আন সা-সামগ্ৰী মজুতকৰণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা কোনো বা ষ্টোৰঘৰৰপৰা দূৰৈত পৃথক কোঠা বা ষ্টোৰঘৰত মজুত কৰিব লাগে বা ভেকুৱনাশকৰ পৰিমাণ তথা প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তপাবদ্ধ কৰি থোৱা

পৃথক আলমবীত বাখিব লাগে। 2)ভেতুকনাশক বখা কোঠা বা ঠাইগেখৰ সুনিৰ্মিত,জ্বালদৰে পোহববুজ,বত্ৰহ চলাচল কৰিব পৰা আৰু ভেতুকনাশকৰ বাষ্পৰ ধাৰা দূৰিত হব নোৱৰাকৈ যথেষ্ট আহল-বহল হোৱা উচিত।

খাদী পেকেজ, অৱশিষ্ট দ্ৰব্য আৰু ধোৱা-পখলা কৰা পানী আদিৰ নষ্টকৰণ:-। পাবিৰেশিক বা জল প্ৰদূষণ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰাকৈ পেকেজ বা বাহি হোৱা সামগ্ৰীবোৰ নিৰাপদভাৱে পেলাই দিয়াটো আৰু গ্ৰহাচলন কৰাটো ভেতুকনাশকৰ উত্থাননকাৰী, সুৰুৰক্ষকাৰী তথা অপাৰেউবসকলৰ কৰণা হহব। 2. ব্যৱহাৰ কৰা পেকেজবোৰ বাহিৰত এৰি থৈ আহিব নালাগে যাতে পুনৰ-ব্যৱহাৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা যায়। 3. পেকেজবোৰ ভাঙি পেলাব লাগে আৰু বসতিক্ষেত্ৰৰপৰা দূৰৈত মাটিত পুতি পেলাব লাগে।

ৰাসায়নিক পৰ্টন:

থাইলুফানাইড স.উ.

24.00 % w/w

এডজুভেণ্ট বিৱৰণ

1) ইথিলেটেড পলিমেথাৰাইলেট, প্ৰপিলিন গ্ৰাইকলত

3.00 % w/w

2) ফেটি এলকহল ল ইথিলেটেড

2.00 % w/w

3) পলি ডাইমিথাইল সিলয়ন

0.50 % w/w

4) প্ৰপিলিন গ্ৰাইকল

6.00 % w/w

5) জেনেৰেল গম

0.40 % w/w

6) ডিমিনাৰেপাইজড ওৱাচৰ

বাৰী পৰিমাণ

মুঠ

100.00 % w/w

সতৰ্কতামূলক বিবৃতি: ১. ই মৌমাখিৰ বাবে বিধাজ, মৌমাখিৰ খাদ্য সজান কৰা সময়চোৱাত স্প্ৰে কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত। ২. মাছ, জলজ প্ৰাণীৰ বাবে বিধাজ, সেয়েহে জলাশয়, জলজ পালন বা মংস পালনৰ আশেপাশে স্প্ৰে প্ৰয়োগ কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত। ৩. লেবেল আৰু লিফলেটত উল্লেখ কৰাৰ বাহিৰে অন্য উদ্দেশ্যৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা অনুচিত। ৪. লিফলেটত নিৰ্দেশ কৰা অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত পাত্ৰ সমূহ ধুই ৰাখিব।

খাদী পাত্ৰবোৰ পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো বিপজ্জনক।

ଓଟୋ

ଆଇପ୍‌ସିଆଇ ୨୪% ଏସ.ସି. (ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି)

ଏହା ଧାର୍ଯ୍ୟ ସିଧା ବ୍ରାଉଜିଂ ଚମାରରେ ଥିବାରୁ ଏହା ମାଣିତା ଉପକାରୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ।
କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଅଟେ ।

ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସୂଚନା:

ଫର୍ମ (ଏସ)	ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ	ମାତ୍ରା/ପ୍ରତି ଡିଜିଟାଲ			କେଉଁଠି ବା କେଉଁଠି ବାଣିଜ୍ୟ (ବିନ)
		ଏ.ଆଇ. ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ	ଫର୍ମ୍‌ଲେସ୍ (ଏମ୍‌ଏଲ)	ପାଣି (ଲିଟର)	
ଧାନ	ସିଧା ବ୍ରାଉଜିଂ (ଗୋଟିଏ ନିଆ ହୋଇଛି)	୯୦	୩୫୫	୫୦୦	୨୮
ଚମାର	ହାଉସା	୧୨୦	୫୦୦	୫୦୦	୭
ଆଉ	ଭୁବ୍‌ସ୍ (ମାଣି: ଉପକାର)	୦.୨୫ ଏ.ଆଇ. /୧୦ କେଡି ଆଉ ବିବରଣ	୨.୫୫ ଏ.ଆଇ. /୧୦ କେଡି ଆଉ ବିବରଣ		ଆଉର ମାଣି କେଉଁଠି ପାଇଁ କେଉଁଠି ହୋଇଥାଏ

ବ୍ୟବହାର ବିଧି:

ଏହା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ପାଇଁ ବିଶାଳ ଅଟେ, କେଉଁଠି ପାଇଁ ଜଳ କାଟିବା ଫର୍ମ
ଏହା ଏହାର ଆଜି ପାଖରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ସ୍ଥାନ: ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ: ୨୪ ଏସି

ବାବଦାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ: ପଲ୍ଲପଲ ଆବଶ୍ୟକ ମାତ୍ରା ଲିଅନ୍ତୁ ତଥା ଏହାରୁ ପାଣିର ଦିକ୍ଷି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ । ଏବେ ଏହା ପାଣିର ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରା, କାହା କୁହାପାଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଦୁଧାଭ ମିଶାନ୍ତୁ ଆଉ ଏହାର ଗତ ଆୟତନ ଛିଅନ ନେପ୍ଟେବ୍ କ୍ରେ ଦ୍ଵାଦ୍ଵା କରିନ୍ତୁ ।

ପ୍ରୟୋଗର ପଦ୍ଧତି:

ଆଇଫୁଗମାଇଟ୍ **24** ପ୍ରତିଶତ ଏସ ଗ୍ରା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତରାଦା ଫିନିନାଶନ ଅଟେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଧାନ ଏବଂ ଚମ୍ପବର ଫସଲରେ କୁମ୍ଭାଃ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫମାରା ଏବଂ ବାଉଁଶ ଲୋଗର ପ୍ରାୟମ୍ବିତ୍ତ୍ଵ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦେଲେ କରିନ୍ତୁ । ଆମ୍ଭ ଫସଲରେ ଦ୍ରାବ୍ ଇର୍ଥି ରୋଗ ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ବୃଣାଦ ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଜି ଉପକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ପାତ୍ରଧାନତା: ବାବଦାର ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ପତ୍ରରୁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ପାଳନ କରିନ୍ତୁ । ଫିନିନାଶନକୁ ବାହାର ମୁଳ ଯେବେଲେ ଡାକା-ଡାକା ଲଗାଇ, ଡାକା ପଡ଼ାଉଁ, ପଶୁ ଡାକା ଏବଂ କିଣ୍ଟୁ ପାତ୍ର ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ । ବାବଦାର ପରିବା ପମ୍ପୟରେ ଦୁଇକ୍ଷାଦୂତ ନପଡ଼ା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ । ଯଦି ବପଡ଼ା ବିଶାବ୍ ଦୋଇପାଏ, ତାହେଲେ ପଥା ଶିଶୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ବିଶାବ୍ ବପଡ଼ା ଏବଂ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାତ୍ରକୁଲେ ପଫା କରିନ୍ତୁ । ଫିନିନାଶନର ବାବଦାର ପମ୍ପୟରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଧୂମ୍ରପାନ କରିବା କିମ୍ବା ଚମାଷ୍ଟ ଲୋବାଇବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହାରୁ ପ୍ରୁକ୍ତାନ୍ତ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆଖି ଏବଂ ଚକ୍ଷୁ ଏହାଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ ।

ବିଷୟ ଲକ୍ଷଣ: ଗିନିଦେବା ଦ୍ଵାରା ମୁଣ୍ଡ, ଦୁଇଭାବା, ବାକ୍ସି ହେବା, ଯେବ ଦରଦ ହେବା, ବାଡ଼ା ଏବଂ କୁଣ୍ଡାଲ ହେବା ଆଦି ।

ବିଷୟଶବ୍ଦ:

କୌଣସି ବିଶେଷ ବିଷୟାତ ନୁହେଁ । ଲକ୍ଷଣାନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାନ୍ତୁ ।

ବିଷୟଶବ୍ଦ:

ଆଇଫୁଗମାଇଟ୍ **24** ପ୍ରତିଶତ ଏସ ଗ୍ରା ର ଅନ୍ତରାଦାବିତର ମାତ୍ରା ଦ୍ଵାରା ଧାନ, ଚମାବର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଫସଲରେ କୌଣସି ଗଛରବିଷ ନାହିଁ ।

ଚିନିନାଶକ ସଂସ୍ଥାପନ ଦେଇ ଜିର୍ଣ୍ଣିକିତ ଶକ୍ତି: 1. ଚିନିନାଶକ ରଖିଥିବା ବ୍ୟା/ପେନାବରୁ ଅରଣ୍ୟ ଘରର ଭାଗରେ ଯେଉଁ ଘରର ଭାଗର ଭାବୁ ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟ ବହୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥାଏ । ତାହାଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ଦରକାର ଅରଣ୍ୟର ଚାଲା-ବାବା ଲଗେଇ ଚିନିନାଶକର ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ପ୍ରକାର ହିସାବରେ ଉଦ୍ଧୃତ । **2.** ଯେଉଁ ଘର ଏବଂ ଅରଣ୍ୟର ଲେ ଚିନିନାଶକର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେବ ବା ଘର ଉପରେ ଚିନିନାଶକର ଉଦ୍ଧାର, ପ୍ରକାଶନରୁ, ଦୂରାବାର ଚିନିନାଶକର ଉଦ୍ଧାର ଦରକାର ଉଦ୍ଧାରରୁ ଚିନିନାଶକର ବାଟ ଦ୍ଵାରା ବାହାବରଣ ଦୂରର ଦେବାବ ବିପତ୍ତି ଦୂରଯାଉ । ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ବାଟ, ଜଳିଥିବା ପ୍ରକାଶ ପାଟି ଆଦିର ଧୂଆଁରେ ଘରର ଉପଯୋଗୀ ବାଟରୁ ନିରାପତ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ନକ୍ଷା କରିଦେବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣର ଶି ପାଣି ପ୍ରଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧି ନାହିଁ । ୨) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଫାନ୍ଦରୁ ପ୍ରକାଶିତହୁଏ ପାଇଁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ୁ ନାହିଁ ବା ଫାନ୍ଦରୁ ଗ୍ରାହୀତ ହେଉଥିବା ପାତ୍ର ଦୂରେ ଯୋଡ଼ିଦେବା ଦରକାର ।

ଶାସନିକ ପଦ୍ଧତିର ଧାର୍ଯ୍ୟତା	:	୨୫.୦୦% ଉତ୍ତର/ଉତ୍ତର
ଆଇଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଧାର୍ଯ୍ୟତା	:	
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ:	:	
୧) ଗ୍ରାହକର ଗ୍ରାହକର ଉପରେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧାର	:	୩.୦୦% ଉତ୍ତର/ଉତ୍ତର
୨) ଫାନ୍ଦ ଅରଣ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର	:	୨.୦୦% ଉତ୍ତର/ଉତ୍ତର
୩) ପାଣି ଚାଲିଯିବାରେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧାର	:	୦.୫୦% ଉତ୍ତର/ଉତ୍ତର
୪) ଗ୍ରାହକର ଗ୍ରାହକର ଉଦ୍ଧାର	:	୫.୦୦% ଉତ୍ତର/ଉତ୍ତର
୫) ବାହାରେ ଉଦ୍ଧାର	:	୦.୫୦% ଉତ୍ତର/ଉତ୍ତର
୬) ଚିନିନାଶକର ଉଦ୍ଧାର	:	୧୦.୦୦% ଉତ୍ତର/ଉତ୍ତର

ମୋଟ
ଉତ୍ତର : ଏହି ଉପାଦାନ ମନୁଷ୍ୟର ପାଇଁ ବିଶାଳ ଅଟେ, ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତିର ଧୂଆଁ ବ୍ୟବହାର ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ । ୨. ଏହା ମାତ୍ର ଏବଂ କଳାକାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶାଳ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରାଯାଏ, କଳାକାର ବିଶାଳ ମଧ୍ୟବିଶାଳ କଳାକାରରୁ ଅନ୍ୟତମ କରାଯିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ । ୩. ଏହି ଉପାଦାନ ଉପଯୋଗ ପ୍ରକୃତିରେ ବର୍ଣ୍ଣାବିଶାଳ ଉପଯୋଗ ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟତମ କରାଯିବା ଉପଯୋଗ କରାଯିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ । ୪. ପ୍ରୟୋଗ ପରେ ପ୍ରକୃତିରେ ବର୍ଣ୍ଣାବିଶାଳ ଅନ୍ୟତମ କରାଯିବା ଉପଯୋଗ କରାଯିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ।

ଆଉ ପାତ୍ରର ପ୍ରକାଶିତହୁଏ ବିପତ୍ତିକଳାକାର ଅଟେ ।

اولے تھائی فلوز امانیٹ 24% ایسی (داخلی اسپرینڈش)

دھان کے پرچھہ انکمارنی لٹار کے آئیل تھلا اور جے علاقے کے ذریعہ آلوکی بلیک اسکرف پتاریوں کے لئے اچھائی اثر دار ہے۔
استعمال کے لئے سفارش:

فصل	جرائیم عام نام	نیوٹریکیو مقدار			آخری چھڑکاؤ اور فصل کاٹنے کے درمیان فرق (دنوں میں)
		س۔ت. (گرام)	ٹاؤٹ (کلی لیٹر)	پانی کا مقدار (لیٹر)	
دھان	پرچھہ انکمارنی ریج وکونو نیوٹری	90	375	500	28
لٹار	آئیل تھلا	120	500	500	7
آلو (جے علاقے)	بلیک اسکرف	0.6 گرام س۔ت. 10 کلگرام آلوٹہ کے لئے	2.5 لیٹر/ 10 کلگرام آلوٹہ کے لئے		آلو میں جے علاقے کے لئے استعمال ہوتا ہے

حصہ: لیٹل لیٹ پرانی گلی فصلوں کے علاوہ کسی دیگر فصل پر اس کا استعمال نہ کریں۔ یہ آبی مخلوقات کے لئے زہریلا ہے، اس
لئے آبی زراعت میں اور اس کے آس پاس اس کا استعمال نہیں کرنا چاہئے۔
دوبارہ چھڑکاؤ میں فرق: 24 گئے

استعمال کا وقت: حقانی قلمو یا 24 لیمبو اس کی ایک داخلی کاپیوں میں سے ایک استعمال دھان اور ٹماٹر کی فصلوں میں پانچویں پر چھوٹی گھاسی اور اعلیٰ جیسا بیماری کے ابتدائی آثار نظر آئے پر کریں۔ آلو کی فصل میں بلیک اسکرف بیماری کے لئے اس کا استعمال ہوائی فصلوں پر مزید علاج طریقہ کی شکل میں کیا جاتا ہے۔

عقلمند: استعمال سے عقل ٹھیک اور اچھی طرح پریشانی اور دایرتہ پر عمل کریں۔ آپ کو پچھونش کو اس کی پہلی جنگ میں ۱۱-۱۲ سالگی کے درمیان ہی پیدا ہوا ہونے کے بعد، اس کا پورا پورا سامنا کرنا ہے، اور درمیان استعمال کے وقت غلطیوں پر غور کریں۔ آپ کو پچھونش کو آواز دہونے کو تو نہیں قرار دیا جائے گا۔ لہذا اسے پچھونش کے صوموں کا بھی جائز سامنا اور دینی سے جو نہیں سمجھونش کے استعمال سے وقت نکالنا۔ چنانچہ اس پر غور کیا جائے گا۔ اسے سمجھیں نہیں اور اسے دہونے والے کو اس کے بارے میں

[illegible]

تھائی کی موت 24 فیصد لائیں کی تھائی کی تعداد سے دو حمان، دھار اور اوکی فصلوں میں کوئی نہ ہرگز اثر نہیں پایا گیا۔

یہ فیضانِ غفران 24 نیکو اعمال کی فہرست ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں کرنے کی ضرورت ہے۔ ان اعمال کو کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ ان اعمال کو نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی نہیں ہوگی۔

استعمال کئے گئے ڈیوں/تھیکیز۔ بیج ہوئے کچھو کچھ اور دھنڈا شیارہ کے وجود کا نمٹنا: 1۔ یہ کچھو کچھ ہائے والے اور استعمال کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ یہ ایوں/تھیکیز پانی ہوئی کچھو کچھ اور کیمیکل کے وجود کا نمٹنا دیکھیں (حک سے کرے تاکہ فساد اور پانی آلودہ نہ ہو۔ 2۔ استعمال کئے گئے ڈیوں/تھیکیز کو باہر نہ پھینکیں جس سے ان کا دوبارہ استعمال نہ ہو۔ 3۔ استعمال کئے گئے ڈیوں/تھیکیز کو زراعتی سے دوزمین میں نہ ڈالیں۔

کیمیائی مرکب:

حقائق فلورائیڈس۔

: 24.00% وزن/وزن

دھنڈا اجزاء

(1) ایٹا سیلیڈ پالی تھاکریلیک ان پوائنٹ گھٹیکل

: 3.00% وزن/وزن

(2) محلی اکامیل تھاکریلیک

: 2.00% وزن/وزن

(3) پالی ڈیو تھاکریلیک

: 0.50% وزن/وزن

(4) پروپائیلین گلیکول

: 6.00% وزن/وزن

(5) ڈیٹھین گم

: 0.40% وزن/وزن

(6) ڈیٹھین گم

مقدار کے مطابق

: 100.00% وزن/وزن

کچ

احتیاط: یہ شہد کی مکھیوں کیلئے زہریلی ہے اس لئے مکھیوں کی موجودگی سے وقفہ کے دوران استعمال نہ کریں۔

مچھلیوں کے لئے اور پانی میں رہنے والے جانداروں کیلئے زہریلی ہے ،

اس لئے پانی کے ذرائع ،ابی زراعت یا مچھلی کی زراعت کے نزدیک استعمال نہ کریں۔

لیبل اور لیف لیٹ میں دیئے گئے مقاصد کے علاوہ کسی بھی کام کیلئے استعمال نہ کریں۔

کٹینر کو استعمال کے بعد لیف لیٹ دیئے گئے طریقے پر ضائع کریں۔

دوا کے خالی ڈبوں کا دوبارہ استعمال خطرناک ہو سکتا ہے۔

**Manufactured and
Marketed by :**

Godrej Agrovvet Limited,

Regd. Office : Godrej One, 3rd Floor,
Pirojshanagar, Eastern Express
Highway, Vikhroli (East), Mumbai-
400079, Maharashtra, India.
Manufacturing Premises : Lane No,
7, Indl. Growth Centre, Samba,
Jammu- 184121, J&K, India.

निर्माता और विपणनकर्ता:

गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड, रजि. ऑफिस:
गोदरेज वन, तीसरी मंजिल, पिरोजशाह
नगर, इस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, विक्रोली
(पू), मुंबई - ४०० ०७९, महाराष्ट्र ,
इंडिया। उत्पादन परिसर : लेन नं.७,
इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, साम्बा, जम्मू-
१८४१२१, जम्मू एन्ड कश्मीर, भारत ।





