पिक्सेल

पिनोक्सॉडेन ५.१% ई. सी.

(चयनात्मक खरपतवारनाशक)

पिनोक्सॉडेन ५.१% ई.सी. खरपतवार उगने के बाद इस्तेमाल होनेवाला एक चुनिंदा खरपतवारनाशकहै जो गेहूँ की फसल में आनेवाले घास जाति के खरपतवारों जैसे *गुल्ली डंडा या मँडूसी* और *जंगली जई* के नियंत्रण के लिए सिफारिश किया गया है। इसमें ५.१% पिनोक्सॉडेन सक्रिय तत्व के रुप में मौजूद है और यह एक लिटर पदार्थ में ५० ग्रा. के बराबर होता है।

रासायनिक संरचना :	**मात्रा (भार/भार)**
पिनोक्सॉडेन स.त.	५.१०%
सेफनर : क्लोक्विनटोसेटमेक्साईल	१.२६%
इमलसिफायर तत्व:	
कॉस्टर आइल इथोक्सिलेट-३०	५.०५%
डोडिसाईल बेनझीन सलफोनेट का कैलशियम लवण	२.०२%
थिकनर : पालीस्टाईरिन	०.५१%
सहायक : ट्रिस (२-इथाईल हेक्साईल) फॉस्फेट	३४.३०%
सालवेन्ट : (टेट्राहाईड्रो-फूरान-२-आईल)-मिथनोल	१८.२० %
सोल्वेस्सो २०० एनडी	पर्याप्त मात्रा
कुल	**१००.००%**

इस्तेमाल का तरीका और सिफारिश : नीचे दिये गये सिफारिशों के अनुसार पिनोक्सॉडेन ५.१% ई. सी. का इस्तेमाल गेहूँ में बीज रोपण के बाद आने वाले घास जाति के खरपतवार जैसे *गुल्ली डंडा* या *मँडूसी* और *जंगली जई* के नियंत्रण करता है।

फसल	खरपतवार का सामान्य नाम	मात्रा प्रति हेक्टेयर			अंतिम छिड़काव और फसल की कटाई के बीच अंतराल (दिन)
		सक्रिय तत्व (ग्रा)	संरचना (मि. ली)	पानी की मात्रा (लीटर)	
गेहूँ	*गुल्ली डंडा* या *मँडूसी* *जंगली जई*	४० - ४५	८०० -९००	२२५- ३००	९०

इस्तेमाल के लिए सिफारिश : खरपतवारनाशक का इस्तेमाल बीज रोपण के ३०-३५ दिन के बाद, जब ज्यादातर खरपतवार उग आये हों या जब *गुल्ली डंडा* या *मँडूसी* और *जंगली जई* ३-५ पत्ते की अवस्था में हो, तब इसे सिफारिश की गयी मात्रा में प्रयोग करें।

सोखने का तरीका : पिनोक्सॉडेन तेजी से खरपतवार की पत्तियों द्वारा सोख लिया जाता है और इसे पत्तियों और तनों के बढ़ते हुए बिंदुओं तक पहुँचा दिया जाता है। कोमल खरपतवार प्रजातियां सामान्यत: उपचार के ४८ घंटों के भीतर बढ़ना बंद कर देती हैं, एक से तीन सप्ताह में पीली हो जाती हैं और तीन से पांच सप्ताह में इन पर पूरी तरह से नियंत्रण हो जाता है।

प्रयोग के लिए निर्देश: इस खरपतवारनाशक का प्रयोग फ्लैट फेन या डिफ्लेक्टर ०८ सफेद नोज़ल लगा हुए नैपसेक स्प्रेयर से छिड़काव करें। छिड़काव करते समय नोज़ल के जमीन से ऊँचाई ०.३५ मी. होनी चाहिये, जिससे अधिक कोण का छिड़काव बनता है और एक समान स्प्रे होता है। खरपतवारनाशक को सिफारिश के अनुसार पानी में मिलाकर अच्छी तरह से छिड़काव कीजिए।

बाद की फसलों पर प्रभाव : यह मिट्टी में जल्दी सड़ जाता है और इसमें मिट्टी प्रभावित नहीं होती है। बाद की फसलों पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है।

भण्डारण :

१. खरपतवारनाशक के डिब्बों को अन्य सामग्री विशेषकर खाद्य पदार्थों के संग्रहण कक्ष या स्थान से दूर किया जाना चाहिए, अथवा कीटनाशक की मात्रा तथा स्वभाव पर निर्भर करते हुए, डिब्बों को अलग अलमारी में ताला-चाबी लगाकर रखें।

२. खरपतवारनाशक का संग्रहण कक्ष या स्थान रोशनीदार, मजबूत बनावट का, हवादार तथा पर्याप्त लम्बाई चौडाई का होना चाहियें, जिससे बाष्प द्वारा प्रदूषण न हो।

सावधानी: स्प्रे तैयार करने के लिए खाना पकाने के बर्तनों का इस्तेमाल मत कीजिए। स्प्रे के घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करे। त्वचा, आँख और मुँह को खरपतवारनाशी के संपर्क से बचाये तथा श्वास द्वारा अंदर जाने से रोके। **सुरक्षात्मक कपड़े जैसे कि ऐप्रान, दस्तानों, नकाब और गम बूट आदि पहन कर ही इसका प्रयोग करें।** खरपतवारनाशक का प्रयोग करते समय, खाना, पीना और धूम्रपान करना नहीं चाहिए। प्रति दिन प्रयोग के बाद, खरपतवारनाशक से प्रभावित हिस्सों को अच्छी तरह धो ले और कपड़े बदल ले। दूषित कपड़ों को अच्छी तरह धो ले।

लगातार एक ही खरपतवारनाशक के इस्तेमाल होने से खरपतवारों के प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धी होने की संभावना है। इस वृद्धी को काबु में लाने के लिए कई अन्य खेती योग्य उपाय योजनाओं के इस्तेमाल की सिफारिश की जा सकती है। खास सिफारिशों के लिए हमारे प्रतिनिधी की सहायता लें।

खाली डिब्बों का निपटारा:

१. पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए खाली डिब्बें, बचा हुआ घोल, मशीनों की धोवन और डिब्बों का निपटारा सुरक्षित स्थान पर करें।

२. खाली डिब्बों का पुन: प्रयोग रोकने के लिए, उन्हें बाहर न छोडें।

३. डिब्बों को तोड-मोडकर आबादी से दूर जमीन में गाढ़ देना चाहिए।

विषक्तता के लक्षण: अब तक कोई भी विष की घटना नहीं हुई है। प्रयोगशाला के परीक्षणों में चूहों पर विष का कोई निश्चित लक्षण नहीं हैं, लेकिन शरीर में ढीलापन, बाल खड़े होना, झुककर बैठना, लार बहना और आँसू आना जैसे लक्षण दिखाई दिये।

प्राथमिक उपचार: प्रभावित व्यक्ति को प्रदूषित जगह से हवादार कमरे या खुली हवा में ले जाए और तापमान से बचाएँ। **त्वचा में लगने पर :** प्रदूषित कपड़ों को उतार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। **आँखों में चले जाने पर :** आँखों को कुछ देर तक साफ पानी से अच्छी तरह छपछपाइए। **निगल जाने पर :** पानी में मेडिसिनल चारकोल की काफी मात्रा घोलकर बार बार दें और तुरन्त डॉक्टर को बुलाइयें। **सूचना :** यदि मरीज बेहोश हो तो, मुंह से कुछ न दें। उल्टी कराने की कोशिश न करें।

विष प्रतिहार दवा : कोई खास विष प्रतिहार नही है, लक्षण के अनुसार चिकित्सा करें।

निर्माता : सिंजेन्टा इंडिया प्राईवेट लिमिटेड (भूतपूर्व सिंजेन्टा इंडिया लिमिटेड),
अमर पॅराडीम्म, एस. नं. ११०/११/३, बानेर रोड, पुणे - ४११०४५, महाराष्ट्र, भारत.

फैक्टरी पता: ग्राम निम्बुआ, तहसील डेरा बासी, जिला एसएएस नगर (मोहाली), पंजाब-१४०५०७, भारत.

विपणनकर्ता : गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड, गोदरेज वन, तीसरी मंजिल, पिरोजशा नगर, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, विक्रोली (पूर्व), मुम्बई-४०० ०७९, महाराष्ट्र.

Pixel

PINOXADEN 5.1% EC

(Selective Herbicide)

Pinoxaden 5.1% EC is a selective post-emergence herbicide that is recommended for the control of important grass weeds like *Phalaris minor* and *Avena ludoviciana* in wheat. It contains 5.1% of the active ingredient pinoxaden which is equal to 50 g per Litre of the formulation.

Chemical Composition :	**Contents (w/w)**
Pinoxaden a.i	5.10%
Safener : cloquintocet mexyl	1.26%
Emulsifying agents:	
castor oil ethoxylate-30	5.05%
dodecyl benzene sulphonic acid, ca salt	2.02%
Thickener : Polystyrene	0.51%
Adjuvant: tris (2-ethylhexyl) phosphate	34.30%
Solvents:	
(tetrahydro-furan-2yl)-methanol	18.20%
Solvesso 200 ND	QS
Total	**100.00%**

Application & Recommendation for use: When used as per the recommendations given below, Pinoxaden 5.1% EC provides the post-emergence control of grasses particularly *Phalaris minor* and *Avena ludoviciana* in wheat.

Crop	Scientific name of the weed	Dosage per ha			Waiting period from last application to harvest (in days)
		a.i. (g)	Formulation (ml)	Dilution in water (L)	
Wheat	Canary grass, *Phalaris minor* Wild oat, *Avena ludoviciana*	40-45	800 - 900	225-300	90

Recommendations for use: Apply as post emergence spray at 30-35 days after wheat sowing or when *Phalaris minor* and *Avena ludoviciana* is of 3-5 leaf stage.

Mode of uptake: Pinoxaden is rapidly absorbed by weed foliage and translocated to the growing points of leaves and stems. Susceptible weed species generally stop growing within 48 hours of treatment, turn yellow within one to three weeks and are completely controlled within three to five weeks.

Method of application: The herbicide is recommended to be applied using a knapsack sprayer fitted with a flat fan or a deflector nozzle 08 White (DFN 08), maintaining a constant nozzle height of 0.35 m which results in a wide angle fan spray with a narrow rectangular spray pattern. Apply the herbicide with the recommended quantity of water to ensure thorough coverage of the weed foliage.

Re-cropping flexibility: This is quickly degraded in the soil and has little or no soil activity. There are no restrictions on succeeding crops.

Storage:

1. The packages containing the herbicides should be stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key.
2. The rooms or premises meant for storing the herbicide shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapor.

Precautions: Do not use cooking utensils for preparing the spray solution. Use stick for stirring the spray solution. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Avoid inhalation of fog and vapors. **Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Wear protective clothing, mask, goggles, and boots, while handling the product.** Do not eat, drink or smoke while applying the product. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Avoid contamination of air and water bodies with the herbicide. Also wash the contaminated clothes.

The repeated use of any herbicide or herbicide with the same mode of action could lead to selection of resistant weeds. Certain agronomic practices may reduce the likelihood that resistant weeds will arise. In fields where resistant weeds are suspected, integrate strategies that are available to manage such population. For specific recommendations, please contact our local representative.

Disposal of empty containers:

1. Packages or surplus materials and washings from the machines and containers should be disposed off in a safe manner as to prevent environmental and water pollution.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse.
3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Symptoms of Poisoning: No case of human poisoning is on record. In laboratory studies, poisoning symptoms in rodents were non-specific: decreased activity, piloerection, hunched posture, salivation and lachrymation.

First Aid: Remove the affected person to a well-ventilated area or fresh air and protect him from undercooling. **IN CASE OF SKIN CONTACT:** Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. **IN CASE OF EYE CONTACT:** Rinse eyes with clean water for several minutes. **IN CASE OF INGESTION:** Repeatedly administer medicinal charcoal in a large quantity of water. Get the attention of the medical doctor immediately. **NOTE:** Do not induce vomiting or never give anything by mouth to an unconscious person.

Antidote: No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy.

Manufactured by : Syngenta India Pvt. Ltd. (erstwhile Syngenta India Limited),
Amar Paradigm, S. No. 110/ 11/ 3, Baner Road, Pune – 411 045, Maharashtra, India.

Factory address :
Village Nimbua, Tehsil Dera bassi, District SAS Nagar (Mohali), Punjab-140507, India

Marketed by : Godrej Agrovet Ltd., Godrej One, 3rd floor, Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (East), Mumbai-400 079, Maharashtra.

PIXEL

Pinoxaden 5.1% EC

(Selective Herbicide)

पिक्सेल

पिनोक्सॉडेन ५.१% ई.सी.

(चयनात्मक खरपतवारनाशक)

Manufactured by :
Syngenta India Pvt. Ltd.
(erstwhile Syngenta India Limited),
Amar Paradigm, S. No. 110/ 11/ 3, Baner Road,
Pune–411 045, Maharashtra, India.

Factory Address :
Village Nimbua, Tehsil Dera bassi, District
SAS Nagar (Mohali), Punjab-140507, India

Marketed by :
Godrej Agrovet Ltd.,
Godrej One, 3rd floor, Pirojshanagar,
Eastern Express Highway, Vikhroli (East),
Mumbai-400 079, Maharashtra.

निर्माता : सिंजेन्टा इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
(भूतपूर्व सिंजेन्टा इंडिया लिमिटेड),
अमर पॅराडीम्म, एस. नं. ११०/११/३, बानेर रोड,
पुणे-४११०४५, महाराष्ट्र, भारत.

फैक्टरी का पता :
ग्राम निम्बुआ, तहसील डेरा बासी, जिला एसएएस नगर
(मोहाली), पंजाब-१४०५०७, भारत.

विपणनकर्ता :
गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड,
गोदरेज वन, तीसरी मंजिल, पिरोजशा नगर,
ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, विक्रोली (पूर्व),
मुम्बई-४०० ०७९, महाराष्ट्र.

For any complaints, please contact our Customer Service Executive,
Godrej Agrovet Ltd.,
Godrej One, 3rd floor, Pirojshanagar, Eastern Express Highway,
Vikhroli (East), Mumbai-400 079, Maharashtra.
Telephone No.: 022 2519 4491, Email: customercare@godrejagrovet.com

IN2092352-GAL

ਪਿਕਸੇਲ

ਪੀਨੋਕਸਾਡੇਨ ੫.੧% ਈਸੀ

(ਚੋਣਤਮਕ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ)

ਪੀਨੋਕਸਾਡੇਨ ੫.੧% ਈਸੀ ਇੱਕ ਚੁਨਿੰਦਾ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ *ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਵੀਂ* ਦੇ ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ੫.੧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਪੀਨੋਕਸਾਡੇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ ੫੦ ਗ੍ਰਾ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਰਸਾਇਣਕ ਮਿਸ਼ਰਣ :	**ਤੱਤ (ਵ/ਵ)**
ਪੀਨੋਕਸਾਡੇਨ ਕਿ.ਤ.	੫.੧੦%
ਸੇਫ਼ਨਰ : ਕਲੋਰੂਇੰਟੋਸੇਟ ਮੇਕਸੀਲ	੧.੨੬%
ਇਮਲਸੀਫ਼ਾਈਂਗ ਏਜੰਟ :	
ਕੈਸਟਰ ਆਇਲ ਈਥੋਕਸੀਲੇਟ - ੩੦	੫.੦੫%
ਡੋਡੀਸੀਲ ਬੇਨਜ਼ੀਨ ਸਲਫ਼ੋਨਿਕ ਏਸਿਡ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਾਲਟ	੨.੦੨%
ਥਿਕਨਰ: ਪੋਲੀਸਟੇਰੀਨ	੦.੫੧%
ਐਡਜੂਵੰਟ :	
ਟ੍ਰਿਸ (੨-ਏਥੀਲਹੇਕਸੀਲ) ਫ਼ਾਸਫ਼ੇਟ	੩੪.੩੦%
ਘੋਲਕ :	
(ਟੇਟ੍ਰਾਹਾਈਡ੍ਰੋ-ਫ਼ੂਰਾਨ-੨ ਵਾਈਐਲ)-ਮੇਥਾਨੋਲ	੧੮.੨੦%
ਸੋਲਵੇਸੋ ੨੦੦ ਐਨਡੀ	ਕਿਊ. ਐਸ.
ਕੁੱਲ	**੧੦੦.੦੦%**

ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ : ਜਦ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੀਨੋਕਸਾਡੇਨ ੫.੧% ਈਸੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ *ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਵੀਂ*ਵਰਗੇ ਘਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਬੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ਸਲ	ਨਦੀਨ ਦਾ ਨਾਂ	ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰ. ਹੈ.			ਆਖ਼ਰੀ ਸਪ੍ਰੇ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਤਕ ਉਡੀਕ (ਦਿਨ)
		ਕਿ.ਤ. (ਗ੍ਰਾ.)	ਫ਼ਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ (ਮਿਲੀ.)	ਘੋਲ ਦਾ ਪਾਣੀ (ਲੀ.)	
ਕਣਕ	*ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ* *ਜੰਗਲੀ ਜਵੀ*	੪੦-੪੫	੮੦੦-੯੦੦	੨੨੫-੩੦੦	੯੦

ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ : ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ੩੦-੩੫ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜਦ *ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਵੀਂ*੩-੫ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਗਣ-ਉਪਰਾਂਤ ਸਪ੍ਰੇ ਵਜੋਂ ਛਿੜਕੋ।

ਪੌਦੇ ਰੁਆਰਾ ਸੋਖਵ ਦੀ ਵਿਧੀ : ਪੀਨੋਕਸਾਡੇਨ ਨੂੰ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਣੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤਕ ਫ਼ੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਣਸ਼ੀਲ ਨਦੀਨ ਜਾਤੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ੪੮ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧਣੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਹਨ।

ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ : ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਫ਼ਲੈਟ ਫ਼ੈਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡੀਫ਼ਲੈਕਟਰ ਨੋਜ਼ਲ ੦੮ ਵ੍ਹਾਈਟ (ਡੀਐਫ਼ਐਨ ੦੮) ਲਗਾ ਕੇ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਨਾਲ ਵਰਤੋ। ਨੋਜ਼ਲ ਦੀ ਉਚਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ੦.੩੫ ਮੀਟਰ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਜ਼ਾਵੀਏ ਦਾ ਛਿੜਕਾਉ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੌਂਜ਼ਾ ਰਿਕਟੈਂਗੁਲਰ ਸਪ੍ਰੇ ਪੈਟਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣ।

ਦੁਬਾਰਾ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਦਾ ਲਚੀਲਾਪਣ : ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।

ਸਟੋਰੇਜ (ਭੰਡਾਰਣ) :

੧. ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਅਲਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ।

੨. ਦਵਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਸੁੱਕੇ, ਚੰਗੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਡੁਲ੍ਹੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾੜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਫ਼ੈਲ ਸਕੇ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ : ਸਪ੍ਰੇ ਦਾ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਸਪ੍ਰੇ ਘੋਲ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰੀਆ ਜਾਂ ਡੰਡਾ ਵਰਤੋ। ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਤਵਚਾ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਕਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਛੋਹਣ ਦਿਓ। ਸਪ੍ਰੇ ਦੀ ਫੁਹਾਰ ਜਾਂ ਹਵਾੜ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। **ਤਵਚਾ ਨਾਲ ਛੋਹਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਬੜ ਕੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਓ। ਬਚਾਅਕਾਰੀ ਕਪੜੇ ਪਹਿਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਕ, ਗਾਗਲਜ਼ ਅਤੇ ਬੂਟ।** ਵਰਤਣ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਨਾ ਹੀ ਧੂਮਰਪਾਨ ਕਰੋ। ਛਿੜਕਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ ਅਤੇ ਕਪੜੇ ਬਦਲ ਲਓ। ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਪਲੀਤ ਹੋਏ ਕਪੜੇ ਧੋ ਲਓ।

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਦੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਗਰੋਨਾਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਵਰਤ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਨਦੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।

ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ :

੧. ਖਾਲੀ ਪੈਕੇਜਾਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਬਚੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਧੋਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਏਦਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਰੋਕਿ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ।

੨. ਖਾਲੀ ਹੋ ਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ।

੩. ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ।

ਵਿਸ਼ੈਲੇਪਣ ਦੀਆਂ ਇਲਾਮਤਾਂ : ਇਹਸਾਨੀ ਵਿਸ਼ੈਲੇਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਬਾਰੇਟਰੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੂਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਅਸਰ ਦੀਆਂ ਇਲਾਮਤਾਂ ਗੈਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਨ। ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਪਾਈਨੋਈਰੈਕਸ਼ਨ ਕੁੱਬ ਪੈਣਾ, ਲਾਰ ਟਪਕਣੀ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਵਗਣੇ।

ਫ਼ਸਟ ਏਡ: ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕ ਠੰਢ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਕੇ ਰੱਖੋ। **ਤਵਚਾ ਨਾਲ ਲੱਗਣ 'ਤੇ:** ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਲਓ। **ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣ 'ਤੇ :** ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਈ ਮਿੰਟਾਂ ਤਕ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ। **ਨਿਗਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ:** ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਕੋਲਾ ਬਾਰੰਬਾਰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਫ਼ੌਰਨ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ। **ਨੋਟ:** ਬੇਹੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਉਕਸਾਓ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੀਣ ਖਾਣ ਲਈ ਨਾ ਦਿਓ।

ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ: ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਨਿਰਮਾਤਾ : ਸਿੰਜੇਂਟਾ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਜੇਂਟਾ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ),
ਅਮਰ ਪਰਾਡੀਗਮ, ਐਸ.ਨੰ. ੧੧੦/੧੧/੩, ਬਾਨੇਰ ਰੋਡ, ਪੁਣੇ-੪੧੧ ੦੪੫, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਭਾਰਤ.

ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਪਤਾ : ਪਿੰਡ ਨਿੰਬੂਆ, ਤਹਸੀਲ ਡੇਰਾ ਬਾਸੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਪੰਜਾਬ-੧੪੦੫੦੭, ਭਾਰਤ.

ਮੰਡੀਕਰਤਾ : ਗੋਦਰੇਜ ਏਗ੍ਰੋਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਗੋਦਰੇਜ ਵਨ, ਤੀਸਰਾ ਮੰਜ਼ਲ, ਪਿਰੋਜਸ਼ਾਨਗਰ, ਇਸਟਰਨ ਏਕਸਪ੍ਰੇਸ ਹਾਇਵੇ, ਵਿਕ੍ਰੋਲੀ (ਪੂਰਬ), ਮੁੰਬਈ-੪੦੦ ੦੭੯, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ.

पिक्सेल

पिनॉक्सेडेन ५.१% ईसी

(निवडक तणनाशक)

पिनॉक्सेडेन ५.१% ईसी हे एक विशेष निवडलेले प्रादुर्भाव झाल्यानंतरचे तणनाशक असून ते *फालारिस मायनर* आणि *एव्हेना लुडोव्हिसियाना* ह्यांसारख्या महत्त्वाच्या गवती तणांच्या नियंत्रणासाठी विशेषत: गव्हाकरता सूचवले जाते. त्यामध्ये ५.१% सक्रिय घटक पिनॉक्सेडेन असून ते फॉर्म्युलेशनच्या (प्रमाणाच्या) एकूण ५० ग्रॅम प्रती लीटर इतके असते.

रासायनिक संघटना	**घटक (व/व)**
पिनॉक्सेडेन स. घ.	५.१०%
सेफनर: क्लोक्विन्टोसेट मिक्सिल	१.२६%
इमल्सिफाइंग एजेन्ट :	
कॅस्टर तेल इथोक्सिलेट- ३०	५.०५%
डॉडेसिल बेंझिन सल्फॉनिक एसिड, सीए सॉल्ट	२.०२%
थिकनर : पॉलीस्टीरीन	०.५१%
एडजुवंट : ट्रिस (२- इथीलिक्सिल) फॉस्फेट	३४.३०%
द्रावक : (टेट्राहायड्रो फ्युरॅन- २ वायएल)- मिथेनॉल	१८.२०%
सॉल्व्हेसो २०० एनडी	क्युएस
एकूण	**१००.००%**

वापरण्याची पद्धती आणि निर्देश: खाली दिलेल्या निर्देशांप्रमाणे वापरताना, पिनॉक्सेडेन ५.१% ईसी विशेषत: गव्हावरील *फालारिस मायनर* आणि *एव्हेना लुडोव्हिसियाना* ह्या तणांच्या प्रादुर्भावानंतरचे नियंत्रण करते.

पीक	तणाचे वैज्ञानिक नाव	प्रति हेक्टर मात्रा			शेवटच्या वापरापासून कापणीपर्यंतचा वाट पाहण्याचा कालावधी (दिवस)
		ए. आय. (ग्रॅ)	मिश्रणानुसार मात्रा (मिली)	पाण्यातील द्रावण (ली)	
गहू	कॅनारी ग्रास, *फालारिस मायनर*, वाईल्ड ओट, *एव्हेना लुडोव्हिसियाना*	४०-४५	८००-९००	२२५-३००	९०

वापरासाठी निर्देश: प्रादुर्भावानंतरचा फवारा म्हणून गहू पेरल्यानंतर ३०- ३५ दिवसांनी किंवा *फालारिस मायनर* आणि *एव्हेना लुडोव्हिसियाना* हे ३-५ पानाच्या वाढीच्या टप्प्यावर असताना फवारा.

घेतले जाण्याचा प्रकार: पिनॉक्सेडेन हे तणाच्या पालवीद्वारे तत्काळ शोषून घेतले जाऊन पाने आणि खोडाच्या वाढणाऱ्या बिंदुपर्यंत नेले जाते. उपचार केल्यानंतर ह्याच्या विरुद्ध कमकुवत असलेल्या तणाच्या प्रजाती ४८ तासांच्या आत वाढणे थांबवते, एक ते तीन आठवड्यांमध्ये पिवळ्या होतात आणि तीन ते पाच आठवड्यांमध्ये संपूर्णत: नियंत्रित होतात.

लावण्याची पद्धती: सपाट फॅन किंवा डिफ्लेक्टर नोझल ०८ व्हाईट (डीएफएन ०८) वापरून व ०.३५ मीटर इतकी स्थिर नोझल उंची ठेवून नॅपसॅक स्प्रेयरच्या सहाय्याने हे तणनाशक फवारले जाते आणि ह्यामुळे अरुंद आयताकार फवाऱ्याच्या आकारामध्ये मोठ्या कोनातून फॅन स्प्रे मिळतो. तणांच्या पालवीवर योग्य प्रकारे पसरावे म्हणून पाण्याच्या निर्देशित योग्य प्रमाणासह हे तणनाशक वापरा.

पुनर्पीक लवचिकता: हे तत्काळ जमिनीमध्ये विलय पावते आणि त्याची जमिनीमध्ये नगण्य प्रतिक्रिया होते किंवा होतही नाही. पुढील पिकांच्या वापरासाठी काहीही निर्बंध नाहीत.

साठवण :

१. तणनाशक असलेले पॅकेट मूळ कंटेनर्समध्ये वेगळ्या खोल्या किंवा परिसरामध्ये आणि अन्य वस्तु (विशेषत: खाद्य पदार्थ) ठेवण्याच्या जागेपासून व खोलीपासून वेगळे आणि शक्यतो कुलुप व किल्ली असलेल्या दुस-या कपाटामध्ये ठेवले गेले पाहिजे.

२. तणनाशक ठेवण्यासाठी वापरण्यात येणारी खोली किंवा जागा योग्य बांधलेली, कोरडी, पुरेशी प्रकाशित आणि हवा असलेली असावी आणि ती पुरेशी मोठी असावी, जेणेकरून वाफेचा संसर्ग त्यास होणार नाही.

सावधानता : स्प्रे द्रावण बनवण्यासाठी स्वयंपाकाची भांडी वापरू नये. स्प्रे द्रावण हलवण्यासाठी काठी वापरा. त्वचा, डोळे आणि कपड्यांसोबत संपर्क येऊ देऊ नका. धुके आणि वाफा ह्यांना श्वासावाटे घेणे टाळा. **त्वचेसोबत संपर्क येऊ नये म्हणून हातमोजे वापरा. संरक्षक कपडे, मास्क, गॉगल्स आणि बूट वापरून उत्पादन हाताळा.** उत्पादन वापरत असताना खाऊ, पिऊ किंवा धुम्रपान करू नका. काम झाल्यास साबण आणि पुरेशा पाण्याने हात धुवा आणि कपडे बदला. तणनाशक हवेच्या आणि जलाशयाच्या संपर्कात येऊ देऊ नका. दूषित झालेले कपडेसुद्धा धुवा.

वारंवार किंवा एकाच प्रकारे कोणतेही तणनाशक सारखे वापरल्यामुळे तण त्यापासून रोधक बनू शकतात. काही कृषीशास्त्रीय पद्धतींमुळे तण रोधक बनण्याची शक्यता कमी होऊ शकते. ज्या शेतांमध्ये रोधक तण असल्याचा संशय असेल, तिथे अशा प्रादुर्भावाच्या व्यवस्थापनासाठीचे उपाय एकत्रित वापरा. विशिष्ट निर्देशांसाठी, द्रप्रया आमच्या स्थानिक प्रतिनिधीशी संपर्क करा.

रिकाम्या कंटेनर्सची विल्हेवाट:

१. यंत्रे आणि कंटेनर्समधील पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त साहित्य व धुतलेले साहित्य ह्याची पर्यावरण आणि जल प्रदूषण होऊ नये, म्हणून सुरक्षित प्रकारे विल्हेवाट लावली गेली पाहिजे.

२. पुन: वापर होऊ नये म्हणून वापरलेले पॅकेजेस बाहेर टाकू नयेत.

३. पॅकेजेस तोडून वस्तीपासून दूर पुरले गेले पाहिजेत.

विषबाधेची लक्षणे : आजवर मानवी विषबाधा नोंदवण्यात आलेली नाही. प्रयोगशाळेतील अभ्यासांमध्ये, उंदीर (रॉडंट) मधील विषबाधेची लक्षणे उत्राविक नव्हती: अशक्तपणा, केस ताठ होणे. झोक किंवा बाक येणे, लाळ गळणे आणि अश्रु येणे.

प्राथमिक उपचार : प्रभावित झालेल्या व्यक्तीला मोकळ्या हवेसाठी पुरेशी हवा असलेल्या जागी हलवा आणि त्याला थंडीपासून संरक्षण द्या. **त्वचेशी संपर्क आला असल्यास:** दूषित कपडे काढा आणि साबण आणि पाण्याने शरीराचे दूषित झालेले भाग संपूर्ण स्वच्छ धुवा. **डोळ्याशी संपर्क आला असल्यास:** स्वच्छ पाण्याने कित्येक मिनिटे डोळे स्वच्छ धुवा. **पोटावाटे आत गेले असल्यास:** पाण्याच्या मोठ्या प्रमाणासह वैद्यकीय चारकोलने वारंवार उपाय करा. तत्काळ डॉक्टरांचे वैद्यकीय सहाय्य बोलावून घ्या. **सूचना:** बेशुद्ध असलेल्या व्यक्तीला तोंडावाटे कधीही काहीही देऊ नका किंवा जोर लावून उलटी करायला लावू नका.

विषावरील उतारा: कोणताही विशिष्ट उतारा ज्ञात नाही. लक्षणांप्रमाणे उपचार करा.

उत्पादक: सिंजेंटा इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (भूतपूर्व सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड),
अमर पॅराडीम्स, सर्व्हे. न. ११०/११/३, बाणेर रोड, पुणे- ४११०४५, महाराष्ट्र, भारत.

फॅक्टरीचा पत्ता: गाव निम्बुआ, तालुका डेरा बासी, जिल्हा एसएएस नगर (मोहाली), पंजाब - १४० ५०७, भारत.

विक्रेता : गोदरेज ॲग्रोवेट लिमिटेड, गोदरेज वन, तिसरा मजला, पिरोजशा नगर, ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, विक्रोळी (पूर्व), मुम्बई-४०० ०७९, महाराष्ट्र.

ਪਿਕਸੇਲ

ਪਿਨੋਕਸਾਡੇਨ ੫.੧% ਈ.ਸੀ.

(ਚੁਨਿੰਦੁ ਨਿੰਦਾਮਾਰਨਾਸ਼ਕ)

ਪਿਨੋਕਸਾਡੇਨ ੫.੧% ਈ.ਸੀ. ਚੁਨਿੰਦੁ ਉਦ੍ਭਵ ਪਈ ਹੋਈ ਵਰਤਾਸ਼ ਮਾਟੇਨੂੰ ਨਿੰਦਾਮਾਰਨਾਸ਼ਕ ਹੇ ਜੇਨੀ ਭਲਾਮਾਰੂ ਧਰੋਂਮਾਂ ਥਤਾ ਮਹਤ੍ਵਨਾ ਘਾਸ ਨਿੰਦਾਮਾਰੂਂ ਜੇਂਵਾਂ ਕੇ *ਫ਼ੇਲਾਰਿਸ ਮਾਯਨਰ* ਅਨੇ *ਐਵੀਨਾ ਲੁਡੋਵਿਸਿਯਾਨਾ* ਨਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਾਣ ਮਾਟੇ ਕਰਵਾਮਾਂ ਆਵੇ ਛੇ. ਤੇ ੫.੧% ਸਕ੍ਰਿਯ ਘਟਕ ਪਿਨੋਕਸਾਡੇਨ ਧਰਾਵੇ ਛੇ ਜੇ ਪ੍ਰਤਿ ਲੀਟਰ ੫੦ ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਯੋਜਨ ਬਰਾਬਰ ਛੇ.

ਰਾਸਾਯਨਿਕ ਸੰਰਚਨਾ :	**ਮਾਤ੍ਰਾ (ਵ/ਵ)**
ਪਿਨੋਕਸਾਡੇਨ ਸ.ਘ.	੫.੧੦%
ਸੇਫ਼ਨਰ: ਕਲੋਕਿਨ੍ਟੋਸੇਟ ਮੇਕ੍ਸਿਲ	੧.੨੬%
ਈਮਲ੍ਸਿਫ਼ਾਈਂਗ ਐਜੰਟ੍ਸ:	
ਕੇਸ੍ਟਰ ਆਇਲ ਈਥੋਕ੍ਸਿਲੇਟ-੩੦	੫.੦੫%
ਡੋਡੇਸੀਲ ਬੇਨ੍ਜ਼ਿਨ ਸਲ੍ਫ਼ੋਨਿਕ ਐਸਿਡ, ਕੈਲ੍ਸ਼ਿਯਮ ਸੋਲ੍ਟ	੨.੦੨%
ਥਿਕਨਰ: ਪੋਲਿਸ੍ਟਾਈਰੀਨ	੦.੫੧%
ਸਹਾਯਕ: ਟ੍ਰਿਸ (੨-ਐਥਿਲਹੇਕ੍ਸਿਲ) ਫ਼ੋਸ੍ਫ਼ੇਟ	੩੪.੩੦%
ਸੋਲ੍ਵੇਂਟ੍ਸ : (ਟੇਟ੍ਰਾਹਾਈਡ੍ਰੋ-ਫ਼੍ਯੂਰਾਨ-੨ਵਾਈਐਲ)-ਮੇਥਾਨੋਲ	੧੮.੨੦ %
ਸੋਲ੍ਵੇਸੋ ੨੦੦ ਐਨਡੀ	ਜ਼.ਮਾ.
ਕੁਲ	**੧੦੦.੦੦%**

ਵਪਰਾਸ਼ ਅਨੇ ਉਪਯੋਗ ਮਾਟੇਨੀ ਭਲਾਮਾਰੂ: ਨੀਚ ਆਪੇਲੀ ਭਲਾਮਾਰੂਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਯੋਗ ਕਰਵਾਮਾਂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪਿਨੋਕਸਾਡੇਨ ੫.੧% ਈਸੀ ਘਾਸ ਖਾਸ ਕਰੀਨੇ ਧਰੋਂਮਾਂ ਥਤਾ *ਫ਼ੇਲਾਰਿਸ ਮਾਯਨਰ* ਅਨੇ *ਐਵੀਨਾ ਲੁਡੋਵਿਸਿਯਾਨਾ*ਨੂੰ ਉਦ੍ਭਵ ਪਈਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਾਣ ਪੂਰੂ ਪਾਡੇ ਛੇ.

ਪਾਕ	ਨਿੰਦਾਮਾਰਨੂੰ ਵੈਜ਼ਾਨਿਕ ਨਾਮ	ਮਾਤ੍ਰਾ ਪ੍ਰਤਿ ਹੇਕ੍ਟਰ			ਛੇਲ੍ਲਾ ਛੰਟਕਾਵਥੀ ਲਾਗੂਰੂੀ ਵਚ੍ਚੇਨੋ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਸ਼ਾ ਗਾਰੀ (ਦਿਵਸੋਮਾਂ)
		ਸ. ਘ. (ਗ੍