# গোদরেজ প্রোনাউন্স®

## কুইজালোফোস ইথাইল ৭.৫%+ ইমাজিথাপার ১৫% ওজন/ওজন ই.সী.

### আগাছানাশক

কুইজালোফোপ ইথাইল ৭.৫% + ইমাজিথাপার১ ১৫% ওজন / ওজন ইসি একটি আগাছামুক্ত মিশ্রণ যা ঘাসের গোষ্ঠী, এসেডেজ গ্রুপ এবং চিনাবাদামে বিক্ষুব্ধ পাতার আগাছা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয়।

**ব্যবহার:**

| ফসল | আগাছার সাধারণ নাম | মাত্রা/হেক্টর সা.উ. (গ্রা.) | ফর্মুলেশন (মি.লী.) | তরলীকরণ জল (লি.) | শেষ স্প্রে থেকে ফসল তোলা পর্যন্ত অপেক্ষাকাল (দিন) |
|---|---|---|---|---|---|
| চিনাবাদাম | ডাক্টিলোক্টেনিয়াম আয়াগপ্টিয়াম (মাকড়া), ডিজিটারিয়া প্রজাতি (কাক ঘাস), ইচিনোক্লোয়া প্রজাতি (সমা), সইপ্রাস রোটুন্ডাস (মোথা), ক্যোমেলিনা বাঙ্গালেনসিস (কনকওয়া), ডাযাক্টেলা আর্টেনসিস (লম্বুয়া) | ৩২৮১+ ৬৫.৬২৫ | ৪৩৭.৫ | ৩৭৫-৫০০ | ৯০ |
| সয়াবিন | ডিনরা আরবিকা (বাইগ্রস গ্রাস), ডিজিটেরিয়া সাঙ্গুইনালিস (ক্রাবগ্রাস), ডাক্টিলোক্টেনিয়াম ইজিপ্টিয়াম (বারমুডা ঘাস), দিগারা আরাটেনসিস (মিথ্যা আমরণ)। সইনোডন ডাকটাইলন (বারমুডা ঘাস), কুকুলিনা রোগোসিলিস (রুপ্টীয় বারমুডা)। | ৩২৮১+ ৬৫.৬২৫ | ৫০০ | ৭৫ |

**ব্যাবহারের নির্দেশনা** - ১. কুইজালোফপ ইথাইল ৭.৫% ইমাজিথাযার ১৫% ওজন / ওজন ইসি। এবং প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে সার্ফাক্টান্ট, উপযুক্ত পরিমাণটি নিন, এতে সামান্য জল যোগ করান, এটি ভালভাবে ভ্রণীভূত করান, তারপর ভালভাবে নাড়তে গিয়ে বাকি জল এতে যোগ করান। ২. এটি বাতাসের বিপরীত দিকে সপ্রে করানোর না।

**সময় এবং ব্যবহারের পদ্ধতি** : কুইজালোফোপ ইথাইল ৭.৫% + ইমাজিথাপার ১৫% ওজন / ওজন ইসি ব্যবহার করে চিনাবাদামে এবং সোয়াবীন ২ থেকে ৪ পাতার পর্যায়ে (বপনের ১০ থেকে ২০ দিন) পরে প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে সারফাক্টান্ট ব্যবহার করান

**ব্যবহারের জন্য জল অনুশীলন কৌশল**

**মিক্সিং নির্দেশাবলী** - কুইজালোফোপ ইথাইল ৭.৫% + ইমাজিথাযার ১৫% ওজন / ওজন ইসি। কৃপের ক্ষেত্রফল অনুসারে প্রয়োজনীয় পানিতে উপযুক্ত পরিমাণে জল যোগ করান। প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে সার্ফাক্টান্ট ব্যবহার করান এবং এটি ভালভাবে মিশ্রিত করান।

**আবহাওয়ার অবস্থা** - খোলা আকাশের সময় ব্যবহার করান। প্রবল বাতাসের ঘটনায় ব্যবহার করবেন না।

**পুনরায় প্রয়েশের সময়** - ২৪ ঘণ্টা।

**প্রাক-ফসল কাটার বাবধান** - চিনাবাদাম ৯০ দিন, সোয়াবীন ৭৫ দিন (উপরের টেবিলের মতো দেখানো হয়েছে)

**পরিমাণ** - ৪৩৭.৫ মিলি / হেক্টর (উপরের টেবিলে দিয়ারো দেখানো হয়েছে।)

**ব্যবহারের সময়** - প্রভাতের সকাল বা সন্ধ্যায়

**ফ্রিকোয়েন্সি এবং সর্বাধিক ব্যবহারের সংখ্যা** - একটি

**উদ্দেশ্য** - কৃষি ব্যবহারের জন্য।

**উদ্ভিদের বিষক্রিয়া** - প্রস্তাবিত পরিমাণ অনুযায়ী ব্যবহার করা হলে এই গাছটি বিষাক্ত নয়। যে পরিস্থিতিতে পরিস্থিতিতে কীটনাশকগুলি রোদও ফসলের উপরে অনুপযুক্ত হয়ে - ফসল পাকা হওয়ার পরে এবং ফসল কাটার আগে ব্যবহার করবেন না।

**মাটি এবং জল** - সব ধরণের মাটি এবং জল।

**কৃষি প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম** - নাগপাসাক স্প্রেয়ার

**নজল** - ফ্লাট ফ্যান / বন্যার জেট

**সাবধানতা** : ১) খাদ্যদ্রব্য, খাদ্য খাদ্যদ্রব্যের পাত্র এবং পশু খাদ্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখুন। ২) মুখ, চোখ এবং ত্বকের ছোঁয়াচ এড়িয়ে চলুন। ৩) স্প্রের ছিটা নিশ্বাসের সাথে যেন চলে না যায়। বাতাসের দিকে নির্দেশ করে স্প্রে করুন। ৪) স্প্রে করার পর ছোঁয়াচ লাগা পোশাক এবং শরীরের আশ জল করে ধুয়ে ফেলুন। ৫) স্প্রে করার সময় কোন কিছু খাওয়া, পান করা বা চিনাবো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

**বিষাক্ততার উপসর্গ ও লক্ষণসমূহ** : বিষের কোনও নির্দিষ্ট লক্ষণ নেই। মাথা ব্যথা, বমি ভাব, বমি ভাব, মাথা ঘোরা এবং চোখ এবং ত্বকে ঝালাটি দেখা দিতে পারে।

**প্রাথমিক চিকিৎসা** - ১. যিদো দেওয়ার সময় - যদি ব্যক্তি সচেতন হয় তবে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন এবং ১ থেকে ২ গ্লাস পানি পান করার জন্য দিন। অজ্ঞান ব্যক্তিকে মুখ দিয়ে কিছু দেবেন না। এক্ষেত্রে ডাক্তারকে ডেকে আনুন: চিকিৎসকের অজ্ঞাত ফিতিয়ুস্থ ব্যক্তিকে বমি করার জন্য উত্তেজ করবেন না। ২) গন্ধ: আক্রান্ত ব্যক্তিকে খোলা বাতাসে নিয়ে যান এবং শরীরের রাগনরাহ্য মনোযোগ দিন। যদি শ্বাস নিতে অসুবিধা হয় তবে মুখের মাধ্যমে কৃত্রিম শ্বাস দিন শ্বাসপ্রক্রচিকিৎসা পরামর্শ দিন। ৩. ত্বক দূষিত হলে - শরীরের দূষিত অংশের চুল এবং নখগুলি সাবান দিয়ে ভাল করে ধুয়ে দিন। যদি ব্যথা লাল দাগ বা ফুলা সংক্রমণ হয় তবে চিকিৎসার পরামর্শ দিন। সমস্ত দূষিত পোশাক বাতাসে আটা সাবান দিয়ে ভাল করে ধুয়ে দিন। ৪. একবার প্রয়োগ করার পরে ১৪ মিনিটের জন্য পরিষ্কার জল দিয়ে আপনার চোখ ভালভাবে ধুয়ে ফেলুন। চিকিৎসা পরামর্শ দিন।

**প্রতিষেধক** - নির্দিষ্ট কোন প্রতিষেধক নেই, লক্ষণগুলোর চিকিৎসা করুন।

**সতর্কতা বিবৃতি** - ১. এই পণ্যটি মাছ এবং জলজ প্রাণীর পক্ষে বিষাক্ত, তাই এটি জলজ চাষের কাছাকাছি ব্যবহার করা উচিত নয়। ২. বিষের প্রভাব এবং ক্লিপতে উল্লিখিত ইশারা ব্যতীত অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য নয়। ৩. ফসল কাটার পরে প্রয়োগের জন্য ব্যবহার করবেন না ৪. যদি পাত্রে পুনরায় ব্যবহার করা বিপজ্জনক। ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ব্যবহারের পরে খালি প্যাকেজগুলি ধ্বংস করুন।

**খালি প্যাকেট নিষ্পত্তি** - ১. আগাছা নিয়োজক উৎপাদনকারী এবং ব্যবহারকারীর কর্তব্য যে পাত্রে / পাত্রে বা অবশিষ্টাংশের আগাছা এবং বর্জ্যজনি নিরাপদ উপায়ে নিষ্পত্তি করা যাতে পরিবেশ ও জল দূষণ না হয়। ২. ব্যবহৃত প্যাকেজগুলির বাইরে রাখলেন না যাতে সেগুলি পুনরায় ব্যবহার করা হয়। ৩. খালি বস্তি পুনরায় ব্যবহার বিপজ্জনক। ব্যবহৃত প্যাকেজগুলি জলসংখ্যার থেকে দূরে মাটিতে পুঁতে ফেলা উচিত।

**স্টোরেজ** - ১. আগাছা নিয়োজকগুলি কাঁচা / প্যাকেজগুলিকে অন্য কক্ষ বা অন্য আইটেমগুলি রাখা হয়েছে এমন জায়গা থেকে দূরে পৃথক কক্ষে বা জায়গায় রাখতে হবে, বা আগাছা নিয়োজক প্রমান এবং প্রকার অনুযায়ী পৃথক কাক্তগুলিতে লক-কী রাখতে হবে। ২. যে ঘরে ঘরে আগাছা নিয়োজকটি সংরক্ষণ করতে হবে সেগুলি ভাল করে তৈরি, শুকনো, বায়ুচলাচল এবং পর্যাপ্ত আকারের হওয়া উচিত, যেখানে বাষ্পের মাধ্যমে আগাছাঘটিত দূষিত হওয়ার কোনও আশঙ্কা নেই।

**রাসায়নিক রাসা:**

| | |
|---|---|
| কুইজালোফোপ ইথাইল স.ত. | ৭.৫% ওজন/ওজন |
| ইমিজাথাপার স.ত. | ১৫.০০% ওজন/ওজন |
| ডাইমিথাইল সালফক্সাইড | ৪৩.০% ওজন/ওজন |
| এন - মিথাইল - ২ - পাইরোলিডোন | ৭.০০% ওজন/ওজন |
| এমুলসিফায়ার (আলকাইল অ্যারিল) পলিগ্লোকোল-পলি অক্সি.ইথিলিন ইথার) | ১২.০০% ওজন/ওজন |
| দ্রাবক সি-৯ | পর্যাপ্ত পরিমাণ |
| সর্ব মোট | ১০০.০০% ওজন/ওজন |
| সার্ফাক্টান্টগুলির রাসায়নিক সাম্মিশ্র | |
| মিথাইল ওলিয়েট | ৩০-৬০% ওজন/ওজন |
| অ্যামোনিয়াম সালফেট | ১০-৩০% ওজন/ওজন |
| অনআয়নিক সার্ফাক্টান্ট এবং ননহাজারডাস জল সহ জলাশয় | পর্যাপ্ত পরিমাণ |
| সর্ব মোট | ১০০.০০% ওজন/ওজন |

**ব্যবহার জন্য নির্দেশ** : ব্যবহার পূর্ব সংলগ্ন পত্রিকা পড়ুন।

**BENGALI**

# ગોદરેજ પ્રોનાઉન્સ®

## ક્વિઝોલોપ ઇથાઇલ ૭.૫% + ઇમાઝીથાઇર ૧૫% વજન / વજન ઇ.સી.

### (નિંદામણનાશક)

ક્વિઝાલોપસ્થ૬૬૫ એથિલ ૭.૫% + ઇમાઝીથાપર૫ ૧૫% વજન/વજન ઇસી એ ઘાસના જૂથ, સેજ જૂથ અને મગફળીમાં પહોળા પાંદડા નીંદણને નિયંત્રિત કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા નીંદણનાશક મિશ્રણ છે.

**વાપરવુ :**

| પાક | નીંદણનું સામાન્ય નામ | હેક્ટરદીઠ પ્રમાણ સ.ઘ. (ગ્રા.) | સંરચના (મિ.લી.) | પાણીનું પ્રમાણ (લિટર) | અંતિમ છંટકાવ તથા લણણી વચ્ચેનું અંતર (દિવસોમાં) |
|---|---|---|---|---|---|
| મગફળી | ડેક્ટીલોસેટેનિયમ એજેપ્ટિયમ (મકડા), ડિજિટેરિયા પ્રજાતિ (કેબ ગવત), ઇચિનોક્લોઆ પ્રજાતી (સમા), સાયપરસ રોટુંડસ (મોથા), કોમેલિના બેંગાલેન્સિસ (કનકવા), ડાયચેરા આર્ટેન્સિસ (લહસવા) | ૩૨.૮૧+ ૬૫.૬૨૫ | ૪૩૭.૫ | ૩૭૫-૫૦૦ | ૯૦ |
| સોયાબીન | ડિનેબ્રા અરેબિકા (વાઇપર ગવત), ડિજિટારિયા સાંગિનાલિસ (કેબગ્રાસ), ડેક્ટિલોકટેનિયમ ઇજિપ્ટિયમ (બરમુડા ઘાસ), ડિનેરા આર્વેન્સિસ (ખોટું રાજમારગ), સિનોડોન ડેક્ટીલોન (બર્મુડા ઘાસ), કોમેલીના બેંગાલેન્સીસ (ઉષ્ણકટિબંધીય સ્પાઇડરવોર્ટ). | ૩૨.૮૧+ ૬૫.૬૨૫ | ૪૩૭.૫ | ૫૦૦ | ૭૫ |

**ઉપયોગ માટે સૂચનો** - ૧. ક્વિઝોલોપ ઇથિલ ૭.૫% ઇમાઝીથાઇર ૧૫% વજન / વજન ઇ.સી. અને લિટર પાણી દીઠ ૧ મિલીના દરે સરફેક્ટન્ટ, યોગ્ય રકમ લો, તેમાં થોડું પાણી ઉમેરો, સારી રીતે વિસર્જન કરો, પછી સારી રીતે હલાવતા વખતે બાકીનું પાણી તેમાં ઉમેરો. ૨. તેને હવાની વિરુદ્ધ દિશામાં છાંટશો નહીં.

**સમય અને ઉપયોગ કરવાની પદ્ધતિ** : ક્વિઝલોફોપ એથિલ ૭.૫%+ ઇમાઝિથાપર ૧૩% વજન/વજન ઇસીનો ઉપયોગ મગફળી અને સોયાબીનમાં નીંદણનો ઉપયોગ ૨ થી ૪ પાંદડાના તબક્કે (વાવણી પછી ૧૦ થી ૨૦ દિવસ) સરફેક્ટન્ટ સાથે ૬૨ ૧ લિટર પાણી દીઠ કરો.

**ઉપયોગ માટે સારી પ્રથા તકનીક-**

**મિશ્રણ સૂચનાઓ** - ક્વિઝલોફોપ ઇથિલ ૭.૫% + ઇમાથિયાપર ૧૫% વજન/વજન ઇ.સી. વિહિરીચા ક્ષેત્રાનુસાર આવશ્યક ત્યા પ્રમાણત યોગ્ય પ્રમાણત પાણી ઘાલા. પ્રતિ લિટર પાણ્યાત ૧ મિલી દરાને સરફેક્ટર વાપરા આણિ ચાંગલે મિસઝા.

**હવામાન સ્થિતી** - મોકળે આકાશ દરમ્યાન વાપરા. ચોરદાર વારા ઝાલ્યાસ વાપરુ નકા.

**પુન્હા પ્રવેશ વેળ** - ૨૪ તાસ

**પીકપૂર્વ મધ્યાંતર** - શેંગદાણા ૯૦ દિવસ, સોયાબીન ૭૫ દિવસ (વરીલ સારણીમધ્યે દર્શવિલ્યાપ્રમાણે.)

**પ્રમાણ** - ૪૩૭.૫ મિ.લી. / હેક્ટર (વરીલ સારણીમધ્યે દાખલ્યાપ્રમાણે.)

**વાપરાવી વેળ** - પ્રામુખ્યાને સકાળી કિંવા સંધ્યાકાળી.

**વારંવારતા આણિ ગારસ્તીત જાસ્ત વાપરાંવી સંખ્યા** - એક

**ઉદેશ** - શેતી વાપરાસાઠી.

**જ્ઞાડાવી વિષવાદ્યા** - સુચવિલેલ્યા પ્રમાણત ત્યાનુસાર ઘ્યી વનસ્પતી વિષારી નસતે.

**જ્યા પરિસ્થિતીત કીટકનાશકે પિકાવર અયોગ્ય અસતીલ અશા પરિસ્થિતી** - પીક યોગ્ય ઝાલ્યાવર આણિ કાપણીપૂર્વી વાપરે નકા.

**માતી આણિ પાણી** - સર્વ પ્રકારચી માતી આણિ પાણી.

**કૃષી સંરક્ષણ ઉપકરણે** - નેપ્સૉક સ્પ્રેઅર

**નોજલ** - ફ્લૅટ ફૅન/ફ્લૅટ જેટ.

**વાપરકર્યાસાઠી ચેતવણી** : ૧. ખાદ્યપદાર્થ, માંડી આણિ જનાવરાંચ્યા આહારાંપાસૂન દૂર રહા. ૨. તોંડ, ત્વચા આણિ ડોળે યાંચા સંપર્ક ટાળા. ૩. શ્વાસો શ્વાસ ઘેતા ફવારે, ફક્ત હવેચ્યા દિશેને ફવારની કરા. ૪. ફવારણીનંતર દૂષિત કપડે આણિ શરીરાચે ભાગ ચાંગલે ધુવા. ૫. ફવારણીચ્યા વેળી ધૂમ્રપાન કરુ નકા, આણિ કહીહી ચર્વણ કરુ નકા. ૬. ફવારણી કિંવા થરથર કાપતાના પૂર્ણ સંરક્ષક કપડે ઘાલા.

**વિષાચી ચિન્હે** - વિષવાધા હોણ્યાચી કોણતીહી વિશિષ્ટ લક્ષણે નાહીત. ડોકેદુખી, મળમળ, ઉલટ્યા होणे, चक्कर येणे आणि डोळे आणि त्वचेमध्ये असोशी प्रतिक्रिया येऊ शकतात.

**प्रथमोपचार - १. गिळण्यावर** - जर व्यक्ती जागरूक असेल तर पाण्याने स्वच्छ धुवा आणि १ ते २ ग्लास पाणी पिण्यासाठी द्या. बेशुद्ध व्यक्तीस तोंडाने काहीही देऊ नका. डॉक्टरांना कॉल करा, डॉक्टरांच्या अनुपस्थितीत बाधित व्यक्तीला उलट्या करण्यास प्रवृत्त करु नका. **२. वास येणे:** बाधित व्यक्तीला मोकळ्या हवेत घ्या आणि शरीराच्या तापमानावर लक्ष द्या. जर श्वास घेणे कठीण असेल तर तोंडाद्वारे कृत्रिम श्वास द्या. वैद्यकीय सल्ला घ्या. **३. जर त्वचा दूषित असेल तर** - शरीराच्या दूषित भागाचे केस आणि नखे साबणाने चांगले धुवा. जर वेदना लाल ठिपके किंवा जळत्या खळबळ असतील तर वैद्यकीय सल्ला घ्या. वापरण्यापूर्वी सर्व दूषित कपडे साबणाने चांगले धुवा.

**४. डोळे** : एकदा लागू झाल्यावर डोळे स्वच्छ पाण्याने चांगले धुवा. वैद्यकीय सल्ला घ्या.

**विषाचा उतारा** - तेथे विशिष्ट विषाचा उतारा नसतो, रोगसूचकपणे उपचार करा.

**सावधगिरीचे विधान** - १. हे उत्पादन मासे आणि जलीय जीवनासाठी विषारी आहे, म्हणून हे जलचरांच्या जवळपास वापरू नये. २. लेबल आणि स्पिनवर सूचित केलेल्या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही हेतूसाठी नाही. ३. कापणीनंतरच्या अनुप्रयोगांसाठी वापरू नका. ४. रिक्त कंटेनरचा पुन्हा वापर करणे धोकादायक आहे. प्रिस्क्रिपशनसुार वापरल्यानंतर रिक्त पॅकेज नष्ट करा.

**रिकामे डब्याची विल्हेवाट** - १. तणनाशक उत्पादक आणि वापरकर्त्याचे कर्तव्य आहे की कंटेनर / कंटेनर किंवा उर्वरित तणांचे कचरा आणि त्याची सुरक्षिततापूर्वक विल्हेवाट लावणे जेणेकरून पर्यावरणीय आणि पाण्याचे प्रदूषण होणार नाही. २. वापरलेले संकुल बाहेर वापरू नका जेणेकरून त्यांचा पुन्हा उपयोग होणार नाही. रिक्त डब्बे पुन्हा वापर करणे धोकादायक आहे. वापरलेली पॅकेजेस तोडली पाहिजेत आणि लोकसंख्येपासून दूर ग्राउंडमध्ये दफन करावी.

**स्टोरेज** - १. तणनाशक डब्बेसली डिब्बे / पॅकेजेस ज्या खोल्या किंवा इतर वस्तू ठेवल्या आहेत त्या खोल्यांपासून दूर स्वतंत्र खोल्यांमध्ये किंवा ठिकाणी ठेवल्या पाहिजेत किंवा तणनाशकाच्या पुराये व प्रकारानुसार स्वतंत्र शेल्फमध्ये लॉक-की ठेवावी. २. ज्या खोल्या किंवा कपाटांमध्ये तणनाशक साठवायचे आहे ते चांगले तयार केलेले, कोरडे, हवेशीर व पुरेसे आकाराचे असले पाहिजेत ज्यात तणनाशकाचा वापरुने दूषित होण्याचा धोका नाही.

**रासायनिक रचना:**

| | |
|---|---|
| क्विझालोप इथाइल स.घ. | ७.५०% વજન/વજન |
| इमजीथापर स.घ. | १५.००% વજન/વજન |
| डायमिथाइल सल्फोक्साईड | ४३.००% વજન/વજન |
| एन - मिथाइल - २ - पायरोलिडोन | ७.००% વજન/વજન |
| झ्म्लसीफायर (अल्काइल अराइल सल्फोनेट-पॉलि ऑक्सी-इथिलीन इथर) | १२.००% વજન/વજન |
| सॉल्व्हेंट सी -९ | पुरेशी प्रमाणात |
| एकूण | १००.००% વજન/વજન |

**सर्फेक्टंटची रासायनिक रचना**

| | |
|---|---|
| मिथाइल ओलीएट | ३०-६०% વજન/વજન |
| अमोनियम सल्फेट | १०-३०% વજન/વજન |
| नॉन-आयनिक सर्फेक्टंट्स आणि पाण्यासह नॉनहेझार्डस | पुरेशी प्रमाणात |
| एकूण | १००.००% વજન/વજન |

**ઉપયોગ માટે ભલામણ** : ઉપયોગ થી પહેલાં સંલગ્ન પત્રિકા વાંચો.

**GUJARATI**

# गोदरेज प्रोनाउन्स®

## क्विझोलोपॉप इथिल ७.५% + इमेझिथॅफर १५% वजन / वजन ई.सी.

### (तणनाशक)

क्विझोलोपॉप इथिल ७.५% इमेझिथापार १५% वजन/वजन ईसी है तणनाशक मिश्रण आहे जे शेंगदाण्यातील सेज्र गट आणि पानाचे तण गवताच्या नियंत्रणासाठी वापरले जाते.

**शिफारस :**

| पीक | तणांचे सामान्य नाव | मात्रा / प्रति हेक्टर स.घ. (ग्रॅम) | फॉर्मुलेशन (मि.ली.) | पाण्यात सौम्यीकरण (लीटर) | शेवटची फवारणी व कापणी मधील प्रतीक्षा कालावधी (दिवसांमध्ये) |
|---|---|---|---|---|---|
| शेंगदाणे | डेक्टिलोसेटेनियम अरेंप्टियम (मकडा), डिजिटेरिया प्रजाती (केब गवत), इचिनोक्लोआ प्रजाती (समा), सायप्रस रोटुंडस (मोथा), कोमेलिना बेंगालेन्सिस (कनकवा), डायचेरा आर्टेन्सिस (लहसवा) | ३२.८१+ ६५.६२५ | ४३७.५ | ३७५-५०० | ९० |
| सोयाबीन | डिनेब्रा अरेबिका (वाइग्रस गवत), डिजिटारिया सांगिनालिस (केबग्रास), डेक्टिलोकटेनियम इजिप्टियम (क्रोफूट गवत), डिजेरा आर्टेन्सिस (खोटे राजगिरा), साएनोडॉन डॅक्टिलॉन (बरमुडा गवत), कॅमेलिना बेंगालेन्सिस (उष्णकटिबंधीय स्पाइडरवॉर्ट). | ३२.८१+ ६५.६२५ | ४३७.५ | ५०० | ७५ |

**वापरासाठी सूचना** - १. क्विजलोफोप इथिल ७.५% इमेझिथॅफर १५% वजन/वजन ई.सी. आणि एक लिटर पाण्यासाठी १ मि.ली. दराने सर्फेक्टंट, योग्य प्रमाणात रक्कम घ्या, त्यात थोडेसे पाणी घाला, चांगले विरघळवा, नंतर उरलेले पाणी चांगले ढवळत असताना घाला. २. हवेच्या उलट दिशेने फवारणी करु नका.

**वेळ आणि वापरण्याची पद्धत** : क्विझोलोपॉप इथिल ७.५% + इमाझिथापार १५% वजन/वजन ईसीचा वापर शेंगदाण्यान आणि सोयाबीनमध्ये तणांचा २ ते ४ पानांच्या अवस्थेत (पेरणीनंतर १० ते २० दिवस) एक लिटर पाण्यात प्रति लिटर दराने सरफेक्टंटसह वापरा.

**वापरासाठी बांगले सराव तंत्र :**

**मिश्रण सूचना** - क्विझोलोपॉप इथिल ७.५%+ इमाझियापार १५% वजन/वजन ई.सी. विहिरीच्या क्षेत्रानुसार आवश्यक त्या प्रमाणात योग्य प्रमाणात पाणी घाला. प्रति लिटर पाण्यात ५ मिली दराने सरफेक्टंट वापरा आणि चांगले मिसळा.

**हवामान स्थिती** - मोकळे आकाश दरम्यान वापरा. जोरदार वारा झाल्यास वापरू नका.

**पुन्हा प्रवेश वेळ** - २४ तास

**पीकपूर्व मध्यांतर** - शेंगदाणा ९० दिवस, सोयाबीन ७५ दिवस (वरील सारणीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे.)

**प्रमाण** - ४३७.५ मिली / हेक्टर (वरील सारणीमध्ये दाखवल्याप्रमाणे.)

**वापराची वेळ** - प्रामुख्याने सकाळी किंवा संध्याकाळी.

**वारंवारता आणि जास्तीत जास्त वापरांची संख्या** - एक

**उद्देश** - शेती वापरासाठी.

**झाडावी विषबाधा** - सुचविलेल्या प्रमाणात त्यानुसार ही वनस्पती विषारी नसते.

**ज्या परिस्थितीत कीटकनाशके पिकावर अयोग्य असतील अशा परिस्थिती** - पीक योग्य झाल्यावर आणि कापणीपूर्वी वापरु नका.

**माती आणि पाणी** - सर्व प्रकारची माती आणि पाणी.

**कृषी संरक्षण उपकरणे** - नॅपसॅक स्प्रेअर

**नोजल** - फ्लॅट फॅन/फ्लॅट जेट.

**वापरकर्त्यासाठी खबरदारी** : १. खाद्यपदार्थ, भांडी आणि जनावरांच्या आहारांपासून दूर रहा. २. तोंड, त्वचा आणि डोळे यांचा संपर्क टाळा. ३. श्वासो श्वास घेताना फवारणी करू नका, फक्त हवेच्या दिशेने फवारणी करा. ४. फवारणीनंतर दूषित कपडे आणि शरीराचे भाग चांगले धुवा. ५. फवारणीच्या वेळी धूम्रपान करू नका, आणि कहीही चर्वण करू नका. ६. फवारणी किंवा थरथर कापताना पूर्ण संरक्षक कपडे घाला.

**विषाची चिन्हे** - विषबाधा होण्याची कोणतीही विशिष्ट लक्षणे नाहीत. डोकेदुखी, मळमळ, उलट्या होणे, चक्कर येणे आणि डोळे आणि त्वचेमध्ये असोशी प्रतिक्रिया येऊ शकतात.

**प्रथमोपचार - १. गिळण्यावर** - जर व्यक्ती जागरूक असेल तर पाण्याने स्वच्छ धुवा आणि १ ते २ ग्लास पाणी पिण्यासाठी द्या. बेशुद्ध व्यक्तीस तोंडाने काहीही देऊ नका. डॉक्टरांना कॉल करा, डॉक्टरांच्या अनुपस्थितीत बाधित व्यक्तीला उलट्या करण्यास प्रवृत्त करु नका. **२. वास येणे:** बाधित व्यक्तीला मोकळ्या हवेत घ्या आणि शरीराच्या तापमानावर लक्ष द्या. जर श्वास घेणे कठीण असेल तर तोंडाद्वारे कृत्रिम श्वास द्या. वैद्यकीय सल्ला घ्या. **३. जर त्वचा दूषित असेल तर** - शरीराच्या दूषित भागाचे केस आणि नखे साबणाने चांगले धुवा. जर वेदना लाल ठिपके किंवा जळत्या खळबळ असतील तर वैद्यकीय सल्ला घ्या. वापरण्यापूर्वी सर्व दूषित कपडे साबणाने चांगले धुवा.

**४. डोळे** : एकदा लागू झाल्यावर डोळे स्वच्छ पाण्याने चांगले धुवा. वैद्यकीय सल्ला घ्या.

**विषाचा उतारा** - तेथे विशिष्ट विषाचा उतारा नसतो, रोगसूचकपणे उपचार करा.

**सावधगिरीचे विधान** - १. हे उत्पादन मासे आणि जलीय जीवनासाठी विषारी आहे, म्हणून हे जलचरांच्या जवळपास वापरू नये. २. लेबल आणि स्पिनवर सूचित केलेल्या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही हेतूसाठी नाही. ३. कापणीनंतरच्या अनुप्रयोगांसाठी वापरू नका. ४. रिक्त कंटेनरचा पुन्हा वापर करणे धोकादायक आहे. प्रिस्क्रिपशनसुार वापरल्यानंतर रिक्त पॅकेज नष्ट करा.

**रिकामे डब्याची विल्हेवाट** - १. तणनाशक उत्पादक आणि वापरकर्त्याचे कर्तव्य आहे की कंटेनर / कंटेनर किंवा उर्वरित तणांचे कचरा आणि त्याची सुरक्षिततापूर्वक विल्हेवाट लावणे जेणेकरून पर्यावरणीय आणि पाण्याचे प्रदूषण होणार नाही. २. वापरलेले संकुल बाहेर वापरू नका जेणेकरून त्यांचा पुन्हा उपयोग होणार नाही. रिक्त डब्बे पुन्हा वापर करणे धोकादायक आहे. वापरलेली पॅकेजेस तोडली पाहिजेत आणि लोकसंख्येपासून दूर ग्राउंडमध्ये दफन करावी.

**स्टोरेज** - १. तणनाशक डब्बेसली डिब्बे / पॅकेजेस ज्या खोल्या किंवा इतर वस्तू ठेवल्या आहेत त्या खोल्यांपासून दूर स्वतंत्र खोल्यांमध्ये किंवा ठिकाणी ठेवल्या पाहिजेत किंवा तणनाशकाच्या पुराये व प्रकारानुसार स्वतंत्र शेल्फमध्ये लॉक-की ठेवावी. २. ज्या खोल्या किंवा कपाटांमध्ये तणनाशक साठवायचे आहे ते चांगले तयार केलेले, कोरडे, हवेशीर व पुरेसे आकाराचे असले पाहिजेत ज्यात तणनाशकाचा वापरुने दूषित होण्याचा धोका नाही.

**रासायनिक रचना:**

| | |
|---|---|
| क्विझालोप इथाइल स.घ. | ७.५०% વજન/વજન |
| इमजीथापर स.घ. | १५.००% વજન/વજન |
| डायमिथाइल सल्फोक्साईड | ४३.००% વજન/વજન |
| एन - मिथाइल - २ - पायरोलिडोन | ७.००% વજન/વજન |
| झ्म्लसीफायर (अल्काइल अराइल सल्फोनेट-पॉलि ऑक्सी-इथिलीन इथर) | १२.००% વજન/વજન |
| सॉल्व्हेंट सी -९ | पुरेशी प्रमाणात |
| एकूण | १००.००% વજન/વજન |

**सर्फेक्टंटची रासायनिक रचना**

| | |
|---|---|
| मिथाइल ओलीएट | ३०-६०% વજન/વજન |
| अमोनियम सल्फेट | १०-३०% વજન/વજન |
| नॉन-आयनिक सर्फेक्टंट्स आणि पाण्यासह नॉनहेझार्डस | पुरेशी प्रमाणात |
| एकूण | १००.००% વજન/વજન |

**वापरासाठी निर्देश** : वापऱ्यापूर्वी संलग्नन पत्रिका पहा.

**MARATHI**

# ਗੋਦਰੇਜ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ®

## ਕੁਇਜ਼ਲੋਫੋਪ ਈਥਾਈਲ ੭.੫%+ ਇਮਾਜ਼ਿਥਾਪਾਰ ੧੫% ਭਾਰ/ਭਾਰ ਈ.ਸੀ.

### (ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ)

ਕੁਇਜ਼ਲੋਫੋਪ ਈਥਾਈਲ ੭.੫% + ਇਮਾਜ਼ਿਥਾਪਾਰ ੧੫% ਭਾਰ/ਭਾਰ ਈਸੀ ਇੱਕ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਮਿਸਰਣ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਦੇ ਸਮੂਹ, ਸੇਜ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

**ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ :**

| ਫਸਲ | ਨਦੀਨ ਦਾ ਆਮ ਨਾਂ | ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਰ ਸ.ਤ. (ਗ੍ਰਾਮ) | ਸੰਰਚਨਾ (ਮਿ.ਲੀ.) | ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਲੀਟਰ) | ਅੰਤਿਮ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਵਿਚ ਅੰਤਰਾਲ (ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ) |
|---|---|---|---|---|---|
| ਮੂੰਗਫਲੀ | ਡੈਕਟਿਲੋਸੇਟੇਨਿਅਮ ਐਗਪਟਿਆਮ (ਮਕੜਾ), ਡੀਜੀਟੇਰਿਆ ਸਪੀਸੀਜ (ਕ੍ਰੈਬ ਘਾਸ), ਇਕਾਇਨੋਕਲੋਆ ਪੁਸਾਊਂਮਾਂ (ਸਾਵਾਂ), ਸਾਈਪਰਸ ਰੋਟਨਡਸ (ਮੋਥਾ), ਕੋਮੇਲਿਨਾ ਬੈਂਗਾਲੇਂਸਿਸ (ਕਨਕਵਾ), ਡਾਇਚੇਰਾ ਆਰਵੇਂਸਿਸ (ਲਹਸੂਵਾ), | ੩੨.੮੧+ ੬੫.੬੨੫ | ੪੩੭.੫ | ੩੭੫-੫੦੦ | ੯੦ |
| ਸੋਯਾਬੀਨ | ਡੀਨੇਬ੍ਰਾ ਅਰੇਬਿਕਾ (ਵਾਇਪਰ ਗਵਤ), ਡੀਜਿਟੇਰੀਆ ਸਾਂਗਿਨਾਲਿਸ (ਕੇਬਗ੍ਰਾਸ), ਡੇਕਟਿਲੋਕਟੇਨਿਯਮ ਇਜਿਪਟਿਆਮ (ਕ੍ਰੋਫੂਟ ਗਵਤ), ਡਿਜੇਰਾ ਆਰਵੇਂਸਿਸ (ਝੋਟੇ ਰਾਜਗਿਰਾ), ਸਾਯਨੋਡੌਨ ਡੱਕਟਿਲੋਨ (ਬਰਮੂਡਾ ਗਵਤ), ਕੋਮੇਲਿਨਾ ਬੇਂਗਾਲੇਂਸਿਸ (ਉਸ਼ਣਕਟਿਬੰਧੀਯ ਸਪਾਇਡਰਵੋਰਟ). | ੩੨.੮੧+ ੬੫.੬੨੫ | ੪੩੭.੫ | ੫੦੦ | ੭੫ |

**ਉਪਯ

# گودریج پروناونس®

## کیرجالرفوپ ایتھرائل 7.5%+ 15%وزن/وزن ای سی ایماجھیتھاپار

## (کھرپتوار ناشک)

کیرجالوفوپ ایتھرائل 7.5%+ ایماجھیتھاپار 15% وزن/وزن ای سی ایک کھرپتوار ناشک ٹھوڑا ہے جس کا استعمال مونگ پھلی میں گھاس کرپ، بیز کرپ اور چوڑی پتی والے کھرپتواروں کے کنٹرول کیلئے کیا جاتا ہے۔

**استعمال :**

| فصل | کھرپتواروں کا نام و سائنسی نام | پانی کی مقدار (لیٹر) | فی ہیکٹیئر مقدار: ہیکٹر (گرام) | س تھو (گرام) | آخری چھڑکاؤ فصل کاٹنے کے دن (دن) |
|---|---|---|---|---|---|
| مونگ پھلی | ڈیگی لوکٹم ایکوئنم (گراس)، ڈیجیریا ایسی نیز (کرب گھاس)، ایچائنوکلوا کولونا (سوا گراس)، سیٹیریا ورٹیسلاٹا (کرب گھاس)، سیٹیریا ٹوکیٹا (موتھی)/کوپیلا، پینکٹوسس (انگلی)، **ٹائیجیرا** آرٹیسس (اسوا)، ڈائجیرا ایرکا (ایپرگرس)، ڈائیکٹو لیا سیکنڈ گاس (کرب گھاس)، ڈیگی لوکٹم ایکوئنم (گراس)، ڈائجیرا آرٹیسس (انچی)، سائنوڈان ڈیکٹان (دوب گھاس) کوپیلا پینکٹوسس (انگلی) | 90 | 375-500 | 437.5 | 32.81+ 65.625 |
| سویابین | ڈائجیرا ایرکا (ایپرگرس)، ڈائیکٹو لیا سیکنڈ گاس (کرب گھاس)، ڈیگی لوکٹم ایکوئنم (گراس)، ڈائجیرا آرٹیسس (انچی)، سائنوڈان ڈیکٹان (دوب گھاس) | 75 | 500 | 437.5 | 32.81+ 65.625 |

**استعمال کیلئے ہدایت** : 1. کیرجالوفوپ ایتھرائل 7.5%+ ایماجھیتھاپار 15% وزن/وزن ای سی کا استعمال مونگ پھلی اور سویابین میں کھرپتواروں کے 2-4 پتی کی کیٹیٹ کے وقت (پانی کے 10-20 دن کے بعد) کم سے کم ایک بار کرنا چاہئے۔ 2. پتی کیلئے 1 فی لیٹر پانی کی شرح سے استعمال کریں۔

**استعمال کیلئے بہتر تکنیک:**

**مخلوط کیلئے ہدایت:** کیرجالوفوپ ایتھرائل 7.5%+ ایماجھیتھاپار 15% وزن/وزن ای سی کی مناسب مقدار کو اچھی طرح سے کیچ کے وقت کے مطابق ضروری پانی میں ملائیں۔ اس میں 1 ملی لیٹر فی لیٹر پانی کی شرح سے سرفیکٹنٹ کا استعمال کریں اور اچھی طرح ہلائیں۔

موسمی کیٹیٹ: کھٹے کھرپتوار کے وقت استعمال کریں۔ تیز دھوپ کے حالات میں استعمال نہ کریں۔

دوہرا استعمال کا وقت: 24 گھنٹے۔

فصل کاٹنے سے قبل فرق: مونگ پھلی 90 دن، سویابین 75 دن (بیساختہ بڑھوار یا بھیگنے میں دیا گیا ہے)

استعمال کا وقت: خاص طور سے پتی کے مرحلے کے وقت

مسلسل اور زیادہ سے زیادہ استعمال کی تعداد: ایک

مقصد: زرعی نباتات

استعمال کیلئے آلات: نیپ سیک اسپریئر

نوزل فلیٹ فین نوزل بہتر

**استعمال کنندہ کیلئے احتیاط:**

1. تفاوتی اموات تفاوتی اموات کے بڑھنے کے چاروں میں دو رکھیں۔ 2. منہ، چہرہ اور آنکھوں کے رابطے سے بچائیں۔ 3. چھڑکاؤ کرتے گھر کے گھر کے دائرے کا دائرہ لگانے سے بچائیں۔ ہوا کی حالت میں ہی چھڑکاؤ کریں۔ 4. چھڑکاؤ کے بعد آلودہ لباس اور پانی کے تھیلوں کو الگ رکھیں۔ 5. چھڑکاؤ کے وقت سگریٹ نوشی، کھانا، پینا وغیرہ سے بچائیں۔ 6. چھڑکاؤ کرتے وقت ٹھنڈی ہوا کے خلاف کام کریں۔

**علامت زہر** : زہریلی کوئی مخصوص علامت نہیں ملتی ہے تھوڑے سے درد، چکر آنا، چکر، بھوک اور متلی کا احساس ہو سکتی ہے۔

**ابتدائی علاج** : 1. آنکھ: پرآنکھ اور دوسرے حصوں کو پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔ 2. جلد: 15 منٹ تک پانی سے دھوئیں۔ 3. منہ: منہ کو پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔ 4. نگلنے کی صورت میں: 2 گلاس پانی دیں۔ 5. الٹی: الٹی کرانے کی کوشش نہ کریں۔ ڈاکٹر کو طلب کریں۔ ڈاکٹر کی صلاح کے مطابق ضروری علاج کریں اور بے ہوش کی حالت میں منہ کو کچھ نہ دیں۔ ڈاکٹر کی صلاح لیں۔

**دفاعی زہر** : کوئی مخصوص زہر تریاق نہیں ہے۔ علامات کے مطابق علاج کریں۔

**احتیاطی وضاحت:** 1. یہ دستخوں کیلئے نقصان دہ ہے۔ اسلئے جب دستخوں متحرک ہوں اس وقت اس کا استعمال نہ کریں۔ آبی حیاتیاتی کیلئے زہریلا ہے اسلئے آبی ذخیرہ، آبی فصل کے پاس استعمال نہیں کرنا چاہئے۔ 2. کیمیکل فائدہ میں درج کئے گئے فضلوں کے علاوہ دیگر فضلوں پر استعمال نہ کریں۔ 3. استعمال کے بعد کھالی ڈبوں کو فائدہ میں نہ لائیں۔ ان کو کچرے کے ڈبے جات کے مطابق ہٹا کر رکھیں۔

**خالی ڈبوں کا نپٹارہ :**

1. یہ کیرجالرناشک کیمیکل پیسٹیسائڈ کو استعمال کرنے کے بعد دوبارہ استعمال نہ کریں اور مسائل کے ڈبوں کو تلف کرنے کے طریقے کے مطابق ہی نپٹائیں۔ 2. استعمال کے بعد خالی ڈبوں کو تلف نہ کریں اور ان کو دوبارہ استعمال نہ کریں۔ 3. خالی ڈبوں کا دوبارہ استعمال خطرناک ہے۔ استعمال کے بعد ڈبوں کو کوڑا کرکٹ کے کھلے میں نہ پھینکیں۔ ان