ಪೈರಿಪ್ರಾಕ್ಸಿಫೆನ್ 10% + ಬೈಫೆಂಥ್ರಿನ್ 10% ಇ.ಸಿ.

(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಪೈರಿಪ್ರಾಕ್ಸಿಫೆನ್10% + ಬೈಫೆಂಥ್ರಿನ್ 10% ಇಸಿ ಎನ್ನುವುದು. ಕೀಟ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮತ್ತು ಪೈರೆಥ್ರಾಯಿಡ್ ನ ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂಯೋಜಿತ ಉತ್ಪನ್ನವು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬೆಳವಣಿ ಕೀಟದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಂತಗಳಾದಂತೆ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿನ ಪೈರಿಪ್ರಾಕ್ಸಿಫೆನ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ವಯಸ್ಕ ಕೀಟಗಳ ಸಜೀವಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೈಫೆಂಥ್ರಿನ್ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ, ವಯಸ್ಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಯುವುದಲ್ಲದೇ, ಕೀಟದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇದು ನಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: 1. ರೆಬಲಿಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಿತಜ್ಞರಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಾರದು. 2. ಫಲಿಲು ಕೊಯ್ತು ಬಳಿಕದ ಸಿಂಪರಣೆ ಕಡಾಪಿಲ್ಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. 3. ಮೀನುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೀನು ಸಾಕಣೆ ಮತ್ತು ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಸರೋವರಗಳು, ನದಿಗಳು, ಕೊಳಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಔಷಧಿಯಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಳಿಸಬಾರದು.

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆ	ಕೀಟಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಹೋಲಿಸಲ್/ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾಂ)	ಸುತ್ತಿಸುವಿಕೆ (ಮಿ.ಲೀ.)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ (ಲೀಟರ್)	ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
ಹತ್ತಿ	ಬಿಳಿ ನೊಣ	60+60	600	500	19

ಬಳಕೆಗಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು:

ಸಿಂಪರಣೆಯ ವಿಧಾನ: ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿವೇದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೀಟಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಂ-ಸಮಾನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಳಿಸುವಾದಿದೆ. ಸಿಂಪರಣೆಗಾಗಿ ಹೋಲೋ ಕೋನ್ ನೋಜಲ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸರಳವಾದ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದಾಗಿದೆ. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು: ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ಡೋಸಸ್ಸು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿಗದಿತ ¼ ಪಟ್ಟು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಜೇಲ್ ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಸ್ಪ್ರೇ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿರುವ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಬೇಕು ಜಾಗೂ ನೀರು ಬೆರೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಆವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲುಕಿಸುತ್ತಾ ಮಿಶ್ರಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಿಂಪರಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕು.

ಸಿಂಪರಣೆಯ ಸಮಯ: ಕೀಟಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ (ETL) ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಜಾಗೂ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಬೇಕು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ, ಶಾಂತ ಹವಾಮಾನವಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾದಾಗ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವಾದಾಗ.

ಸಿಂಪರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆವಲಂಬಿಸಿ 15 ದಿನಗಳ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಿಂಪರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಚೀನು ಹುಳಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಚೀನು ಹುಳಗಳು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಂಪರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಕ್ಕದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತ, ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಉಷ್ಣತೆ, ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇಡಲಾದವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾಲ್ಲದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದಾಗಿ ಗಾಯಯೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಮರು-ಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ: 12 ಗಂಟೆಗಳ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಪ್ರವೇಶ (REI) ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಶ್ಯಾಕಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೆಲಸಗಾರರು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಿಡಬಾರದು.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಂಪರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲೇಬೇಕು. ಮಿಶ್ರಣ ಉಸಿರೊಳಗಿಗೆ ದೇಹ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಲುವಾಗಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಂಡರೆಗೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಬಿಗಿ ಬಳಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಬಸ್ಸನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ.

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ದೇಹದ ಒಳಗೆಯರಿದ, ಉಸಿರುಗೊಂಡಿಗೆ ಬೆರೆತರೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗಿರೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗಾಗಿರೆ ತಗುಲಿದರೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು, ತಲೆಸುತ್ತು, ನಿಸ್ತ್ರಾಣ, ಹೊಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಿಸಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬಿ ಮೊದಲಾದವು ಸೇರಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಸುರಿಯುವುದು, ನಡುಕ, ಮೂರ್ಛೆ ಮೊದಲಾದವು ಸೇರಿದೆ. ಉಷ್ಣತೆಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಮಾ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲಿ, ದದ್ದುಗಳು, ಸ್ನಾಯುಸೆಳೆತ, ಉರಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವ ಸಂವೇದನೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಚರ್ಮಾ ಸಂವೇದನೆಗಳು ಬಿಡದೇ ಇರಿದ್ದು, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 12 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗಾಗಿ ಶಾಮಾಗುವೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಸೋಮವಾಂತಿ, ಬೇಸರ, ಹೊಟ್ಟೆ ನುಲಿಯುವುದು ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕ: ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೋಣದರೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಚರ್ಮಾ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಿರಿಕಿರಿ, ನೋವು ಕೆಂಪು ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ: 15 ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸುತ್ತಾ ತಕ್ಷಣವೇ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ತುರಿಕೆ, ಉರಿ ಮತ್ತು ನೋವಿನ ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಉಸಿರಾಟದಿಂದಾಗಿ ಸೇವನೆ: ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ತನ್ನಿರಿ ಹಾಗೂ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮತ್ತು ಸುಮ್ಮನಿರುವಂತೆ ಇರಿಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದಲಾದರೆ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಡಲು ತಕ್ಷಣವಾದಲ್ಲಿ, ಶಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರಿದಲ್ಲಿ: ವಾಕ್ಕರ್ ಯಾಕಂದಾಗಿ ತಿಳಿದ ಹೊರತು ವಾಂತಿಯಾಗದಂತೆ ಪ್ರೇರಿಸಬೇಡಿರಿ. ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ತಿನ್ನಲು ಅಥವಾ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡಬೇಡಿರಿ. ವಾಯಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರೋಗಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, 1-2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ.

ಪ್ರತಿವಿಷ: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷದ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ.

ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ: 1. ನೀರಿನ ಸಲೆ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣ ದೂಷಣೆಗೊಳ್ಪದಂತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು, ಮಿಶ್ರಣದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ಟೋರ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊಳಿದ ಕಲ್ಲುಹಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು. 2. ಬರಿದಾದ ಪ್ಯಾಕೇಜಗಳ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅವನ್ನು ಹೊಗಳಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಚ್ಚಾದಾದು. 3. ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕತಿರುವುದು ಹೊಡೆ ಬಿಡಬೇಕು. 4. ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ/ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದಿದೆ ಸರೋವರಗಳು, ನದಿ, ಕೊಳಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಳಿಸಬೇಡಿ. 5. ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಕೀಟನಾಶಕ: 1. ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ಯಾಕೇಜಗಳನ್ನು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು ರಿಸುವ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹುವ ಕೊಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೊಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಬೇಕು. ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಗಳಿಗನುಸಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬೀಗಹಾಕಿ ಭದ್ರವಾಗಿಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರದಲ್ಲಿರಿಸಿರಿ. 2. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿದಂತ ಕೊಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆಲ್ಪ ಶುದ್ಧ ಹವೆಯಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಳಲು ಬರುವಂತಿರ ಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಪೈರಿಪ್ರಾಕ್ಸಿಫೆನ್ ಎ.ಐ.	10.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಬೈಫೆಂಥ್ರಿನ್ ಎ.ಐ.	10.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯರ್ (ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬೆನ್ಜೀನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಲವಣ ಮತ್ತು ಸೊರಲೆ ಫೀನಾಲ್ ನ ಪಾಲಿಆಕ್ಸೈಥೈಲೀನ್ ಈಥರ್ ನ ಪಾಲಿಕ್ಷಾರ ಈಥರ್ ನ ಮಿಶ್ರಣ)	10.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಸುಗಂಧಿತ ದ್ರಾವಕ C-IX	QS %
ಒಟ್ಟು:	**100.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ**

ಪೈರಿಪ್ರಾಕ್ಸಿಫೆನ್ 10 ಶಾತಂ + ಬೈಫೆಂಥ್ರಿನ್ 10 ಶಾತಂ ಈ.ಸಿ.

(ಕೀಟಕನಾಶಿನಿ)

ಪೈರಿಪ್ರಾಕ್ಸಿಫೆನ್ 10 ಶಾತಂ + ಬೈಫೆಂಥ್ರಿನ್ 10 ಶಾತಂ ಈಸಿ ಪೈರಿಥ್ರಾಯಿಡ್ ಮರಿಯು ಕೀಟಕ ಬೆಳವಣಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಕದಾದಾಂ. ಈ ಕಲಯಿ ಕತ್ತಿತ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯೆ ಪಂಟಿರಿ ಅಳಿವೆತೆ ತೆಲ್ಲ ದೌಮು ನಿಯಂತ್ರಿಂಚಾಗಿತಿ ಬಪಾಳ ದಕ್ಕಲ ಪ್ರಭಾವಂ ಮೂಪಿಸ್ತುಂದಿ. ಇದಿ ಸೆಡೂಗ ಕಿಟಕಾಲಿ ಚಂದುವಿ ಕೀಟಕಾನ್ನಿ ಮರಿಯು ಪೈರಿಪ್ರಾಕ್ಸಿಫೆನ್ ಯೊಕ್ಕ ಎಡುಗುದಲಿನಿ ನಿಯಂತ್ರಿಂಚಾಗಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಲಾಂವಲ ಸಂಪೂರ್ಣಂಗಾ ಪೆರಿಗಿ ಪೆದ್ದ ಪುರುಗು ಪುನರುತ್ಪತ್ತಿನಿ ಪಾಲಿಂಚ್ಚುಂದಿ. ಬೈಫೆಂಥ್ರಿನಿ ಚೆರ್ಪಡಂ ವಲ್ಲ ಎಡಿಗಿ ತೆಲ್ಲ ದೌಮು ಹತಂ ಚೆಸಿ ತೆಲ್ಲ ದೌಮು ರೆಂಡು ರಕಲಾ ಪ್ರಭಾವಂ ನಿಯಂತ್ರಣನಿ ಇಸ್ತುಂದಿ. ಇದಿ ತೆಗುಲು ತಡುವಡಂ ವಿರ್ವತಕುಂಡ್ರು ಕೂಡಾ ನಿವಾರಿಸ್ತುಂದಿ.

ಹೆಚ್ಚರಿಕೆ: 1. ರೆಬಲಿಲ್ ಮತ್ತು ಮರಿಯು ಕರಪತ್ರಂ ಪಿ ತೆಲ್ಪಿನ ಪಂಟಲು ಮರಿಯು ತೆಗುಲ್ಲು ಪಿ ಮಾತ್ರಮೆ ಉಪಯೋಗಿಂಚಾಲಿ. 2. ಕೊತ್ತ ಕರುವಾಲ ಉಯೋಗಿಂಚರಾದು. 3. ಚೆಪಲು ಎಂತೌ ಹಾನಿಕರಂ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಜಲಚರಾಲು ಕೂಡಾ ಹಾನಿಕರಂ. ಕಾಬಟ್ಟಿ ಚೆವಲ ಪಿಂಪಲಿಂ ಜರಿಗೆ ಬೌಲ ಉಪಯೋಗಿಂಚರಾದು. ಕಾಲುವಲು, ಸರುಲು, ಚೆರುವುಲು, ಸರಸ್ಸುಲ್ಲು ಕಲುಷಿತ ಚೆಯರಾದು.

ಶಿಫಾರಸು:

ಪಂಟ	ಕೀಟಂ ಪೆರಾಲ ಪೆರಾದ ಪೆರು	ಮೌತಾದು/ಹೈಕ್ಟಾರುಕಿ ಏ.ಐ (ಗ್ರಾ.)	ಮೌಶಿಕರಂ (ಮಿ.ಲಿ.)	ನೀಟಲಿ ಮಿಶ್ರಮಂ (ಲಿ.)	ಪೆರಿ ಎಂಡೆ ಸಮಯಂ (ರೌಜುಲು)
ಪತ್ತಿ	ತೆಲ್ಲದೌಮು	60+60	600	500	19

ಉಪಯೋಗಿಂಚವಲಿಸಿ ಮಾರ್ಗಲು:

ಉಪಯೋಗಿಂಚೆ ವಿಧಾನಂ: ದೀನ್ನಿ ನ್ಯಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಗಾ ಉಪಯೋಗಿಂಚಾಲಿ. ಪ್ರತ್ಯೇಕಮೈನ ಮಣ್ಣಿ ಪರಿಸ್ಥಿತುಲು ಸೂಚಿಂಚಬಡಲೇದು. ಕೀಟಾಲ ತೀವ್ರತನಿ ಪ್ರಭಾವಂತಂಗಾ ನಿಯಂತ್ರಿಂಚಡಾನಿಕಿ ಸಮಾನಂಗಾ ಕವರ್ ಚೆಯಡಂ ಅವಸರಂ. ಬೌಲ ಕೌನ್ ನಾಲಲ್ ರಕಂ ಆಮಿಸ್ತುನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ನ್ಯಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೆಯರ್‌ನಿ ಏಪಿಕಾಗಿ ಕೌನ್ ಅಮಿಸ್ತುನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ನ್ಯಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೆಯರ್‌ನಿ ಏಪಿಕಾಗಿ ಸಾಧಾರಣಂಗಾ ಪಿಂಪಡಂ ಮರಿಯು ಸಮಾನಂಗಾ ಕವರ್ ಚೆಯಡಂ ಅವಸರಂ. ವಾಡಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟಲು ತಿರಿಗಿ ವಾಡುಕು ನೀರಾಂದುಕು ಕಲಿಪಿ ಬಾಯಿ ಬಂದುಕು ವಿಡಿಗಾ ಪೆಟ್ಟಾಲಿ. ತಿರಿಗಿ ಪಿಂಪಡಂ ಮರಿಯು ಪ್ಯಾಕೆಟಲು ಕಲಿಪಿ ನೀರಾಂದುಕು ಮರಿಯು