

Rashinban Fluxametamide 3.8 w/w + Pyridaben 9.5 % w/w SC Contact Insecticide			
Fluxametamide 3.8% w/w + Pyridaben 9.5 % w/w SC is a combination insecticide. It is used for the control of insects and mites on brinjal, chilli, okra and tomato crops.			
Chemical Composition:			
Component Name: Fluxametamide a.i. Pyridaben a.i.		% w/w	3.80 9.50
Block copolymer of polyoxyethylene – polyoxypropylene glycol			0.40
Sodium Ligninsulphonate			2.00
1,2 - Propanediol			10.00
Emulsion of organopolysiloxane			0.05
Xanthium Gum			0.20
1, 2 - Benziothiazoline - 3 - one			0.10
Magnesium aluminum silicate			0.45
Water			Q.S.
Total			100.0
Application and dosage recommendations:			

Crop	Common name of the pest	Dosage per Hectare			Waiting period (Days)
		a.i. (gm)	Formula-tion (ml)	Dilution in water (Ltr)	
Brinjal	Leaf hopper - Amrasca biguttula biguttula Thrips - Thrips palmi Fruit & shoot Borer Leucinodes orbonalis Red spider mite - Tetranychus urticae Whitefly – Bemisia tabaci	38+ 95	1000	500	5
Chilli	Thrips- Scirtothrips dorsalis Fruit borer- Heliocoverpa armigera Tobacco caterpillar- Spodoptera litura. Yellow mite - Polyphagotarsonemus litus	38+ 95	1000	500	5
Okra	Leaf hopper – Amrasca biguttula biguttula Thrips - Scirtothrips dorsalis Fruit Borer - Heliocoverpa armigera Red Spider Mite – Tetranychus urticae.	38+ 95	1000	500	5
Tomato	Thrips - Thrips tabaci Fruit borer - Heliocoverpa armigera Leaf eating caterpillar - Spodoptera litura. Red Spider Mite – Tetranychus urticae.	38+ 95	1000	500	5

Direction for use: Measure out the required quantity of Fluxametamide 3.8% w/w + Pyridaben 9.5 % w/w SC and mix well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as per the spray volume required with thorough agitation.

Time of Application: Apply Fluxametamide 3.8% w/w + Pyridaben 9.5 % w/w SC when pest reaches economic threshold level.

Application Techniques: Should be applied as foliar spray.

Spray Equipment: Use high volume spraying equipment, such as knapsack sprayer, Taiwan sprayer and foot sprayer etc. ensuring thorough and uniform coverage.

Purpose: For Agricultural use only.

Dosages: Refer to the recommendation table.

Instruction for Mixing: Measure out requisite quantity of the insecticide and mix it well with small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crop with suitable sprayer.

Application Timing: No restriction. Avoid application under high wind, before rain.

Crop Stage: Insecticide should be sprayed at any stage of crop growth when pest reaches economic threshold level.

Frequency including Maximum Number of Sprays: Refer to the above recommendation 3 - 4 sprays are required at the interval of 7-14 days depending upon the pest infestation.

Stage during which Pesticide should not be applied for on any crop: Refer to the above recommendation only.

Phytotoxicity: Non-phytotoxic when used as recommended dosage.

Re-entry Period: 24 hours after spray.

Pre-harvest Index(PHI):Refer to the above recommendations only.

Weather Condition: Weather should be clear, calm, no rains and no strong winds. Avoid applications hot weather and moisture stress conditions.

Soil & Water: No specific soil conditions are prescribed. Clean water to be used for spray.

Spraying Instruction: Spray uniformly in the direction of wind. Ensure thorough coverage of the weeds.

Disposal of Empty Containers: 1. The packages shall be broken and buried away from habitation. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re- use. 3. It shall be the duty of manufacturer/ formulators and operators to dispose packages or surplus materials & washings from the machine and container shall be disposed-off in a safe manner so as to prevent environment and water pollution.

Storage: Condition: 1. The packages containing the insecticide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles, away from the reach of children and livestock, animal feed or shall be kept in a separate almrah under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well- lit, and ventilated and of sufficient dimensions so as to avoid contamination with vapors.

Symptoms of Poisoning: No symptoms have been identified in humans to date.

Safety Precautions: 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes, and skin. 3. Avoid inhaling the insecticide spray mist. 4. Wear full protective clothing, while handling. 5. Wash thoroughly the contaminated clothes and body parts after handling. 6. Do not eat, drink or smoke while applying.

First Aid: 1. **Inhalation:** Remove casualty for fresh air and keep at rest. 2. **Skin Contact:** clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. If skin irritation occurs: Get medical advice. 3. **Eye Contact:** In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical attention. If eye irritation persist: Get medical advice. 4. **Ingestion:** Rinse mouth. Give 1 or 2 glasses of water if patient is alert and conscious seek medical advice immediately and show this container or label.

Antidote: Treat based on judgment by physician in response to symptoms of patient. No specific antidote is known, treat symptomatically.

Cautionary Statement: Not to be used on crops other than mentioned on this label/leaflets. Not to be used for post-harvest applications. Hazards to humans and domestic animals. Destroy the container after use as directed on leaflet. This product is very toxic to aquatic organisms thus its use in around water bodies should be avoided.

Dangerous to reuse empty containers

राशिनबान फ्लूक्सामेटामाईड ३.८% भा./ भा. + पायरिडाबेन ९.५ % भा./ भा. एस.सी. (स्पर्शीय कीटनाशक)			
फ्लूक्सामेटामाईड ३.८% भा./ भा. + पायरिडाबेन ९.५ % भा./ भा. एस.सी. एक कीटनाशी मिश्रण है। इसका उपयोग बैंगन, मिर्च, मिंडी और टमाटर में लम्ने वाले कीटों व कुट्टकी की रोकथाम के लिए होता है।			
रासायनिक संरचना :			
घटक का नाम	% भा/ भा		
फ्लूक्सामेटामाईड स.त.	३.८०		
पायरिडाबेन स.त.	९.५०		
पॉलीऑक्सीइथिलीन के ब्लॉक कॉपीलेरिन – पॉलीऑक्सीप्रोपोलीन स्लाइवॉल	०.४०		
सोडियम लिग्निसल्फोनेट	२.००		
१,२ – प्रोपेनडिओल	१०.००		
ऑर्गेनोबॉसिलिलोक्सेन का इमल्शन	०.०५		
जैनेथम गम	०.२०		
१,२ – बेन्जोसोथियाजोलिन – ३ – एक	०.१०		
मॅग्नीशियम एल्यूमीनियम सिलिकेट	०.४५		
पानी	प्रयोग मात्रा		
कुल	१००.००		
प्रयोग के लिए सिफारिशें:			

फसल	कीट का नाम	मात्रा प्रति हेक्टर			आंशरी छिड़काव तथा कब काटे के बीच अन्तराल (दिन में)
		स.त. (मि.ली.)	संरचना (मि.ली.)	पानी की मात्रा (ली.)	
बैंगन	तेला-अमरकाना बिटुला बिटुला बुन्दा-थिप्स पलनी तना व फल छेकड़ इन्ही-ल्यूगिनिडिस ओरबेनसिल लाल मकड़ी कुट्टकी-टेटुनिकस अर्टिकी	३८+ ९५	१०००	५००	५
मिर्च	बुन्दा-स्क्रिटीफ्रीस होरेसिलिस फल छेकड़-हैलिकोवर्पा अर्मिजेरा पत्ता भक्क इन्ही- स्पोडोटेन्टा लिटुरा लाल मकड़ी कुट्टकी-टेटुनिकस अर्टिकी	३८+ ९५	१०००	५००	५
भिण्डी	तेला-अमरकाना बिटुल बिटुल बुन्दा-थिप्स टेकेकी फल छेकड़-हैलिकोवर्पा अर्मिजेरा लाल मकड़ी कुट्टकी-टेटुनिकस अर्टिकी	३८+ ९५	१०००	५००	५
टमाटर	बुन्दा-थिप्स टेकेकी फल छेकड़-हैलिकोवर्पा अर्मिजेरा पत्ता भक्क इन्ही- स्पोडोटेन्टा लिटुरा लाल मकड़ी कुट्टकी-टेटुनिकस अर्टिकी	३८+ ९५	१०००	५००	५

उपयोग के लिए निर्देश: छिड़काव की घोल की आवश्यक मात्रा लीएँए, ओर उसे थोड़े पानी के साथ अच्छी तरह मिलाईए। फिर छिड़काव घोल की अवश्याक मात्रा के अनुसार बाकी पानी की मात्रा को अच्छी तरह हिलाकर घोल बनाईए।

प्रयोजन: कृषि उपयोग के लिए।

आवेदन का समय: कीट की संख्या आर्थिक हानि स्तर के ऊपर जाने पर फ्लूक्सामेटामाईड ३.८% भा./ भा. + पायरिडाबेन ९.५ % भा./ भा. एस.सी. का प्रयोग करें।

छिड़काव यंत्र: हाईवाल्यूम स्प्रेयर जैसे नैपैस्के स्प्रेयर, ताइवान स्प्रेयर और फुट स्प्रेयर आदि के प्रयोग करें जिससे पूर्णतया एवं एक समान छिड़काव सुनिश्चित हो।

आवेदन तकनीक: छिड़काव ही करना चाहिए।

खुशग: अनुशंसा तालिका देखें।

मिश्रण संबंधी निर्देश: निश्चित मात्र में ली हुई कीटनाशक को पहले थोड़े पानी में डाल कर घोल लें तत्पश्चात आवश्यक पानी डालकर पूरा घोल बना लें व अच्छी तरह हिला लें।

छिड़काव संबंधी निर्देश: छिड़काव करते समय ध्यान रखें की हवा का रुख सामने से अपनी तरफ नहीं हो।

उपयोग का समय निर्धारण: निर्धारित नहीं है। तेज हवा व बारिश होने की संभावना हो तो छिड़काव नहीं करना चाहिए।

छिड़काव की अवस्था: फसल वृद्धि के किसी भी स्तर पर जब कीट की संख्या आर्थिक हानी स्तर के ऊपर जाने कीटनाशक का पणीय छिड़काव करें।

प्रस्थिति जिसके दौरान कीटनाशक किसी फसल पर अनुपयुक्त नहीं हैंगे: ऊपर दिए गए परामर्श का पालन करें।

आवृत्ति जिसके अंतर्गत छिड़काव की अधिकतम संख्या: उपरोक्त अनुशंसा का संदर्भ से ३ से ४ बार आवेदन व से १४ दिनों के अन्दर कीटों की संख्या आधर पर करें।

मौसम की स्थिति: कीटनाशक का छिड़काव के समय मौसम साफ, शांत हो तथा बारिश व तेज हवा ना हो।

मृदा व जल: मिट्टी की कोई विशिष्ट स्थिति निर्धारित नहीं है। छिड़कव के लिए साफ पानी का उपयोग किया जाना चाहिए।

पादप विषता: फ्लूक्सामेटामाईड ३.८% भा./ भा. + पायरिडाबेन ९.५ % भा./ भा. एस.सी.को सुझाव के अनुसार प्रयोग करने से फसल को कोई हानी नहीं पहुँची है।

खाली डिब्बो का निपटारा: १. खाली डिब्बो को उपयोग के बाद तोड़ कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ दें. २. उपयोग के बाद खाली डिब्बो को दुबारा उपयोग में न लाए अतः बाह्य खुला ना छोड़ें। ३. यह कीटनाशक निर्माता, विपणनकर्ता व उपयोग करने वाले सभी महानुभाओ को कर्तव्य है वे उपयोग किए हुए डिब्बों का या बड़े हुए कीटनाशक तथा साधनों के धौवन का निपटारा सुविष्ठित ढंग से करें जिससे वातावरण या पानी प्रदूषित न हो।

उत्पन्न/कीटनाशक के डिब्बों का भंडारण खाद्य पदार्थों, आहार, पेय, बीज भंडारण हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले कमरों या परिसरों से अलग कमरों या परिसर में किया जाना चाहिए अथवा कीटनाशकों की मात्रा एवं प्रकृति के अनुसार इन्हे अलग अलगगारियों में ताला बंद करके रखना चाहिए। कीटनाशकों के भंडारण के कमरे या परिसर अच्छी तरह बने हुए, सूखे, अच्छी रोशनी व हवा वाले तथा पर्याप्त बड़े आकार के होने चाहिए ताकि कीटनाशक की भाप से प्रदूषण न हो।

विष के लक्षण: आज तक मनुष्यों में कोई लक्षण नहीं पहचाना गया है।

सुरक्षा सावधानियां: १. खाद्यसमग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तनों और पशुओं के बारे से दूर रहें। २. मुँह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचाये। ३. छिड़काव की वाष्प को साँस द्वारा अंतर जाने से बचाये। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के ओगे को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

प्राथमिक उपचार:
अ) सूँचे जाने पर : मरीज को ताजी हवा में ले जाये व आराम कराओ।
ब) त्वचा के सम्पर्क में आने पर : यदि कपड़े एवं त्वचा हो जाये तो दूषित कपड़ों को अलग करें एवं दूषित त्वचा को साबुन एवं पानी की भरपूर मात्रा से धोयें। यदि त्वचा में जलन हो तो चिकित्सकी की सलाह लें।
स) आँखों के सम्पर्क में आने पर : काफी मात्रा में पानी से धोयें। यदि दर्द, जलन आदि लंबे समय तक रहे तो चिकित्सकी की सलाह लें।
द) निगले जाने पर : पानी से मुँह कुल्ला कराये। यदि व्यभिक्त सप्पा एवं सतर्क हो तो १ या २ गिलास पानी पीने के लिये दें। चिकित्सक को बुलायें और कीट नाशक का डिब्बा या लेबल को दिखायें।

विषनाशक: चिकित्सक रोगी के लक्षणों के आधार पर उपचार का निर्णय लें। कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है।

सावधानी कथन: कीटनाशक का प्रयोग केवल इस पत्रिका में निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर न करें।
फसल-कटाई के उपरांत अनुप्रयोग हेतु उपयोगी नहीं। मनुष्य और घरेलू पशुओं के लिए खतरनाक है।
पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात आदयान को नष्ट करें। यह उत्पाद जलीय जीवों के लिए बहुत विषैला है और इसलिये जल निकायों के आसपास इसके का उपयोग से बचना चाहिए।
खाली डिब्बों का दुबारा प्रयोग करना खतरनाक है।

राशीनबन फ्लूक्सामेटामाईड ३.८% व/व + पायरिडाबेन ९.५ % व/व एससी स्पर्शिय कीटकनाशक			
फ्लुक्सामेटामाइड ३.८% व/व + पायरिडाबेन ९.५ % व/व एससी है एकवित कीटनाशक आहे. वांगी,मिरची, मेंडी आणि टोमॅटो या पिकांवरील कीटक आणि कोळ्यांच्या नियंत्रणासाठी याचा वापर केला जातो.			
रासायनिक संरचना:			
घटकाचे नाव:	% व/व		
फ्लुक्सामेटामाइड स.त.	३.८०		
पायरिडाबेन स.त	९.५०		
पॉलीऑक्सीथिलीनचे ब्लॉक कोपोलिमर –पॉलीऑक्सीप्रोपीलीन स्लायकोर	०.४०		
सोडियम लिग्लिनसल्फोनेट	२.००		
१,२ – प्रोपेनडिओल	१०.००		
ऑर्गॅनोपोलिसिलॉक्सेनचे इमल्शन	०.०५		
इथॅनथियम गम	०.२०		
१,२ – बेन्ड्रोसोथियाझोलिन –३ –वन	०.१०		
मॅग्नेशियम अॅल्युमिनियम सिलिकेट	०.४५		
पाणी	व्हाू एस्स.		
एकूण	१००.०		
फवारणी आणि प्रमाण साठी शिफारस:			

पीक	कीटकाचे सामान्य नाव	प्रमाण प्रति हेक्टर			वाट– पाहण्याचा कालावधी (दिवस)
		सक्रिय घटक (ग्रॅ.)	संरचना (मिली)	पाण्याचे प्रमाण (लिटर)	
वांगी	पानवरील तुडुडे-अमरकाना बिटुल, तुलबिडे- थिप्स पलनी, फळ आणि फेड वेळारणी अर्जी- ल्यूगिनिडिस अॅरबॅमेसिस लाल कोळी-टेटुनिसस टुट्टिका यवई मही-बॅमिसा टॅवॅसे	३८+९५	१०००	५००	५
मिरची	तुलबिडे-स्क्रिटोथ्रिप्स होरेसिलिस, फळ वेळारणी-हॅलिकोवर्पा अर्मिजेरा वेळारू, सुसुट-स्पोडोटेन्टा लिटुरा फिका कोळी- पॉर्निगॅटोन्टार सेमॅनेस लॅटस	३८+९५	१०००	५००	५
मेंडी	पानवरील टेक-अमरकाना बिटुल,तुलबिडे-स्क्रिटोथ्रिप्स होरेसिलसक वेळारणी-हॅलिकोवर्पा अर्मिजेरा लाल कोळी-टेटुनिसस टुट्टिका	३८+९५	१०००	५००	५
टोमॅटो	तुलबिडे- थिप्स टमाक्री फळ वेळारणी अर्जी-हॅलिकोवर्पा अर्मिजेरा पाने खाणाव सुसुट- स्पोडोटेन्टा लिटुडुव, लाल कोळी-टेटुनिसस टुट्टिका	३८+९५	१०००	५००	५

वापरासाठी निर्देश: आवश्यक प्रमाणात फ्लूक्सामेटामाइड ३.८% व/व + पायरिडाबेन ९.५ % व/व एससी मोजा आणी थोडे पाणी टाकून व्यवस्थित पाणे मिसळा .स्प्रच्या प्रमाणानुसार उर्वरित पाणी घालून द्रावण बनवा.

फवारणीचा कालावधि: कीटकांची संख्या पिकांचे आर्थिक नुकसान करण्या आधी फ्लूक्सामेटामाइड ३.८% व/व + पायरिडाबेन ९.५ % व/व एससी चा वापर करा.

वापरपायीची पद्धत: पाना द्वारे फवारणीसाठी याचा वापर करा.

फवारणी उपकरण : हाई वॉल्यूम स्प्रेयर जसे नॅसॅफॅक स्प्रेयर, तैवान स्प्रेयर आणि फुट स्प्रेयर ३. या वापर करा ज्यामुळे पुर्णतः आणि एकसमान फवारणी सुनिश्चित होईल.

उद्देश: कृषि वापरसाठी.

प्रमाण: शिफारस सारणी पहा.

मिश्रण बनविण्यासाठी सुचना: कीटकनाशकाची आवश्यक प्रमाणात मात्रा मोजा आणि थोड्याशा पाण्यास चमगले मिसळा. येथे फवारणीसारे पिकांच्या संपूर्ण कव्हेरखेसाटी पूर्णपणे निर्दिष्ट केलेले उर्वरित प्रमाण मिसळा.

वापरपाय्याचा कालावधि: कोणतेही बॅन नही. पावसापूर्वी, जोरदार वाऱ्याची संभावना फवारणी करतल्यास टाळा.

पीकाचा टप्पा: कीटकांची संख्या पिकांचे आर्थिक नुकसान करण्याआधी फ्लूक्सामेटामाइड १०% व/व ईसी चा वापर करा.

जास्तीत जास्त फवारपायीची वायव्यता: वरील शिफारसीनुसार कीटकांचा प्रारुपात्र न लक्षात घेवून ७-१४ दिवसांच्या अंतराने २-४ फवारण्या आवश्यक आहेत.

साठवणी दरम्यान कोणत्याही पीकासाठी कीटकनाशक वापरू नये : केवळ वरील शिफारसीचा संदर्भ घ्या.

रोप विषयवता : शिफारस केलेल्या प्रमाणानुसार वापर केल्यास है कीटकनाशक रोपविकासकारक नाही.

पुनः प्रवेशाचा कालावधि: फवारणीच्या २४ तासांनी.

पूव पीक अनुक्रमणिका(गोएचआर): केवळ वरील शिफारसीचा संदर्भ घ्या.

हवामानची स्थिति: कीटकनाशकाच्या फवारणीच्या वेळी हवामान स्वच्छ, शांत असावे आणि पाऊस व जोरदार वावा असू नये. गरम हवामान आणि दमटपणा ताण स्थितित्या हवामानात फवारणी करू नये.

माती आणि पाणी: मातीची कोणतीही विशिष्ट स्थिति निर्धारित नाही. फवारणीसाठी स्वच्छ

पाण्याचा वापर केला पाहिजे.

पाण्याच्या सुचना: वाऱ्याच्या दिशेने एकसमान फवारणी करा.

वापरलेल्या डब्यांची विल्हेवाट: १. रिकामी पॅकेजिंग मोडून-तोडून क्वरीपासून दूर जाणे-जमीनत खोल पुसत. २. पुन्हा कामासाठी वापरास जाऊ नयेत म्हणून रिकामी पॅकेजिंग उड्डाळवार उडू नयेत. ३. निर्मिता, उत्पादन बनावीच्याचे आणि हाताळण्याचे कर्तव्य आहे की पॅकेजिंग किंवा उरलेले द्राव्य किंवा फवारणी बुतलेले पाणी पायी वीरलेवाट पर्यावरण किंवा पाणी प्रदुषित होणार नाही अशा सुशुचित पद्धतीने लाववी.

साठवण : १. कीटकनाशक असलेली पॅकेजिंग इतर वस्तू पासून वेगळ्या खोलीत, मुलांपासून व जानवरपासून, जनावरांच्या घरपासून दूर वेगळ्या खोलीत कुलूप चावी लावून ठेवले पाहिजे. २. कीटकनाशक साठवणीची खोली मजबूत बांधणीची, कोरडी, भरपूर उजेड असलेली, हवेशिर व पुरेशी लांब रुंद असावी ज्यामुळे वाफेने होणाऱ्या प्रदुषणाने पर्यावरण दुषित होणार नाही.

विषबाधेची लक्षणे: मनुष्यामध्ये आजपर्वत कोणतीही लक्षणे आढळून आलेली नाहीत.

सुरक्षितता खबरदारी: १) अन्नपदार्थ, अन्नवाढाथीचे रिकामी डबे आणि जनावरांच्या वाऱ्यापासून दूर राहा. २) तोंड, डोळे आणि त्वचेशी संपर्क होऊ देऊ नका. ३) फवारणीचे तुरार थरातारचे आत घेऊ नका. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा. ४) फवारणी द्राव्य बनावीच्यास संपूर्ण संरक्षित कपडे वापरायत. ५) फवारणी नंतर दूषित झालेले कपडे आणि शरीराचा भाग स्वच्छ घ्या. ६) फवारणी करताना घुसमान, खावू-पीवू वा चकचक नये.

प्रमोदोपचार :
अ) श्वासाचे आत केल्यास: रुग्णास वेगळ्या हवेत आणा व आराम कर घा.
ब) त्वयेची संपर्क झाल्यास: कपडे आणि त्वचा दुषित झाल्यास, कपडे उरल्या आणि दूषित झालेली त्वचा सावण व भरपूर पाण्याने धुवा.
उर त्वचेस उजळवू होत असले: तर चिकित्सकाचा सल्ला घ्या
क) डोळ्यांची संपर्क झाल्यास: भरपूर पाण्याने धुवा, उर उजळवू दिवू काढा परंत राहिल तर चिकित्सकाचा सल्ला घ्या.
ड) निगले गेल्यास: पाण्यात गुळगुळा करा. उर रुग्ण तत्वाच निरर्थकपणे असेल तर १ वा २ ग्लास पाणी पीयास द्या आणि चिकित्सकाचा सल्ला व कीटकनाशकाचा डबा वा लेबल दाखवा.

विषोपचार : चिकित्सकाने रुग्णाच्या लक्षणाच्या आधारीत उपचाराचा निर्णय घ्याव. कोणताही विशिष्ट विषोपचार माहीत नाही, लक्षानुसार उपचार करा.

सावधानीचे विधान: या लेखवार्थ (विल्हेवाट)त नमूद केल्याशिवाय इतर पिकांवर वापर नये. कोणी कोणत्या फवारणीसाठी वापरला जावू नये.मानव आणि पक्षीव जावणी नंतर, फिल्टर वेली निर्देशानुसार वापरल्या इतर डबे नष्ट करा. हे उत्पादन जलचक्र जीवसांती खुबच विषारी असते आणि जलयी जीवजंतू आणि त्यामुळे त्याचा वापर पाण्याच्या साठवणात आणि आसपास टाळावा.

वापरलेल्या डब्यांचा पुर्नवापर धोकायत्तक.

राशिनबेन इसुक्झानिटासाईड 3.
--

