

Reflex FOMESAFEN 11.1% w/w + FLUAZIFOP-P-BUTYL 11.1% w/w SL (HERBICIDE)

Fomesafen 11.1% w/w + Fluzafop-p-butyl 11.1% w/w SL is a selective post-emergence herbicide, recommended for the control of both grasses and broad leaf weeds in Soybean and Groundnut.

Fomesafen a.i.	11.1% (w/w)
Fluzafop-p-butyl a.i.	11.1% (w/w)
Emulsifier: Copolymer butanol PO/EO	7.11% (w/w)
Condensation product of castor oil and ethylene-oxide	11.1% (w/w)
Antifreeze: Polyethylene glycol	17.78% (w/w)
Preservative: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (as a 20% solution)	0.05% (w/w)
Neutralizing agent: Sodium hydroxide 50% solution	10.0 % (w/w)
Solvent: Water	QS
Total	100.0% w/w
The quantity of sodium hydroxide may vary depending upon neutralization and achieving required pH.	

Application & Recommendation for use: When used as per the recommendations given below, Fomesafen 11.1%w/w + Fluzafop-p-butyl 11.1%w/w SL provides the post-emergence control of grassy & broad leaf weeds in Soybean and Groundnut.

Crop	Scientific name of the weed	Dosage per ha		Time and No. of Appli- cation	Water Volume Dilution in water L/ha	Waiting period from last spray to harvest (in days)
		Al (g)	Formu- lation (ml)			
Soybean	Echinochloa colona, Digitaria spp., Eleusine indica, Dactyloctenium aegyptium, Brachiaria reptans, Commelina benghalensis, Digera arvensis, Trianthema spp., Phyllanthus niruri, Acltypha indica, Dinebra arabica	250	1000	Early post emergence at 2-5 leaf stage of weeds at optimum soil moisture conditions (Single appli- cation)	500	71
Ground- nut	Echinochloa colona, Digitaria spp., Eleusine indica, Dactyloctenium aegyptium, Brachiaria mutica, Eiuropus villosus, Indigofera glandulosa, Chloris barbata, Trianthema spp., Digera arvensis, Cleom viscosa, Phyllanthus niruri, Ammaranthus viridis, Cyperus spp.	250	1000	Early post emergence at 2-5 leaf stage of weeds at optimum soil moisture conditions	500	82

Recommendations for use:

Apply once after sowing as early post emergence at 2 – 5 leaf stage of weeds under optimum soil moisture condition, when weeds are actively growing.

Method of application: Spray the herbicide using a knapsack sprayer fitted with flat fan nozzle. Apply the herbicide in sufficient quantity of water to ensure thorough coverage of the weed foliage.

Resistance management

The repeated use of herbicides with the same mode of action could lead to selection of resistant weed. Therefore, do not continuously use same herbicide (of same mode of action) in next crop season and whenever required, prefer the spray of herbicide with different mode of action in each crop season. Certain agronomic practices may reduce the likelihood that resistant weeds will arise. In fields where resistant weeds are suspected, use integrated resistance management strategies.

1. **HRAC Group code:** Fomesafen(E)and Fluzafop-p-butyl (A)

2. **Chemical class & Mode of Action:** Fomesafen (Diphenylether) inhibits protophorphynogen oxidase and Fluzafop-p-butyl(Arloxyphenoxy-propionate)inhibits acetyl CoA-carboxylase.

Storage:

- The packages containing the herbicides should be stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key.
- The rooms or premises meant for storing the herbicide shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapor.

Precautions: Do not use cooking utensils for preparing the spray solution. Use stick for stirring the spray solution. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Avoid inhalation of fog and vapors. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Wear protective clothing, mask, goggles, and boots, while handling the product. Do not eat, drink or smoke while applying the product. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Avoid contamination of air and water bodies with the herbicide. The product should not be used near aquaculture. Also wash the contaminated clothes.

Disposal of empty containers:

- Packages or surplus materials and washings from the machines and containers should be disposed off in a safe manner as to prevent environmental and water pollution.
- The used packages shall not be left outside to prevent their reuse.
- Packages shall be broken and buried away from habitation.

Symptoms of Poisoning: Symptoms like Malaise, Malaise, vomiting, muscle weakness, difficulty breathing, bradycardia, excessive sweating, oliguria etc may occur. Drowsiness, dizziness, loss of coordination and fatigue is common symptoms in case of large quantity ingested. Vomiting and severe pulmonary congestion, followed by difficulty breathing and coma is common symptoms if inhaled in small quantity.

First Aid: Remove the affected person to a well-ventilated area or fresh air and protect him from undercooling. IN CASE OF SKIN CONTACT: Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. IN CASE OF EYE CONTACT: Rinse eyes with clean water for several minutes. IN CASE OF INGESTION: Repeatedly administer medicinal charcoal in a large quantity of water. Get the attention of the medical doctor immediately. NOTE: Do not induce vomiting or never give anything by mouth to an unconscious person.

Antidote: No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy.

Manufactured by: Syngenta India Limited, Amar Paradigm, S. No. 110/11/3, Baner Road, Pune-411 045.

Factory Address:

Village Nimbuva, Tehsil Dera Bassi, District SAS Nagar (Mohall), Punjab – 140201.

Marketed by: **Godrej Agrovet Ltd.**, Godrej One, 3rd floor, Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (East), Mumbai-400 079.

रिफ्लेक्स

फौमैसाफ़ेन ११.१% भार/भार + फ्लुआझिफॉप–पि–ब्युटाईल ११.१% भार/भार एस.एल. (खरपतवारनाशक)

फौमैसाफ़ेन ११.१% भार/भार + फ्लुआझिफॉप–पि–ब्युटाईल ११.१२% भार/भार एस.एल. एक बुनिया्द खरपतवारनाशक हे जिसकी रिकारिश सोयाबीन तथा मूँगफली मे धानकुलवाले एवं बोझी पत्ती वाले जाति के खरपतवारों के उगने के बाद नियंत्रण के लियं की जाती है।

फौमैसाफ़ेन स.त.:	११.१% भार/भार
फ्लुआझिफॉप–पि–ब्युटाईल स.त.:	११.१% भार/भार
एमुल्सीफायर: कोपोलिमर ब्यूटे नोल पीओ /इओ :	७.११% भार/भार
कंडनसेशन प्रोडक्ट ऑफ कासटर ऑयल और इथाईलीन आक्साइड:	११.१% भार/भार
एंटीफ्रीज: पातीयइथालीन ग्लायकोल:	१७.७८% भार/भार
फिजरसेटिव: १,२– बैन्झिसोथियाजोल–३ (२ एच)–ओन (२०% घोल की तरह) :	०.०५% भार/भार
नीट्रूडैलाजि.ग.एजेंट: सोडियम हाइड्रॉक्साइड का ५०% घोल:	१०.० % भार/भार
साल्वेन्ट: पानी	पर्याप्त मात्रा
कुल:	१००.०% भार/भार

^१ उदासीकरणी की प्रक्रिया एवं पीएच की जरूरत के अनुसार सोडियम हायड्रॉक्साइड की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है।

इस्तेमाल का तरीका और रिकारिश : नीचे दिये गये रिकारिशों की अनुसार फौमैसाफ़ेन ११.१% भार /भार + फ्लुआझिफॉप–पि–ब्युटाईल ११.१% भार /भार एस.एल. का इस्तेमाल सोयाबीन तमसे मूँगफली मे धानसकुल वाले एवं बोझी पत्ती वाले जातों के उगने के बाद नियंत्रण के लिये किया जाता है।

फसल	खरपतवार का सामान्य नाम	मात्रा प्रति हेक्टेयर		प्रयोग का समय एवं संख्या	पानी की मात्रा (पानी का घोल लीटर/ हेक्टेयर)	अंतिम छिडकाव की कटाई के बीच अंतराल (दिन)
		सक्रिया तत्व (ग्रा)	संरचना (मि.ली.)			
सोयाबीन	साँवा (एफिनोक्लोआ कोलोम), बनरा (फि डिगि रिया स्पीशीज), कोठी घास (ईल्यूमिन इंडिका), मकरा घास (खट्टीलोटेरनिम एगिप्टीकम), बघदत (ब्रिकारिया रेप्टन्स), ट्राइथमा स्पीशीज, कचरा (कमेलिया शेंलेसिस), डाइजीरा ओरेंसिस, फायलसुस निरुन्नी, अरलीकश इंडिका, दिनबारा अंधिका	२५०	१०००	खरपतवारों के उगने के बाद उन की २–५ पत्तियों की अवस्था पर एवं मिट्टी में पर्याप्तपानी होने पर (एक बार प्रयोग)	५००	७१
मूँगफली	साँवा (एफिनोक्लोआ कोलोम), बनरा (फि डिगि रिया स्पीशीज), कोठी घास (ईल्यूमिन इंडिका), मकरा घास (खट्टीलोटेरनिम एगिप्टीकम), बघदत (ब्रिकारिया मुटिका), एलुरेसस विलोचुस, इंडीमोफेरा प्लांडुलोसा, सिहुर (ब्लोरिस बारबुडन), ट्राइथमा स्पीशीज, डाइजीरा ओरेंसिस, फिलचलुस निरुन्नी, कसिओस बिसकोसा, अमरन्थस बिरिडिस, सिरिरेस सय.	२५०	१०००	खरपतवारों के उगने के बाद उन की २–५ पत्तियों की अवस्था पर एवं मिट्टी में पर्याप्तपानी होतो पर	५००	८२

इस्तेमाल के लिए रिकारिश:

बीज बोने (बुवाई/ बिजई) के पश्चात खरपतवार उगने के बाद जब २–५ पत्तयों की अवस्था में हो तथा खेत की मिट्टी मे पर्याप्त पानी हो और खरपतवार सक्रिय अवस्था मे हो तो केवल एकबार प्रयोग किया जाना चाहिए।

प्रयोग के लिए निर्देश: खरपतवारनाशक को नैसर्गक स्प्रेयर (स्प्रेट फैन नोजल) से छिडकाव करें। खरपतवारनाशक को निश्चित मात्र के पानी में अच्छी तरह मिला करन बने घोल से अच्छी तरह छिडकाव कीजीए।

प्रतिरोध प्रबंधन: लगातार एक ही खरपतवारनाशक के इस्तेमाल होने से प्रतिरोधी खरपतवारों के घनन मे वृद्धि होने की संभावना हो सकती है। अतः एकही तरह के खरपतवारनाशक (एकही तरह से काम करने वाले) को आगेले फसल चक्र में लगातार इस्तेमाल नहीं करें। जहाँ तकसम्भव हो, हर फसल चक्र मे अलग तरह से काम करने वाला अलग खरपतवारनाशक इस्तेमाल करें। इस वृद्धि को काबू में लाने के लिए कई अन्य शैली योग्य एकीकृत प्रतिरोध प्रबंधन योजनाओं के इस्तेमाल की रिकारिश की जा सकती है।

एच.आर.ए.सी. गु्प कोड : फौमैसाफ़ेन (ई) और फ्लुआझिफॉप –पि– ब्युटार्ड्ल (यु)

रासायनिक सहस्र तथा कार्यविधि: फौमैसाफ़ेन (डायफिनयाल ईथर) प्रोटोपेरफाफरिनोलेज ऑक्सिडेज को रोकता है एवं फ्लुआझिफॉप –पि– ब्युटाईल (अरलीकशिमिनोअली–प्रोपियोनेट) एस्तिटायलको ए. कार्बॉक्सिलेज को रोकता है।

भण्डारण:

- खरपतवारनाशक के डिब्बों को अन्य सामग्री विशेषकर खाद्य पदार्थों के संग्रहण कक्ष या स्थान से दूर किया जाना चाहिए अथवा खरपतवारनाशक की मात्रा तथा रसाय पर निर्भर करते हुए, डिब्बों को अलग अलमारियों में ताला–बाधी लगा कर रखें।

- खरपतवारनाशक का संग्रहण कक्ष या स्थान रोशनीदार, मजबूत बनावत का हवादार तथा पर्याप्त लम्बाई चौड़ाई का होना चाहिए, जिससे बाष्प द्वारा प्रदूषण न हो।

सावधानी: स्प्रे तैयार करने के लिए खाना पकाने के बर्तनों का इस्तेमाल मत कीजिए। स्प्रे के घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करें। त्वचा, अंखि, और मूँह को खरपतवारनाशक के संपर्क से बचाये तथा श्वास द्वारा अंदर जाने से रोकें। सुरक्षात्मक कपड़े जैसे कि टैपान, दस्तानों, नकाब और गम बूट आदी पहन कर ही इसका प्रयोग करें। खरपतवारनाशक का प्रयोग करते समय, खाना, पीना और धुम्रपान करना नहीं चाहिए। प्रति दिन प्रयोग के बाद, खरपतवारनाशकसे प्रभावित हिस्सों को अच्छी तरह धो ले और कपड़ा बदल ले। ये खरपतवारनाशक को मच्छी पातन वाली जगहों के पास इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दुषित कपड़ों को अच्छी तरह धोले।

खाली डिब्बों का निपटारा:

- पर्यावरण का प्रदूषण बढाने के लिए खाली डिब्बें, बहा हुआ घोल, मशीनों की धोवन और डिब्बों का निपटारा सुरक्षित स्थान पर रखें।
- खाली डिब्बों का पुन: प्रयोग रोकने के लिए, उन्हें बाहर न छोड़ें।
- डिब्बों को लोड–मोडैकर आबादी से दूर जलपान में गंध देना चाहिए।

विषवैधता के लक्षण: अवस्थातन्त्र, उलटी, मांसपेशियों में कमजोरी, साँस लेने मे कठिनाई, मंडस्त्रंन, अतिरिक्तपित्त, पेशाब की कमी जैसे लक्षण हो सकते है। अधिक मात्रा मिलन जाते पर उर्मीतान, चक्कर आना, समन्वय का अभाव जैसे आम लक्षण हो सकते है। साँस के द्वारा थोड़ी मात्रा अन्दर जाने से उलटी, फेफड़ों में गंभीर जलज्व, साँस लेने में कठिनाई और कोमा जैसे आम लक्षण हो सकते है।

प्राथमिक उपचार: प्रभावित व्यक्ति को प्रसूतिग जगह से हटावदार कमरे या खुली हवा में ले जाए और तामपान से बचाए। त्वचा में लगने पर: प्रदूषित कपड़ों को उतार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबून और पानी से अच्छी तरह धोएं। आँखों में चले जाने पर: आँखों को कुछ देर तक साफ पानी से अच्छी तरह धुएँ। **निमत जाने पर:** पानी में मेडिसिनल चारकोल की काफी मात्रा घोलकर बार बार दें और तुलुन डाक्टर को बुलाइयें। **घुसना:** यदि मरीज बेहोश हो तो, मुँह से कुछ न दें। उलटी करने की कोशिश न करें।

विष प्रतिहार दवा: कोई खास विष प्रतिहार नहीं है, लक्षण के अनुसार चिकित्सा करें।

निर्माता: सिंजेटो इंडिया लिमिटेड, अमर पॅराडिगम, एच.नं. ११०/११/३, बाणेर रोड, पुणे–४११०४५.

फैक्टरी का पता:

ग्राम निम्बुआ, तहसील डेरा बारी, जिला एस्सएस नगर (मोहाली), पंजाब–१४०२०१.

विपणनकर्ता : गोरेरेज एग्रोवेट लिमिटेड, गोदरेज नगर, तीसरी मंजिल, पिरोजनगर नगर, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, विकोली (पूर्व), मुम्बई–४०० ०७९.

रिफ्लेक्स

फौमेसाफ़ेन ११.१% डब्ल्यु/डब्ल्यु + फ्लुआझिफॉप–पी–बुटील ११.१% डब्ल्यु/डब्ल्यु एसएल (तणनाशक)

फौमेसाफ़ेन ११.१% डब्ल्यु/डब्ल्यु + फ्लुआझिफॉप–पी–बुटील ११.१% डब्ल्यु/डब्ल्यु एसएल हे एक निवडत त्ताण उगवण्यानंतर फवारण्याचे तणनाशक अस्तु सोयाबीन व भुईमूग पिकांमध्ये उगवणाया गवत व रुंद पानाच्या अशा दोन्ही तणांवर नियंत्रणासाठी शिकारस करण्यात येते.

फौमेसाफ़ेन स.ध.:	११.१% डब्ल्यु/डब्ल्यु
फ्लुआझिफॉप–पी–बुटील ए.आय.	११.१% डब्ल्यु/डब्ल्यु
एमलिसफायर : कोषोलिनर बुटानोल पीओ /ईओ	७.११% डब्ल्यु/डब्ल्यु
एरंडेल आणि एथिलीन–ऑक्साईड नोल्फ केलेला पदार्थ	११.१% डब्ल्यु/डब्ल्यु
ऑन्टिफ्रीज : पॉलिएथिलिन ग्लायकॉल	१७.७८% डब्ल्यु/डब्ल्यु
रक्षणसाधक : १,२–बेन्झिसोथियाझोल–३ (२एच)–एक (२०% द्रावण म्हणून)	०.०५% डब्ल्यु/डब्ल्यु
न्युट्रल करणाा माध्यम : सोडियम हायड्रॉक्साईड ५०% द्रावण	१०.० % डब्ल्यु/डब्ल्यु
द्रावक : पाणी	पर्याप्त मात्रा
एकूण :	१००.०% डब्ल्यु/डब्ल्यु
^१ न्युट्रल करणव्याव व सामू मिळवण्यावर आधारीत सोडीयम हायड्रॉक्साईडचे प्रमाण कमी जास्त अस्तु शकते.	

वापर व वापरण्यासाठी शिकारस : पुढे दिलेल्या शिकारशीनुसार वापरल्यास फौमेसाफेन ११.१% डब्ल्यु/डब्ल्यु –पि–ब्युआझिफॉप–पी–बुटील ११.१% डब्ल्यु/डब्ल्यु एसएल हे सोयाबीन व भुईमूग पिकांमध्ये उगवणाया गवत व रुंद पानाच्या अशा दोन्ही तणांवर नियंत्रण ठेवते.

पीक	तणाचे शास्त्रीय नाव सामान्य नाम	प्रती हेक्टर खंड		वापराची रेळ आणि नं.	पाण्याचे द्रावण (लि/ हेक्टर)	अंतिम फवारणी ते कापणीपर्यंतचा प्रतिसा कालावधी (दिवसांमध्ये)
		ए. आय तत्व (गॅम॰)	पदार्थ (मिली)			
सोयाबीन	एफिनोक्लोआ कोलोना, डिडिटेरिया एसपीसी., ईल्यूमार्इन इंडिका, डॉडिटोक्लेटेनिम एगिप्टिकम, ब्राचिआरिया रेप्टन्स, कॅमेरिसिना डेफालिन्सिस, डास पेन ऑर्न्सिस, ट्रायन्थेमा एसपीसी., फिलचलुस निरुन्नी, एलुरिफा इंडिका, दिनब्रा अरबिका	२५०	१०००	मातीत इष्टतम ओलावा असलेली त्वा २–५ पानाचे झाव्यावर लवकरच फवारणी करावी	५००	७१
भुईमूग	एफिनोक्लोआ कोलोनी, डिडिटेरिया एसपीसी., ईल्यूमार्इन इंडिका, डॉडिटोक्लेटेनिम एगिप्टिकम, ब्राचिआरिया मुटिका, ईलुरेसस विल्कोरस, इंडोफेरा प्लेडुलोसा, क्लोरिस बाबुटी, ट्रायन्थेमा एसपीसी., डास पेन ऑर्न्सिस, क्लेओम बिसकोरा, फिलचलुस निरुन्नी, अमरन्थस बिरिडीसी, सायपेरस एसपीसी.	२५०	१०००	मातीत इष्टतम ओलावा असलेली त्वा २–५ पानाचे झाव्यावर लवकरच फवारणी करावी	५००	८२

वापरण्यासाठी शिकारस :

तणाची सक्रिय वाढ होत असताना, पेरणीनंतर लवकर फवारणी करण्यासाठी मातीत इष्टतम ओलावा असताना तण २–५ पानाचे झाव्यावर एकूण फवारवे.

वापरण्याची पध्दत :

परलेट फैन नोजल बसवलेले नॅपर्सक फवारणी पंपाने हे तणनाशक फवारावे. तणाच्या पालवीवर संपूर्णपणे फवारणी करावी अशा पध्दतीने पुरेशा प्रमाणात पाणी घेऊन हे फवारवे.

दाव न ठेवण्यात पध्दत :

एकसमान कृतीपध्दत असलेले तणनाशक वारंवार फवारल्यामुळे तण ह्या तणनाशकास कदाचित दाव देणार नाही. त्यामुळे एकसमान कृतीपध्दत असलेले तणनाशक पुढच्या हंगामात फवारू नका आणि आवश्यक असल्यास पुढच्या हंगामासाठी वेगळी कृतीपध्दत असलेले तणनाशक फवारा. उरायिक कृषीपध्दतीमुळे तणनाशकाचा दाव न देण्या्या तणाचा नाश होऊ शकतो. असे तण ज्या शेतात उगवण्याची शक्यता आहे त्या शेतात फवारल्या तण व्यवस्थापन उपाय करावा.

एचआरएसी गुप कोड : फौमेसाफेन (ई) आणि फ्लुआझिफॉप–पी–बुटील (ए)

रासायनिक वर्ग व कृतीपध्दत : फौमेसाफेन (डायफेनिलेटर) प्रोटोपेरफिनोलेजन ऑक्सिडेसला प्रतिबंध करते आणि फ्लुआझिफॉप–पी–बुटील (अरलीकशिमिनोअली–प्रोपियोनेट) अस्तिटेल सीओ कॅांबॉक्सिलेसला प्रतिबंध करते

साठवण ठेवण्याविषयी :

- हे कितकनाशक असलेले पाकिट अस्तु वस्तू ठेवण्यासाठी असलेल्या खोलीपासून लांब, एका वेगळ्या खोलीत किंवा इमारतीत आणि कितकनाशकाचे स्वरूप व प्रमाण ह्यानुसार वेगळ्या कपाटात कुलुवंद करून ठावू.
- कितकनाशक ठेवण्यासाठी असलेली खोली किंवा इमारत पक्क्या बांधकामाची, ओलावा नसलेली, भरपूर उजेड असलेली व वायुविजन आणि एरस्पेस असावी, म्हणजे बाष्पीभवनाने हवा घुलित होणार नाही.

खबरदारी : फवारण्याकरिता द्रावण तयार करण्यासाठी घट्यांपाकणी भांडी वापरू नका, द्रावण दळण्यासाठी काठी वापर; द्रावण अंगावर, डोळ्यात किंवा कपड्यांवर पडणार नाही ह्याची काळजी घ्या. द्रावण हाताळताना हातमोळे वापरू म्हणजे कातडीला स्पर्श होणार नाही. द्रावण हाताळताना संरक्षक कपडे, गॉगल, बूट वापरा. द्रावण फवाराताना खाणे–पिणे किंवा धुवपान करू नका. फवारणी झाल्यावरत लोचच कपडे बदल आणि साबुन व पाण्याने ओळख करा. द्रावण हवा किंवा पाण्याच्या संपर्कात येऊ देऊ नका. मासळी असेल तिथे हे तणनाशक वापरू नका. अंगावरील दूषित कपडे घ्या.

वापरलेल्या ड्रव्याची विलंबता :

- पाकिटे वापरल्यानंतर फोडून मानवी वस्तीपासून दूरजमिनीखाली गाढावेत.
- वापरलेले डबे बाहेर उघड्यावर फेकू नयेत कारण त्यांचा पुर्नवार उपयोग शक्यता असत.
- वापरलेले पाकिट, अतिरिक्त साठुणी व मशीनमधील पदार्थांची सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावावी, जेणेकरून त्यामुळे हानि व पर्यावरण विनाश होणार नाही.

विषबाधा झाल्याची लक्षणे : बरे न वाटणे, उलटी होणे, मांसलपेशीत असह्यता, श्वास घेताना त्रास होणे, थाप लागणे, ह्याप्रकारे लक्षणे दिसू शकतात. अशी लक्षणे दिसू शकतात. औषध बचाय प्रमाणात पोटात गेल्यास उलटी होणे, श्वासमार्ग बोंदणे व त्यानंतर धाप लागणे व शुब्द हरपणे अशी लक्षणे दिसू शकतात.
प्रथमोपचार : त्या व्यक्तीला कोळसा होत न्या आणि त्याच अंगार पडणार नाही ह्याची काळजी घ्या. अंगार पडल्यास प्रथमतः पाकडे काढा व साणाने ओघोळ करा. डोळ्यात गेल्यास कित्येक मिनिटे डोळ्यावर स्वरुध पाण्याचे हलकारे धावा. पोटात गेल्यास बचाय पाण्यात औषधीय कोळसा घालून ते वारंवार प्यायला घा व डोंडवतकरून घ्या.

टिप : शुध्दीवर नसल्यास ओकारी काढण्यास प्रवृत्त करू नका. तोंडावटे काहीही प्यायला देऊ नका.

प्रतीविष : उरायिक प्रतीविष ठाऊक नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा.

उत्सादक : सिन्जेटो इंडिया लि., अमर पॅराडिगम, सर्वे.नं. ११०/११/३, बाणेर रोड, पुणे–४२२०४५.

फॅक्टरीचा पता:

निम्बुआ गाव, तहसील डेरा बारी, जिह्ला एस्सएएस नगर (मोहाली), पंजाब– १४०२०१.

विक्रेता : गोदरेज अॅग्रोवेट लिमिटेड, गोदरेज नगर, तीसरा मजला, पिरोजनगर नगर, ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, विकोली (पूर्व), मुम्बई–४०० ०७९.

रिइ्लेक्स

झोमेसाइेन ११.१% व/व + झ्वॉझिफोप–पी–ब्युटाईल ११.१% व/व अेसअेव (निंदाभागनाशक)

झोमेसाइेन ११.१% व/व + झ्वॉझिफोप–पी–ब्युटाईल ११.१% व/व अेसअेव अे अ्युनिट् डेट्मव पडरी वपरांतुं निंदाभागनाशक छे, ळ्नी भवामागु सोयाबीन अने मगझ्नीना पाकडं थवा घास अने पडोव्या पाननां अने निंदाभागना निरंजना माटे अरवांमां अवे छे.

रासायनिक संरचना:	
मिमेसाइेन स.ध.:	११.१% व/व
बोडिफोप-पी-ब्यूटाइल स.ध.:	११.१% व/व
ईमलिसाइस: डीपोलिमर ब्यूटानोव पीओ /ईओ	७.११% व/व
इंटर२ ओईल अने ओथीलीन-ऑक्साईड कन्डन्सेशन उत्पादन	११.१% व/व
नैट्रिड्स: पोविओथीलीन एमपाइओव	१७.७८% व/व
एल२एडि२: १,२ बेनिजसोयार्डओव	
२ (अरेक)-मन (२०% सोल्यूशन तरीक)	०.०४% व/व
पेट्रुबालाईजिज अवेन२: सोलियम डायड्रोसलाईड ५०% सोल्यूशन	१०.०% व/व
सोल्वेंट: पाणी	प.मा.
कुल:	१००.०% व/व

किसी भी शिकायत के लिए, कृपया हमारे ग्राहक सेवा अधिकारी को संपर्क करें।
गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड,
गोदरेज वन, तीसरी मंजिल, पिरोजशा नगर,
ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, विक्रोली (पूर्व), मुम्बई-४०० ०७९, महाराष्ट्र.
टेलिफोन नं. : ०२२ २५९९ ४४९९,
ईमेल : customercare@godrejagrovet.com