VESOS

Metolachlor 50% EC Herbicide

Metolachlor 50 % EC is a selective pre-emergence herbicide used for the control of annual grasses and weeds like Echinochloa spp. Eleusine indica. Digitaria spp. Panicum spp. Cyperus spp. Amaranthus viridis etc. on Soyabean.

Recommendation:

Crop (s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in water (liter)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
		AI (gm)	Formu-lation (ml)		
Soya-bean	Echinochloa spp. Digitaria sp. Eleusine indica Panicum sp. Cyperus sp. Amaranthus viridis Digitaria sp. Eleusine indica Panicum sp. Cyperus sp. Amaranthus viridis	1000	2000	600-750	Pre emergence

Re-entry Period: Do not enter treated areas for 24 hours after spray.

Direction Of Use: For conventional spray (High volume sprayer) on field crops, quantity of water recommended. For other methods of low volume and ultra low volume quantity of water varies. The most commonly used sprayer. PP Equipment : Bucket pump sprayer. Stirrup pump sprayer. Knapsack sprayer, wheel barrow sprayer, Compression knapsack sprayer etc. Use the sprayer with flood jet or flat fan nozzel. Keep the nozzel at fixed height from the ground level spray. Spray the area in straight line uniform speed. Limitations for use : Do not apply to animals or exposed milk, equipment, food or drinking water to spray. Do no treat food grains, seeds or feed meant for consumption by man or animals.

Weather Condition(in general): Do not spray during the windy weather conditions or during hot hours of the day and if rain is imminent. Spray strictly in the direction of wind to prevent prolonged or repeated exposure to the spray mist. Do not underdose or overdose by overlapping applications or by exceeding the recommended rate.

Soil & Water(where ever applicable): This is a pre-emergence herbicide and applied in soils as pre-emergence. Please avoid drift to adjacent field soils while applying/spraying. Do not contaminate water used for irrigation or domestic purpose and water areas viz. ponds, ditches, lakes, drainage systems etc. by disposal of product waste and do not allow direct over spray or spray drift of product on to these areas to avoid long term adverse effect in the aquatic environment.

Crop Stage for application: This herbicide is not applied on crops and applied in soil as pre-emergence application, hence, crop stage is not applicable.

Instruction for Mixing : Measure out the required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for high volume application through Knapsack sprayers with flat fan flood jet nozzle.

Manner and Time of Application: Apply as pre-emergence after sowing on the same day. Application Timing Preferably, should apply in the morning or evening hours.

Frequency: Maximum number of applications is one.

Time of Application: It is used as pre emergence of weeds.

Precautions: 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Precautions shall be taken to avoid harm to the beneficial insects like honey bees and natural enemies of pests.

Symptoms Of Poisoning: Seditation, dyspnoea, exophthalmos, abnormal posture may occur.

First Aid: 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaiminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. 5. Incase any sign of poisoning ,immediately consult the doctor.

Phytotoxity: The product is not phytotoxic, if applied at the recommended dose.

Antidote: No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal Of Used Container: 1. It shall be the duty of manufactures, formulators of product and operators to dispose packages or surplus materials and washing from the machine the container shall be disposed off in safe manner. So as to prevent environmental and water pollution. 2. The packages shall not be left to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and burried away from habitation.

Storage Conditions: 1. The packages containing the herbicides shall be stored in separate rooms or premises used for storing other articles particular articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending on the quantity and the nature of the herbicide. 2. The rooms or premises meant for storing the herbicides shall be well built, dry, cool, ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition :

Metolachlor a.i.	50.00%w/w
Surfactant/wetting agent (Dodecyl benzene sulfonic acid, calcium salt)	3.00 %w/w
Emulshifing agent (Castor oil polyglycol ether 36-40)	6.00 %w/w
Xylene (Dimethyl beneze)	QS %w/w
Total	100 % w/w

Cautionary Statement: 1 . It is toxic to honey bees, spray application should be avoided during the foraging period of bees. 2 . toxic to fish, aquatic organisms hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture. 3 . Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets. 4 . Destroy the container after use as directed on leaflet. 5 . Toxic to earthworms and other beneficial arthropods.

Dangerous to re-use empty containers.

वेसोस

मेटोलाक्लोर ५० प्रतिशत ई सी खरपतवारनाशक

मेटोलाक्लोर ५० प्रतिशत ई सी एक चयनात्मक उगने से पूर्व का खरपतनाशक है जो सोयाबीन पर सालाना होने वाले घास और खरपतवारों जैसे मांडला, क्रबघास, मकड़ी, पेनीकर, मोथा, जंगली चौलाई वेरिडस की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है।

उपयोग:

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों मे)
		स.तत्व (ग्राम)	संरचना (मि.ली.)		
सोया–बीन	संबाक क्रेव घास मांडला मकड़ा मोथा जंगली चौलाई क्रेव घास मांडला मकड़ा मोथा जंगली चौलाई	१०००	२०००	६००–७५०	उगने से पूर्व

पुन: प्रवेश अवधि: २४ घंटे ।

उपयोग के लिए दिशा–निर्देश: पौध सुरक्षा यंत्र: फसलों पर साधरणत: छिड़काव (अधिक मात्रा छिड़काव) के लिए, पानी की मात्रा टेबल में लिखित है। अन्य कम या अत्यधिक कम मात्रा के लिए पानी की मात्रा अलग होती है। साधारणत्या प्रयोग किए जाने वाले छिड़काव यंत्र है बकेट पंप छिड़काव यंत्र, नैपसैक छिड़काव यंत्र, व्हील बैरी छिड़काव यंत्र, कम्प्रेशन नैपसैक छिड़काव यंत्र आदि । छिड़काव यंत्र को फलड जैट नोजल के साथ प्रयोग करें। नोजल को जमीन से एक समान दुरी पर रखें। छिड़काव एक समान गति से सीधी लाईन में करें। प्रयोग की सीमाएं: पशुओं, खुले दुध उपकरणों, खाने की वस्तुओं तथा पीने के पानी पर छिड़काव नही करें। मनुष्यों या पशुओं के लिए खाद्यान, बीजों या खाने पर छिड़काव नही करें।

मौसम की स्थिति (सामान्यतया): जब हवा तेज हो, दिन का सबसे गर्म समय हो, या बारिश हो रही हो तो छिड़काव न करें। छिड़काव के धुएं के लंबे समय तक और बार–बार संपर्क से बचने के लिए हवा की विपरीत दिशा में छिड़काव करना सुनिश्चित करें। प्रयोग की मात्रा बहुत कम न हो या प्रयोग बहुत बार न करें, या अनुशंसित मात्रा से अधिक न करें।

मिट्टी और पानी (जहां लागू हो): यह एक उद्भव– पूर्व खरपतवारनाशक है और इसे मिट्टी में उद्भव– पूर्व खरपतवारनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। छिड़काव करते समय कृपया छिड़काव की बूंदों को आसपास के खेतों पर फैलने न दें। जलीय पर्यावरण पर दीर्घ कालिक प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए, उत्पाद अपशिष्ट का निपटान करके सिंचाई या घरेलू जल निकायों और तालाबों, नहरों, झीलों और जल निकासी प्रणालियों जैसे जल स्रोतों को दूषित न करें और इन स्थानों पर सीधे छिड़काव न करें या उत्पाद के छिड़काव की बूंदों को इन क्षेत्रों में फैलने न दें।

उपयोग हेतु फसल की अवस्था: इस खरपतवारनाशक का उपयोग फसलों पर नहीं किया जाता है, इसका उपयोग मिट्टी में उद्भव–पूर्व खरपतवारनाशक के रूप में किया जाता है, इसलिए यहाँ फसल की अवस्था लागू नहीं होता है।

मिश्रण हेतु निर्देश: उत्पाद की आवश्यक मात्रा लें और थोड़ी मात्रा में पानी के साथ अच्छी तरह मिलाएं. उच्च मात्रा में प्रयोग के लिए, बचे हुए पानी की निर्दिष्ट मात्रा को फ्लैट फैन, फ्लड जेट नोजल से सुसज्जित नैपसेक स्प्रेयर में डालें और अच्छी तरह हिलाएं।

प्रयोग विधि एवं समय: बुआई के बाद उसी दिन उद्भव – पूर्व खरपतवारनाशक के रूप में प्रयोग करें।

उपयोग का सर्वोत्तम समय: सुबह या शाम को प्रयोग करना चाहिए।

प्रयोग की आवृत्ति: अधिकतम एकबार प्रयोग करें।

प्रयोग का समय: इसका उपयोग खरपतवार नियंत्रण के लिए उद्भव – पूर्व खरपतवारनाशक के रूप में किया जाता ह।

प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानियां : १. खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें। २. मुँह, त्वचा और आंखों के संम्पर्क से बचायें। ३. छिडकाव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा मे छिडकाव करें। ४. छिडकाव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। ५. छिडकाव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिडकाव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें।

शहद की मक्खियों और कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं जैसे लाभकारी कीडों से नुकसान से बचाने के लिए बरती जाने वाली सावधानियां

विष के लक्षण: नींद आना, डिसपोनिया, आँखों का बाहर को निकलना, असामान्य अवस्था हो सकते है।

प्राथमिक चिकित्सा: १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़े उतार दें और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन / साफ पानी से लगभग १०– १५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। ५. विषाक्तता का कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

पौधविशाक्तता: यदि अनुशंसित खुराक पर लागू किया जाता है,यह उत्पादक पौध विषाक्तता नहीं है।

विष नाशक: कोई विशिष्ट विषनाशक नही है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा: १. निर्माताओं उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि खाली डिब्बो को तोड कर जमीन में गाड़ दें। २. प्रयोग किये हुऐ डिब्बों को दुबारा प्रयोग के लिए बाहर न छोडें। ३. डिब्बों या बची सामग्री या धोवन का निपटारा इस प्रकार करें कि आसपास की चीजे, पानी प्रदूषित न हों।

संग्रहण की शर्तें: १. खरपतवार के पैकेटों को अलग अलग कमरों अथवा जगहों में खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कमरों अथवा जगहों से अलग अलग अलमारियों में ताला चाबी के अन्दर रखना चाहिए। २. जिस कमरें अथवा जगह में कीटनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह हुआ, सूखा, हवादार तथा प्रकाश युक्त व काफी लम्बा चौडा होना चाहिए जिससे कीटनाशक की भाप से वातावरण दूषित न होने पाये।

रासायनिक संरचना:

मेटालाक्लोर सक्रिय तत्व	५०.०० %भार / भार
सरफेक्टेन्ट / वेटिग एजेंट (डोडीसाईल बैन्जीन सल्फोनिक एसिड, केल्शियम साल्ट)	३.०० %भार / भार
इमल्सीफाईग एजेंट (कास्टर आंयल पोलीग्लाईकोल ईथर ३६–४०)	६.००%भार / भार
जाईलिन (डाईमिथाईल पर्याप्त बैन्जीन)	मात्रा % भार / भार
कुल	१०० % भार / भार

चेतावनी: १. यह उत्पाद मधुमक्खियों के लिए विषाक्त है, इसलिए जब मधुमक्खियाँ भोजन की तलाश में सक्रिय हों तो इसका छिड़काव नहीं करना चाहिए। २. यह उत्पाद मछलियों और जलीय जीवों के लिए विषाक्त है, इसलिए इसे जल निकायों, जलीय कृषि या मछली पालन के पास नहीं लगाया जाना चाहिए । ३.लेबल / लीफलेट में दी गई फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इसका उपयोग करना मना है।४.पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार उपयोग के बाद कंटेनर को नष्ट करें। ५. यह केंचुओं और अन्य लाभकारी आर्थ्रोपोडा कीटों के लिए विषाक्त है। **खाली डिब्बों को दुबारा उपयोग करना खतरनाक है।**

वेसोस

मेटोलाक्लोर ५० % ईसी तणनाशक

मेटोलाक्लोर ५० % ईसी है एक निवडक,उगवणी पूर्व तणनाशक आहे जे वार्षिक गवत आणि इचिनोक्लोवा एसपीपी सारख्या तणांच्या नियंत्रणासाठी वापरले जाते. सुयाबिन इंडिका. डिजीटरीया एसपीपी. पॅनिकम एसपीपी. सायप्रस एसपीपी. सोयाबीनवर राजगिरा विरिडीस इ.

शिफारश:

पीक	कीटकाचे सामान्य नाव	प्रमाण/हे.		सौम्य करण्या साठी (लिटर)	शेवटची फवारणी ते कापणीतील वाट पाहण्याचा कालावधी (दिवसात)
		स.त. (ग्रॅ.)	द्रावण (मि.ली.)		
सोयाबीन	इचिनोक्लोवा एसपीपी, डिजीटरीया स्पी., इल्यूसिन इंडिका, पॅनीकम स्पी. सायप्रस स्पी, ॲमरन्थस विरीडीस डिजीटरीया स्पी., इल्यूसिन इंडिका, पॅनीकम स्पी. सायप्रस स्पी, ॲमरन्थस विरीडीस	१०००	२०००	६००–७५०	उगवणी पूर्व

पुन: प्रवेश कालावधी: फवारणी नंतर २४ तास उपचार केलेल्या भागात प्रवेश करू नका.

वापरण्यासाठी निर्देश: पारंपारिक फवारणीसाठी (हाई वॉल्यूम स्प्रेयर शेतातील पिकांवर पाण्याचे प्रमाण शिफारसीय आहे. कमी आवाजाच्या आणि अल्ट्रा लो वॉल्यूमच्या इतर पद्धतींसाठी पाण्याचे प्रमाण बदलते. सर्वांत सामान्यत: वापरले जाणारे स्प्रेअर. **पीपी उपकरणे :** बकेट पेप स्प्रेअर, स्टिरपर पंप स्प्रेअर नॅपसॅक स्प्रेअर, व्हील बॅरो स्प्रेअर, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक स्प्रेअर इ. फ्लंड जेट किंवा फ्लॅट फॅन नोझलसह स्प्रेअर वापरा. ग्राउंड लेव्हल स्प्रे पासून नोझल ठराविक उंचीवर ठेवा, सरळ रेषेत एकसमान वेगाने क्षेत्र फवारणी करा. **वापरासाठी मर्यादा :** जनावरांना किंवा उघड्यावरील दूध, उपकरणे, अन्न किंवा पिण्याचे पाणी पावारणीसाठी लागू करू नका. मनुष्य किंवा प्राण्यांना वापरण्यासाठी

अन्नधान्य, बियाणे किंवा खाद्य पदार्थांवर उपचार करू नका.

हवामान स्थिती (सर्वसाधारणपणे) : दरम्यान फवारणी करू नका वादळी हवामानाची स्थिती किंवा दिवसाच्या उष्णतेच्या वेळी आणि पाऊस जवळ येत असल्यास. स्प्रे धुक्याचा दीर्घकाळ किंवा वारंवार संपर्क टाळण्यासाठी वाऱ्याच्या दिशेने काटेकोरपणे फवारणी करा. ओव्हरलॅपिंग ऍप्लिकेशन्स किंवा शिफारस केलेल्या दर ओलांडून अंडरडोस किंवा ओव्हरडोज करू नका.

माती आणि पाणी (जेथे कधीही लागू असेल) : हे पूर्व उद्□योन्मुख तणनाशक आणि मातीत पूर्व–उद्रव म्हणून लागू करा– कृपया लागू/फवारणी करताना शेजारील शेतातील मातीत वाहून जाणे टाळा. सिंचन किंवा घरगुती कारणासाठी वापरलेले पाणी दूषित करू नका आणि पाण्याचे क्षेत्र उदा. तलाव, खड्डे, सरोबर ड्रेनेज सिस्टिम इ. उत्पादनाच्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावा आणि जलीय वातावरणावर दीर्घकालीन प्रतिकूल परिणाम टाळण्यासाठी या भागात थेट फवारणी किंवा फवारणी होवू देवू नका,

फवारणी साठी पीकाची अवस्था: हे तणनाशक पिकीवर वापरले जात नाही आणि उगवण्यापूर्वी वापर म्हणून जमिनीत वापरले जाते, म्हणून, पीक अवस्था लागू नाही.

मिश्रणासाठी सूचना: उत्पादनाची आवश्यक मात्रा मोजा आणि त्यात थोडेसे पाणी मिसळा. उर्वरित पाणी निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे. पूर्णपणे हलवून घाला आणि फ्लॅट फॅन फ्लड जेट नोजल असलेल्या नॅपसॅक स्प्रेअरद्वारे जास्त

प्रमाणात वापरा.

फवारणी करण्याची पद्धत आणि वेळ : पेरणीनंतर उगवण्यापूर्वी त्याच दिवशी लावा, फवारणी करण्याची वेळ शक्यतो सकाळी किंवा संध्याकाळी करावी.

वारंवारता : फवारणीची कमाल संख्या एक आहे.

फवारणी करण्याची वेळ : तण उगवण्यापूर्वी याचा वापर केला जातो.

खबरदारी: १) अन्नपदार्थ, अन्नपदार्थांचे रिकामी डबे आणि जनावरांच्या चाऱ्यापासून दूर ठेवा. २) तोंड, डोळे आणि त्वचेशी संपर्क होवू देवू नका. ३) फवारणीचे तुषार श्वासाद्वारे आत घेवू नका. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा. ४) फवारणी नंतर दूषित झालेले कपडे आणि शरीराचा भाग स्वच्छ धुवा. ५) फवारणी करताना धुम्रपान, खावू–पीवू वा चबाणे घ्नू नये. ६) फवारणी द्रावण बनविताना संपूर्ण संरक्षित कपडे वापरावेत.

फायदेशीर कीटक जसे की मधमाश्या आणि कीटकांचे नैसर्गिक शत्रू यांचे नुकसान टाळण्यासाठी घ्यावयाची खबरदारी पडे.

विषबाधेची लक्षणे: बेशुद्धी, श्वास घेण्यास त्रास, एक्सोप्थाल्मोस, असामान्य मुद्रा होवू शकते.

प्राथमिक चिकित्सा: १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निगला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़े उतार दें और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/ साफ पानी से लगभग १०–१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। ५. विषाक्तता का कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

पौधविशाक्तता: यदि अनुशंसित खुराक पर लागू किया जाता है,यह उत्पादक पौध विषाक्तता नहीं है।

विष नाशक: कोई विशिष्ट विषनाशक नही है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा: १. निर्माताओं उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि खाली डिब्बो को तोड कर जमीन में गाड़ दें। २. प्रयोग किये हुऐ डिब्बों को दुबारा प्रयोग के लिए बाहर न छोडें। ३. डिब्बों या बची सामग्री या धोवन का निपटारा इस प्रकार करें कि आसपास की चीजे, पानी प्रदूषित न हों।

संग्रहण की शर्तें: १. खरपतवार के पैकेटों को अलग अलग कमरों अथवा जगहों में खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कमरों अथवा जगहों से अलग अलग अलमारियों में ताला चाबी के अन्दर रखना चाहिए। २. जिस कमरें अथवा जगह में कीटनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह हुआ, सूखा, हवादार तथा प्रकाश युक्त व काफी लम्बा चौडा होना चाहिए जिससे कीटनाशक की भाप से वातावरण दूषित न होने पाये।

रासायनिक संरचना:

मेटालाक्लोर सक्रिय तत्व	५०.०० %भार / भार
सरफेक्टेन्ट / वेटिग एजेंट (डोडीसाईल बैन्जीन सल्फोनिक एसिड, केल्शियम साल्ट)	३.०० %भार / भार
इमल्सीफाईग एजेंट (कास्टर आंयल पोलीग्लाईकोल ईथर ३६–४०)	६.००%भार / भार
जाईलिन (डाईमिथाईल पर्याप्त बैन्जीन)	मात्रा % भार / भार
कुल	१०० % भार / भार

चेतावनी: १. यह उत्पाद मधुमक्खियों के लिए विषाक्त है, इसलिए जब मधुमक्खियाँ भोजन की तलाश में सक्रिय हों तो इसका छिड़काव नहीं करना चाहिए। २. यह उत्पाद मछलियों और जलीय जीवों के लिए विषाक्त है, इसलिए इसे जल निकायों, जलीय कृषि या मछली पालन के पास नहीं लगाया जाना चाहिए । ३.लेबल / लीफलेट में दी गई फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इसका उपयोग करना मना है।४.पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार उपयोग के बाद कंटेनर को नष्ट करें। ५. यह केंचुओं और अन्य लाभकारी आर्थ्रोपोडा कीटों के लिए विषाक्त है। **खाली डिब्बों को दुबारा उपयोग करना खतरनाक है।**

वेसोस

मेटोलाक्लोर ५० % ईसी नीळहणाशक

मेटोलाक्लोर ५० % ईसी सोयाबीन पर ईचिनोक्लोआ सेलपीयी, ईल्युसिन ईन्डिका, डिजिटेरिया सेलपीयी, पानिकम सेलपीयी, सायप्रस सेलपीयी, ॲमेरेन्थस विरिडीडिस वगेरे जेवां वार्षिक घास अने नीळहणा नियंत्रण माटे उपयोग करातुं उभरवा पूर्वे उपयोग करातुं धुर्नुं नीळहणाशक छे.

भलामण:

पाक	शुयातनुं सामान्य नाम	मात्रा/प्रति हेक्टर		पाणीनुं प्रमाण (लिटर)	छेल्ला छंटकावथी ओगणवानुं कापणी सुधीनो प्रतिक्षा-समय (दिवसो)
		स.त. (ग्राम)	मिश्रणनी प्रमाण (मि.ली.)		
सोया–बीन	ईचिनोक्लोआ एसपीपी, ईल्युसिन ईन्डिका, डिजिटेरिया एसपीपी, पानिकम एसपीपी, सायप्रस एसपीपी, ॲमेरेन्थस विरिडीडिस ईल्युसिन ईन्डिका, डिजिटेरिया एसपीपी, पानिकम एसपीपी, सायप्रस एसपीपी, ॲमेरेन्थस विरिडीस	१०००	२०००	६००-७५०	उगवणी पूर्वे

पुनःप्रवेश समयगाळो: छंटकाव पछी २४ कलाक सुधी उपयारित ज्ञयामां प्रवेश नहीं करो.

उपयोग माटे निर्देश: खेतरना पाकमां पारंपरिक स्प्रे (हाई वोल्यूम स्प्रेयर) माटे पाणीनी मात्रा भलामण करात्ही छे. लो वोल्यूम अने अत्यंत लो वोल्यूमनी अन्य पद्धतिओमां पाणीनी मात्रा भिन्न होय छे. सौथी सामान्य रीते उपयोग करातां स्प्रेयर. **पीपी उपकरणो :** बकेट पेप स्प्रेअर, स्टिरपरुम पंप स्प्रेअर नॅपसॅक स्प्रेअर, व्हील बैरो स्प्रेअर, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक स्प्रेअर इ. फ्लंड जेट किंवा फ्लॅट फॅन नोझलसह स्प्रेअर वापरा. ग्राउंड लेव्हल स्प्रे पासून नोझल ठराविक उंचीवर ठेवा, सरळ रेषेत एकसमान वेगाने क्षेत्र फवारणी करा. **वापरासाठी मर्यादा :** जनावरांना किंवा उघड्यावरील दूध, उपकरणे, अन्न किंवा पिण्याचे पाणी पावारणीसाठी लागू करू नका. मनुष्य किंवा प्राण्यांना वापरण्यासाठी

अन्नधान्य, बियाणे किंवा खाद्य पदार्थांवर उपचार करू नका.

हवामान स्थिती (सर्वसाधारणपणे) : दरम्यान फवारणी करू नका वादळी हवामानाची स्थिती किंवा दिवसाच्या उष्णतेच्या वेळी आणि पाऊस जवळ येत असल्यास. स्प्रे धुक्याचा दीर्घकाळ किंवा वारंवार संपर्क टाळण्यासाठी वाऱ्याच्या दिशेने काटेकोरपणे फवारणी करा. ओव्हरलॅपिंग ऍप्लिकेशन्स किंवा शिफारस केलेल्या दर ओलांडून अंडरडोस किंवा ओव्हरडोज करू नका.

माती आणि पाणी (जेथे कधीही लागू असेल) : हे पूर्व उद्□योन्मुख तणनाशक आणि मातीत पूर्व–उद्रव म्हणून लागू करा– कृपया लागू/फवारणी करताना शेजारील शेतातील मातीत वाहून जाणे टाळा. सिंचन किंवा घरगुती कारणासाठी वापरलेले पाणी दूषित करू नका आणि पाण्याचे क्षेत्र उदा. तलाव, खड्डे, सरोबर ड्रेनेज सिस्टिम इ. उत्पादनाच्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावा आणि जलीय वातावरणावर दीर्घकालीन प्रतिकूल परिणाम टाळण्यासाठी या भागात थेट फवारणी किंवा फवारणी होवू देवू नका,

फवारणी साठी पीकाची अवस्था: हे तणनाशक पिकीवर वापरले जात नाही आणि उगवण्यापूर्वी वापर म्हणून जमिनीत वापरले जाते, म्हणून, पीक अवस्था लागू नाही.

मिश्रणासाठी सूचना: उत्पादनाची आवश्यक मात्रा मोजा आणि त्यात थोडेसे पाणी मिसळा. उर्वरित पाणी निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे. पूर्णपणे हलवून घाला आणि फ्लॅट फॅन फ्लड जेट नोजल असलेल्या नॅपसॅक स्प्रेअरद्वारे जास्त

प्रमाणात वापरा.

फवारणी करण्याची पद्धत आणि वेळ : पेरणीनंतर उगवण्यापूर्वी त्याच दिवशी लावा, फवारणी करण्याची वेळ शक्यतो सकाळी किंवा संध्याकाळी करावी.

वारंवारता : फवारणीची कमाल संख्या एक आहे.

फवारणी करण्याची वेळ : तण उगवण्यापूर्वी याचा वापर केला जातो.

खबरदारी: १) अन्नपदार्थ, अन्नपदार्थांचे रिकामी डबे आणि जनावरांच्या चाऱ्यापासून दूर ठेवा. २) तोंड, डोळे आणि त्वचेशी संपर्क होवू देवू नका. ३) फवारणीचे तुषार श्वासाद्वारे आत घेवू नका. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा. ४) फवारणी नंतर दूषित झालेले कपडे आणि शरीराचा भाग स्वच्छ धुवा. ५) फवारणी करताना धुम्रपान, खावू–पीवू वा चबाणे घ्नू नये. ६) फवारणी द्रावण बनविताना संपूर्ण संरक्षित कपडे वापरावेत.

फायदेशीर कीटक जसे की मधमाश्या आणि कीटकांचे नैसर्गिक शत्रू यांचे नुकसान टाळण्यासाठी घ्यावयाची खबरदारी पडे.

विषबाधेची लक्षणे: बेशुद्धी, श्वास घेण्यास त्रास, एक्सोप्थाल्मोस, असामान्य मुद्रा होवू शकते.

प्राथमिक चिकित्सा: १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निगला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़े उतार दें और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/ साफ पानी से लगभग १०–१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। ५. विषाक्तता का कोई भी लक्षण आढळल्यास,ताबडतोब डॉक्टरचा सल्ला घ्या.

रोपविषक नाश: शिफारस केलेल्या डोसमध्ये वापरल्यास हे उत्पादन रोपविषकारक नससते.

विषोपचार : कोणताही खास विषोपचार माहित नाही, लक्षणानुसार उपचार करा.

रिकाम्या डब्यांची विल्हेवाट : १) तणनाशक निर्माता व उपयोगकर्ता ह्यांचे कर्तव्य आहे कि पॅकेजिस किंवा उरलेले द्रावण किंवा फवारणीची उपकरणी धुतलेले पाणी यांची विल्हेवाट पर्यावरण किंवा पाणी प्रदुषित होणार नाही अशा सुरक्षित पद्धतीने करावी. २) पुन: अन्य कामासाठी वापरली जाऊ नयेत म्हणून रिकामी पॅकेजिस उघड्यावर टाकू नयेत. ३) वापरलेली पॅकेजिस मोडून–तोडून वस्तीपासून दूर जागी जमिनीत खोल पुरावीत.

साठवण : १) हे तणनाशकचे असणारी पॅकेजिस इतर माल ठेवण्यासाठी असलेल्या जागा वा खोल्या या पासून दूर जागी वा खोल्यात किंवा तणनाशकचा दर्जा व स्वरुप यांचा विचार करुन कपाटात कडीकुलपात ठेवावीत. २) हे तणनाशकचे साठा करुन ठेवण्याची जागा उत्तम बांधणीची, कोरडी, हवा खेळती राहणारी, भरपूर उजेडाची व पुरेशी मोठी असावी त्यामुळे वाफांनी होणारे प्रदूषण टळेल.

रासायनिक संरचना:

मेटोलाक्लोर स.त.	५०.०० % व/व
सर्फेक्टंट / वेटींग एजंट (डोडिसाईल बेन्जीन सल्फोनिक ॲसिड, केल्शियम सोल्ट)	३.०० %व/व
इमल्सीफाईंग एजेन्ट (कॅस्टर ऑइल पॉलीग्लयकॉल इथर ३६–४०)	६.०० % व/व
झाइलीन (डायमिथाइल बेनेन्झ)	क्यू.एस% व/व
एकूण	१०० % व/व

सावधगिरीचे विधान : १) हे मधमाशांसाठी विषारी आहे. मधमाशा मध गोळा करण्याच्या काळात फवारणी टाळावी. २) माशांसाठी विषारी, जलचर जिवाणू त्यामुळे पाणवठे, मत्स्यपालन किंवा मत्स्यपालना जवळ वापरू नयेत. ३) लेबल और पत्रक पर जो वर्णित है, उससे भिन्न फसल और नाशकजीव पर उपयोग के लिए नहीं ४) पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात आदान को नष्ट करें। ५) गांडुळे आणि इतर फायदेशीर आर्थ्रोपॉड्ससाठी विषारी. **रिकामी डबे पुन्हा वापरणे धोकादायक.**

ವೇಶೋಸ್

ಮೆಟೋಲಾಕ್ಲೋರ್ ೫೦ % ಈಸಿ ನೀಳಹಣಾಶಕ

ಮೆಟೋಲಾಕ್ಲೋರ್ ೫೦% ಈಸಿ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಕಳೆನಾಶಕ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಾರ್ಷಿಕ ಹುಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳಾದ ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಎಸ್ಪಿಪಿ. ಎಲ್ಯೂಸಿನ್ ಇಂಡಿಕಾ. ಡಿಜಿಟೇರಿಯಾ ಎಸ್ಪಿಪಿ. ಪಾನಿಕಮ್ ಎಸ್ಪಿಪಿ. ಸೈಪರಸ್ ಎಸ್ಪಿಪಿ. ಅಮರಾಂಥಸ್ ವಿರಿಡಿಸ್ ಪೊಣಲು ಕಳೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುಪ್ಪುಡುತ್ತದೆ.

ಪರಿಸ್ಕೃತ:

ಬೆಳೆ(ಗಳು)	ಕೀಟದ ಹೆಸರು	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಅಳವು		ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ	ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಕೊನೆ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಸೆಯ ಹುಂದಾಲುವ ಸಮಯಂ (ದಿನಂಗಳು)
		ಸಮ. (ಗ್ರಾಮ್‌ಗಳು)	ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಮಿ.ಲಿ.)		
ಸೋಯಾಬೀನ್	ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಎಸ್ಪಿಪಿ. ಇಲ್ಯುಸಿನ್ ಇಂಡಿಕಾ, ಡಿಜಿಟೇರಿಯಾ ಎಸ್ಪಿಪಿ, ಪಾನಿಕಮ್ ಎಸ್ಪಿಪಿ, ಸೈಪರಸ್ ಎಸ್ಪಿಪಿ, ಅಮರಾಂಥಸ್ ವಿರಿಡಿಸ್	1000	2000	600-750	ಕಳುಪುಮುಸ್ಸಲು ಮೊಳಕೆಯುಮುಂದು

**ತಿರಿಗಿ ಪ್ರವೇಶಾವಿಕಿ ಅ

ವೆಸೋಸ್

ಮೆಟೋಲ್ಯಾಕ್ಲೋರ್ 50% ಇ ಸಿ

ಕಳೆನಾಷಕ

ಮೆಟೋಲ್ಯಾಕ್ಲೋರ್ 50% ಇ ಸಿ ಎನ್ನುವುದು, ಸೋಯಾಬೀನ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಳೆಯಾದ ಇಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಎಸ್ ಪಿ ಪಿ, ಎಲಿಯಿಸಾಯಿನ್ ಇಂಡಿಕಾ, ಡಿಜಿಟಿರಿಯಾ ಎಸ್ ಪಿ ಪಿ, ಪೆನಿಕಮ್ ಎಸ್ ಪಿ ಪಿ, ಸೈಪರಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಪಿ, ಅಮಾರ್ಯಾಂಥಸ್ ವಿರಿಡಿಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಯ್ದ ಗೋಚರ-ಪೂರ್ವ ಕಳೆನಾಷಕವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಶಿಫಾರಸು :

ಬೆಳೆ	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಮಾಣ / ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಸ.ಹ. (ಗ್ರಾಂ)	ಫ್ಲಾರ್ಮುಲೇಷನ್ (ಮಿ.ಲೀ)	ತೆಳುಗೊಳಿಸುವ ನೀರು (ಲೀ.)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಕೊಯಿಗೆ ಕಾಯ ಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)
ಸೋಯಾಬೀನ	ಇಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಎಸ್ ಪಿ ಪಿ, ಡಿಜಿಟಿರಿಯಾ ಎಸ್ ಪಿ, ಎಲಿಯಿಸಾಯಿನ್ ಇಂಡಿಕಾ, ಪೆನಿಕಮ್ ಎಸ್ ಪಿ, ಸೈಪರಸ್ ಎಸ್ ಪಿ, ಅಮಾರ್ಯಾಂಥಸ್ ವಿರಿಡಿಸ್	1000	2000	600-750	ಗೋಚರ-ಪೂರ್ವ

ಮರು ಪ್ರವೇಶದ ಅವಧಿ: ಸಿಂಪಡಿಸಿದ 24 ಘಂಟೆಗಳವರೆಗೂ ಸಿಂಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಡಿ.

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು : ಹೊಲದ ಫಲವಿನ ಮೇಲಿನ ಪರಂಪರಾಗತ ಸಿಂಪಡಣೆಗೆ (ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಂಪಡಣಾ ಯಂತ್ರದ ಬಳಕೆಯಿಂದ) ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಅಲ್ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಂಪಡಣೆಗಾಗಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆತ್ಮತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಸಿಂಪಡಣಾ ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಪಿ ಪಿ ಸಲಕರಣೆ: ಬಕೇಟ್ ಪಂಪ್ ಸಿಂಪಡಣಾ ಯಂತ್ರ, ಸ್ಪ್ರ ಅಪ್ ಸಿಂಪಡಣಾ ಯಂತ್ರ, ಚೆನ್ನುಚೇಲದ ಸಿಂಪಡಣಾ ಯಂತ್ರ, ವೃಲ್ ಬ್ಯಾರೋ ಸಿಂಪಡಣಾ ಯಂತ್ರ, ಒತ್ತಡಯುಕ್ತ ಚೆನ್ನುಚೇಲ ಸಿಂಪಡಣಾ ಯಂತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಈ ಸಿಂಪಡಿಕೆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಫ್ಲಡ್ ಜೆಟ್ ಅಥವಾ ಚಪ್ಪಟೆ ಫ್ಯಾನ್ ಮೂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಿರಿ. ಭೂಮಿಯ ಸಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಿಂಪಡಣಾ ಮೂತಿಯ ಎತ್ತರವನ್ನು ಏಕ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಕೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಏಕಸಮಾನವಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ.

ಬಳಕೆಯ ಇತಿ-ಮಿತಿಗಳು : ಈ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆ, ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಹಾಲಿನ ಮೇಲೆ, ಸಲಕರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಮಾಡ೬೬ಬೇಡಿ. ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಮೇಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪಶುಗಳ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಕೂಡದು.

ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ): ಗಾಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಿನದ ಅತೀ ತಾಪದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. ಮಳೆ ಬರುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದ್ದರೂ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. ಅಧಿಕ ಆವರ್ಧಿಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಪುನಃ ಸಿಂಪಡಣೆ ತುಂಬೆರು ಹನಿಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ, ಸಿಂಪಡಣೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರಿ.

ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಜಲ (ಆಕ್ವಾಟಿಸಸವ ಸಂಧಗ್ಧರ್ಚಲ್): ಇದೊಂದು ಗೋಚರ-ಪೂರ್ವ ಕಳೆನಾಷಕವಾಗಿದ್ದು ಗೋಚರ-ಪೂರ್ವ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಅಳವಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಾಗ/ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಇದು ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನಿನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿರಿ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ನೀರಾವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಪೋಗಿಗುವ ನೀರು, ಹಳ್ಳ-ಕೊಳ್ಳ, ಕೆರೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆರಂಡಿ ವೃಷಗಳ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಕುಲಷಿತಗೊಳ್ಳದಂತೆಯೂ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾದ ಸಿಂಪಡಿಕೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಡಣಾ ಸೋಂಕೆಯಿಂದ ಜಲ ಪರಿಸರದ ಮೇಲಾಗುವ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಮೆಟೋಲ್ಯಾಕ್ಲೋರ್ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶ	50.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಸರಫಕ್ಟಂಟ್/ ಮೆಟೆಗ ಎಜೆಂಟ್ (ಡೊಡೆಸಿಲ್ ಬೆಂಜಿನ ಸಾಲ್ಫೊನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಕ್ಯಾಲಸಿಯಾಸ ಸಾಲ್ಟ್)	3.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಇಮಲಸಿಫಾಇಂಗ್ ಎಜೆಂಟ್ (ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೊಯಿಲ್ ಪಲ್ಲಿಇಕಲ ಇಥರ ೩೬-೪೦)	೬.೦೦% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಜೈಲಿನ (ಡೈಮಿಥಾಇಲ ವೆಜ್ಜಿನ)	ಕಿಟಿ.ಎಸ. % ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಮೊಟ	೨೦೦% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತು: 1.ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಜೀನಾ ನೋಣಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಜೀನಾ ನೋಣಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಅಳವ ಡಿಸಬೇಕಿ ರುವುದರಿಂದ, ಫಸಲಿನ ಹಂತದ ಪ್ರತಿಯೆಯ ಉತ್ತೆತ್ತಿ ಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ಬೆರೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಲಹೆಗಳು: ಚಟ್ಟಿಕೆ ಫ್ಲಾನ್ ಫ್ಲಡ್ ಜೆಟ್ ಮೂತಿಯ ಬೆನ್ನು ಚೀಲದ ಸಿಂಪಡಣಾ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ, ಅವಶ್ಯಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಆಳದು, ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಉಳಿದ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಸೇರುತ್ತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕದಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ಅಳವಡಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಸಮಯ: ಬಿತ್ತಿದ ದಿನವೇ, ಗೋಚರ-ಪೂರ್ವ ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗಿ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಇದರ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಬೆಳೆಗಿನ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ.

ಅರ್ಜನೆ: ಗರಿಷ್ಟ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.

ಅಳವಡಿಕೆಯ ಸಮಯ: ಇದನ್ನು ಕಳೆಯು ಗೋಚರವಾಗುವ ಪೂರ್ವದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.

ಮಂಂಜಾಗ್ರತೆಗಳು: 1. ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಆಹಾರದ ಹಾಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಪರಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಶುಗಳ ಮೇಲಿನದ ದೂರವಿರಿಸಿ. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ. 3.ಸಿಂಪಡಣೆಯಂಪಗಳನ್ನು ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಿ. 4.ಸಿಂಪಡಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಬರೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 5. ಸಿಂಪರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೊಗೆಬತ್ತಿ ಸೇದದಿರಿ, ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನದೇಯಿರಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಹಾಗೂ ಜಗಿಯಬೇಡಿ. 6. ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿರಿ.

ಚೇಸು ನೊಣ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಸೈಗಿನಕ ಬೈಗಳಿಂದಲ್ ಉಪಕಾರಿ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯೊದಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿರಿ:

ವಿಷಪ್ರಾಶನದ ಸಂಕೇತಗಳು: ಮಂಪರು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಗಳ ಮುಂಚಾಚಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಷಾಳತೆಕಾಣಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: 1. ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಂಬಲಿನ ಹಿಂಬದಿಯನ್ನು ಕೆರೆದು ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೆಪಿಸಿರಿ. ವಾಂತಿಯ ದ್ರವ ತಿಳಗೊಳ್ಳುವ ವರೆಗೆ ಹಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ. ರೋಗಿಯಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೆಪಬೇಡಿ. 2. ಬಟ್ಟೆಅಥವಾ ಚರ್ಮ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಬರೆಗಳು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೇರಳ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಬೂನು ಹಾಕಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 3. ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಂಲಗೊಂಡಲ್ಲಿ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ತನಕ ಸ್ಯಾಲೈನ್/ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರನ್ನು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ರಾಚಿರಿ. 4. ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಇದಲ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಯಿರಿ. 5. ವಿಷಪ್ರಾಶನದ ಯಾವುದೇ ಸಂಕೇತಕಂಡರೂ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ.

ಸ್ವಸ್ಥಿಷತ್ವ : ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದಂತೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದರೇ, ಈ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸ್ವಸ್ಥಿಷತ್ವವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪ್ರತ್ಯೌಷಧದಾಕುರುತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಾನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ.

ಹಾಲಿ ಡಬ್ಬಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ: 1. ಹಾಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು, ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ತೊಳೆ ನೀರನ್ನು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲಜೀವಜಾಣಿಯಗಾದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು, ತಯಾರಕರು, ಸೂತ್ರಿಕರಿಸುವವರು ಹಾಗೂ ಬಳಸುವವರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. 2.ಹಾಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳ ಮರು ಉಪಯೋಗ ತಡಗಿಟ್ಟಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಗಯೇ ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಬನವಶಿಗೆ ದೂರವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಗಿಯಬೇಕು.

ಶೇಖರಣೆ : 1 ಕೆಳಾಶಕಗಳಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡುವ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನುಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲವೆ ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲಮಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿರಿ. 2. ಕೆಳಾಶಕವಿರುವ ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಶುಷ್ಕ ವಾತಾವರಣವೂ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಳೆಗೂ ಇರಬೇಕು. ಹಚಿಯೊಂದಾಗುವ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಮೆಟೋಲ್ಯಾಕ್ಲೋರ್ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶ	50.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಸರಫಕ್ಟಂಟ್/ ಮೆಟೆಗ ಎಜೆಂಟ್ (ಡೊಡೆಸಾಲ್ ಬೆಂಯಿನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಕ್ಯಾಲಸಿಯಾಸ ಸಾಲ್ಟ್)	3.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಇಮಲಿಫಾಯಿಂಗ್ ಎಜೆಂಟ್ (ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಯಲ್ ಪಾಲಿಗ್ಲೈಕೋಲ್ ಇಥರ 36-40)	6.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಗ್ಲಾಯಲೀನ್*(ಡಾಯಾಮಿಥ್ಯಾಲ್ ಬೆಂಯೀನ)	ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಒಟ್ಟು	100% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತು: 1.ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಜೀನಾ ನೋಣಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಜೀನಾ ನೋಣಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಅಳವ ಡಿಸಬೇಕಿ ರುವುದರಿಂದ, ಫಸಲಿನ ಹಂತದ ಪ್ರತಿಯೆಯ ಉತ್ತೆತ್ತಿ ಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ಬೆರೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಲಹೆಗಳು: ಚಟ್ಟಿಕೆ ಫ್ಲಾನ್ ಫ್ಲಡ್ ಜೆಟ್ ಮೂತಿಯ ಬೆನ್ನು ಚೀಲದ ಸಿಂಪಡಣಾ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ, ಅವಶ್ಯಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಆಳದು, ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಉಳಿದ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಸೇರುತ್ತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕದಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ಅಳವಡಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಸಮಯ: ಬಿತ್ತಿದ ದಿನವೇ, ಗೋಚರ-ಪೂರ್ವ ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗಿ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಇದರ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ.

ಅರ್ಜನೆ: ಗರಿಷ್ಟ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.

ಅಳವಡಿಕೆಯ ಸಮಯ: ಇದನ್ನು ಕಳೆಯು ಗೋಚರವಾಗುವ ಪೂರ್ವದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.

ಮಂಂಜಾಗ್ರತೆಗಳು: 1. ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಆಹಾರದ ಹಾಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಪರಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಶುಗಳ ಮೇಲಿನದ ದೂರವಿರಿಸಿ. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ. 3.ಸಿಂಪಡಣೆಯಂಪಗಳನ್ನು ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಿ. 4.ಸಿಂಪಡಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಬರೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 5. ಸಿಂಪರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೊಗೆಬತ್ತಿ ಸೇದದಿರಿ, ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನದೇಯಿರಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಹಾಗೂ ಜಗಿಯಬೇಡಿ. 6. ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿರಿ.

ಚೇಸು ನೊಣ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಸೈಗಿನಕ ಬೈಗಳಿಂದಲ್ ಉಪಕಾರಿ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯೊದಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿರಿ:

ವಿಷಪ್ರಾಶನದ ಸಂಕೇತಗಳು: ಮಂಪರು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಗಳ ಮುಂಚಾಚಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಷಾಳತೆಕಾಣಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: 1. ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ, ನಂಬಲಿನ ಹಿಂಬದಿಯನ್ನು ಕೆರೆದು ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೆಪಿಸಿರಿ. ವಾಂತಿಯ ದ್ರವ ತಿಳಗೊಳ್ಳುವ ವರೆಗೆ ಹಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ. ರೋಗಿಯಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೆಪಬೇಡಿ. 2. ಬಟ್ಟೆಅಥವಾ ಚರ್ಮ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಬರೆಗಳು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೇರಳ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಬೂನು ಹಾಕಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 3. ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಂಲಗೊಂಡಲ್ಲಿ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ತನಕ ಸ್ಯಾಲೈನ್/ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರನ್ನು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ರಾಚಿರಿ. 4. ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಇದಲ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಯಿರಿ. 5. ವಿಷಪ್ರಾಶನದ ಯಾವುದೇ ಸಂಕೇತಕಂಡರೂ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ.

ಸ್ವಸ್ಥಿಷತ್ವ : ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದಂತೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದರೇ, ಈ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸ್ವಸ್ಥಿಷತ್ವವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪ್ರತ್ಯೌಷಧದಾಕುರುತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಾನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ.

ಹಾಲಿ ಡಬ್ಬಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ: 1. ಹಾಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು, ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ತೊಳೆ ನೀರನ್ನು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲಜೀವಜಾಣಿಯಗಾದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು, ತಯಾರಕರು, ಸೂತ್ರಿಕರಿಸುವವರು ಹಾಗೂ ಬಳಸುವವರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. 2.ಹಾಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳ ಮರು ಉಪಯೋಗ ತಡಗಿಟ್ಟಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಗಯೇ ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಬನವಶಿಗೆ ದೂರವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಗಿಯಬೇಕು.

ಶೇಖರಣೆ : 1 ಕೆಳಾಶಕವಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡುವ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನುಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲವೆ ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲಮಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿರಿ. 2. ಕೆಳಾಶಕವಿರುವ ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಶುಷ್ಕ ವಾತಾವರಣವೂ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಳೆಗೂ ಇರಬೇಕು. ಹಚಿಯೊಂದಾಗುವ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಮೆಟೋಲ್ಯಾಕ್ಲೋರ್ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶ	50.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಸರಫಕ್ಟಂಟ್/ ಮೆಟೆಗ ಎಜೆಂಟ್ (ಡೊಡೆಸ