VIPUL BOOSTER

Triacontanol EW 0.1% (1000 ppm min.)

(Selective Plant Growth Regulator)

Triacontanol 0.1% EW is a plant growth regulator which is used to increase the yield of crop like Cotton, Chillies, Tomato, Rice & Groundnut.

Chemical Composition:	**Ingredient %w/w**
Demineralised Aqua other ingredient	Q.S. w/w
Esters of Benzoic acid Preservatives	0.10w/w
Ethoxylated Esters of Fatty acids Emulsifiers	0.50 w/w
Triacontanol active ingredient	0.1 w/w
Total	100.00%w/w

Recommendation:

Crop (s)	Common Name of Pest	Dosage/Ha		Dilution in water Liter	Crop Stage	Re-entry Period	Pre Har-vest	Frequ-ency
		Al gm	Formu-lation liter					
Cotton	To increase the yield Three sprays at 45,65 and 85 days after planting	0.25	0.25	400-500	Foliar appli-cation at vegetative growth stage of crop.	After 24 hours	Not appli-cable	3sprays at the interval of 20 days
Tomato Chillies	To increase the yield Three sprays at 25,45 and 65 days after Transplanting	0.25	0.25	400-500	-	-	-	-
Rice	To increase the yield Three sprays at 25,45 and 65 days after Transplanting	0.25	0.25	400-500	-	-	-	-
Grou-ndnut	To increase the yield Three sprays at 25,45 and 65 days after planting	0.25	0.25	400-500	-	-	-	-

Note : Good Practices relating to pesticide application techniques:

Direction of Use: Measure out requisite quantity of the plant growth regulator and mix it well with small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crop with suitable sprayer.

Weather Condition(in general): Do not spray during rainy, windy and hot sunny period

Soil & Water(where ever applicable): This Herbicide is for foliar application and has no adverse effect when used at recommended dose . Avoid using near aquaculture.

Crop Stage for application: Foliar application at vegetative growth stage of crop.

Application Technique: Foliar Application using high volume knap sack sprayer & Low volume motorised knap sack sprayer with hollow cone nozzle.

Equipment Type: High volume knap sack sprayer & Low volume motorised knap sack sprayerwith flat fan nozzle

NozzleType: Flat fan nozzle.

Dosage: 0.25 Lit. formulation /ha. (0.25 ga.i./ha.) in 400-500lit. of water

Instruction for Mixing: Shake the bottle before use measure out requisite quantity of the herbicide and mix it well with small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crop with suitable sprayer.

Re-entry Period: After 24 hours.

Manner and Time of Application: Crop 1st Spray 2nd Spray 3rd Spray

Cotton: 45 day after sowing 65 days after sowing 85 days after sowing

Tomato, Chillies: 25 day after transplanting 45 days after transplanting 65 days after transplanting

Rice: 25 day after transplanting 45 days after transplanting 65 days after transplanting

Groundnut : 25 day after sowing 45 days after sowing 65 days after sowing.

Application Timing: No restriction. Avoid application under high wind, before rain.

Frequency: 3 sprays at the interval of 20 days

Stages during which pesticides should not be applied on any crop: Follow the above mentioned instructions as in time of application

Precautions to be taken to avoid harm to the beneficial insects like honey bees and natural enemies of pests :

Symptoms Of Poisoning: Eye and skin irritation, nausea and headache may occur.

First Aid: If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. **If inhaled:** Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician. **In case of skin contact:** Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. **In case of eye contact**: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists. Consult eye specialist.

Antidote: There is no known specific antidote. Treat symptomatically.

Phytotoxity: Non-phytotoxic when used as recommended dosage.

Storage Conditions:1. The package containing insecticide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of or shall be kept in separate almirahs under lock and key depend upon the quantity and nature of the product. 2. Away from reach of children, food stuffs, animal feed and other edible articles in a cool and dry place. 3. The store rooms should be well built, dry, well-lit and ventilated and of sufficient dimensions.

Safety Precaution:1. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 2. Wash affected areas thoroughly before eating, drinking or smoking. 3. Avoid contamination of environment and water.

Cautionary Statement:1.not to be used on crops other than mentioned on this label/leaflets. 2. destroy the container after use as directed on leaflet. dangerous to use the empty container.

Disposal of used containers, washing from equipment and surplus material :1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of insecticides and operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

विपूल बूस्टर

ट्रायकोंटानॉल ०.१% ई.डब्ल्यू भा/भा.(१०००पि.पि.एम.) न्यु.

चयनात्मक पौध विकास नियन्त्रक)

ट्रायकोंटानॉल ०.१% ई.डब्ल्यू एक असरदार पौध वृद्धि नियंत्रक जो कपास, धान, टमाटर, मिर्च और मूंगफल की फसलों की पैदावर बढाने के लिए उपयुक्त होता है।

रासायनिक संरचना:	**घटक %भार/भार**
अखनिजी जल अन्य घटक	पर्याप्त मात्रा भार/भार
बेन्जोईक एसिड के इस्टर्स प्रिजरटिव्स	०.१० भार/भार
ईथोक्सीलेटिड ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स इमल्सीफायर	०.५० भार/भार
ट्रायकोंटानॉल सक्रिय घटक	०.१ भार/भार
योग	१००.००%भार/भार

सिफारिशें:

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा लीटर	फसल अवस्था	पुन: काल	पूर्व फसल	आवृति
		स.तत्व ग्राम	संरचना लीटर					
कपास	पैदावर बढाने के लिए रोपन के बाद ४५,६५ और ८५ दिनों में तीन स्प्रे	०.२५	०.२५	४००-५००	वनस्त की वानस्पतिक वृद्धि अवस्था में पर्णिय छिड़काव	२४ घंटो के बाद	लागू नहीं है	३ आवेदन २० दिन के अंतराल पर
टमाटर, मिर्च	पैदावर बढाने के लिए रोपन के बाद २५,४५ और ६५ दिनों में तीन स्प्रे	०.२५	०.२५	४००-५००	-	-	-	-
धान	पैदावर बढाने के लिए रोपन के बाद २५,४५ और ६५ दिनों में तीन स्प्रे	०.२५	०.२५	४००-५००	-	-	-	-
मुँगफली	पैदावर बढाने के लिए रोपन के बाद २५,४५ और ६५दिनों में तीन स्प्रे	०.२५	०.२५	४००-५००	-	-	-	-

सुचना: कीटनाशक अनुप्रयोग तकनीकों से संबंधित अच्छे अभ्यास:

उपयोग के लिए निर्देश :पौध वृद्धि नियंत्रक की अनुमोदित मात्रा लीजिये ओर थोडे पानी के साथ अच्छी तरह से मिलाइए। अनुमोदित मात्रा का बाकी पानी भी अच्छी तरह हिला कर मिला लीजिये, तथा किसी भी योग्य स्प्रेयर से पूरी फसल मे सार प्रणीय छिड़काव कीजिये।

मौसम की स्थिति : बरसात, हवा और धूप की अवधि के दौरान स्प्रे न करें।

मिट्टी और पानी: यह हर्बीसाइड पर्ण आवेदन के लिए है और अनूशंसित खुराक पर उपयोग किए जाने पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। जलीय कृषि के पास उपयोग करने से बचें।

फसल अवस्था : फसल की वानस्पतिक वृद्धि अवस्था में पर्णिय छिड़काव

अवेदन तकनीक : अधिक मात्रा वाले नैपसैक स्प्रेयर, कम मात्रा वाले मोटर चलित स्प्रेयर फ्लेट फैन नोजल के साथ।

उपकरण प्रकार: अधिक मात्रा वाले नैपसैक स्प्रेयर, कम मात्रा वाले मोटर चलित स्प्रेयर फ्लेट फैन नोजल के साथ।

नोजल प्रकार: फ्लेट फैन नोजल

खुराक: खुराक ०.२५ लीटर/हैक्टर (०.२५ ग्राम स.त/हैक्टर) ४००–५०० लीटर पानी में।

मिश्रण के लिए निर्देश : उपयोग करने से पहले बोतल को हिलाएं। हर्बीसाइड की आवश्यक मात्रा को मापें और इसे कम मात्रा में पानी में मिलाएं। उपयुक्त स्प्रेयर के साथ फसल की कुल कवरेज के लिए पूरी तरह से आंदोलन के साथ निर्दिष्ट पानी की शेष मात्रा जोड़ें।

पुन: प्रवेश अवधि: २४ घंटो के बाद।

आवेदन का समय और समय : फसल पहला छिड़काव दूसरा छिड़काव तीसरा छिड़काव

कपास : बुवाई के ४५ दिन बाद बुवाई के ६५ दिन बाद बुवाई के ८५ दिन बाद

धान : पौध रोपण के २५ दिन बाद पौध रोपण के ४५ दिन बाद पौध रोपण के ६५ दिन बाद

टमाटर, मिर्च: पौध रोपण के २५ दिन बाद पौध रोपण के ४५ दिन बाद पौध रोपण के ६५ दिन बाद

मूंगफली : बुवाई के २५ दिन बाद बुवाई के ४५ दिन बाद बुवाई के ६५ दिन बाद.

आवेदन का समय : निर्धारित नही है। तेज हवा व बारिश होने की संभावना हो तो छिड़काव नहीं करना चाहिए।

अधिक से अधिक अंक सहित आवृति : ३ आवेदन २० दिन के अंतराल पर।

चरण जिसके दौरान किसी भी फसल पर कीटनाशक नहीं लगाया जाना चाहिए: आवेदन के समय के उपर्युक्त निर्देशों का पालन करें।

शहद की मक्खियों और कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं जैसे लाभकारी कीडों से नुकसान से बचाने के लिए बरती जाने वाली सावधानियां

विष के लक्षण : आँखे और त्वचा पर जलन, मितली, तथा सिरदर्द हो सकता है।

पादक आविषालुता: सुझायी गये मात्रा में कोई पौध विषाक्तता नहीं है।

प्राथमिक उपचार: अगर मुँह से निगल लिया है: यदि व्यक्ति सचेत और सतर्क है, तो पानी से मुंह कुल्ला कराये और पीने के लिए १ या २ गिलास पानी दें । एक बेहोश व्यक्ति का मुंह से कुछ भी कभी नहीं दे। डॉक्टर को बुलाएं। बिना उपस्थित चिकित्सक की सलाह उल्टी न कराये । यदि साँस में लिये जाने पर : रोगी को ताजी हवा में ले जाएं और शरीर के तापमान का ख्याल रखें । यदि रोगी साँस नहीं ले रहा है या कठिनाई से साँस ले रहा है, तो कृत्रिम श्वसन दें । एक चिकित्सक से परामर्श करें । त्वचा के संपर्क के मामले में: शरीर के प्रभावित हिस्से को अच्छी तरह से साबुन से धोएं और बालों और नाखूनों सहित पानी का खूब इस्तेमाल करें । यदि दर्द, लालिमा या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से परामर्श करें । सभी दूषित कपडों को अलग किया जाना चाहिए और उपयोग से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए । आंखों के संपर्क के मामले में: कम से कम १५ मिनट के लिए बहुत सारे पानी से धीरे–धीरे धोए । यदि दर्द, जलन, लालिमा या फोटोफोबिया बनी रहती है तो नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लें ।

विष नाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है, लक्षणानुसार उपचार करें।

संग्रहण की शर्तें : १. उत्पादित दवाओं को मूल डिब्बों में ही रख कर एक अलग स्थान या कमरे या ताले चाबी वाली अलमारी में बंद रखें । २. खाने की वस्तुओं से, बच्चों की पहुँच से, पशु–खादयों से दूर ठंडी व सुखी जगह पर भंडारण करें। ३. भंडारण का स्थान साफ सुथरा, पर्याप्त रोशनी पूर्ण तथा हवादार हो।

सुरक्षा के लिए सावधानियाँ : १. मुँह में जाने, त्वचा और आंखों के सम्पर्क से बचायें। २. खाने, पीने या धुम्रपान से पहले प्रभावित क्षेत्रों को अच्छी तरह से धो लें। ३. पर्यावरण और पौने के पानी को दूषित होने से बचाएँ।

सावधानिय कथन: १. लेबल और पर्चो पर जो अभिदत है, उससे भिन्न अन्य प्रयोजन मे उपयोग के लिए नहीं । २. पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात आद्यायन को नष्ट करें खाली डिब्बो का पुन: उपयोग खतरनाक है।

कीटनाशक के प्रयोग किये गए डिब्बों,बचे हुए कीटनाशकों तथा पात्रों के धोवन का निपटारा: १. यह कीटनाशक निर्माता व उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि वह डिब्बों,पैकेजस या बचे हुए कीटनाशक तथा धोवन का निपटारा सुरक्षित ढंग से करें जिससे वातावरण या पानी प्रदूषित न हो। २. उपयोग किये गये डिब्बों /पैकेजस को बाहर न फेंके जिससे उनका दुबारा प्रयोग न हो। ३.उपयोग किए गए डिब्बों /पैकेजस को तोडकर आबादी से दूर जमीन में गाड दें।

विपूल बूस्टर

ट्रायकॉन्टानॉल ०.१% ई डब्ल्यू (१००० पीपीएम न्यू.)

(निवडक रोप वृद्धि नियंत्रक)

ट्रायकॉन्टानॉल ०.१% ई डब्ल्यू एक परिणामकारक रोप वृद्धि नियंत्रक जे कपाशी, मिरची, टोमॅटो , भात आणि भूंइमुगाच्या पीकाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी उपयुक्त असते.

रासायनिक संरचना:	**तत्व % व/व**
डीमिनरलाइज्ड ॲक्वा इतर तत्व	क्यू. एस. व/व
बेन्झोईक ॲसिडचे इस्टर्स प्रिझरवेटिव्स	०.१० व/व
इमल्सिफायर्स इथॉक्सिलेटेड इस्टर्स ऑफ फॅटी ऍसिड्स	०.५० व/व
ट्रायकॉन्टानॉल सक्रिय तत्व	०.१ व/व
एकूण	१००.००% व/व

शिफारस:

पीक	कीटकाचे सामान्य नाव	दर हेक्टरी प्रमाण		कल्पासाठी पाणी (लीटर)	पीकाचा टप्पा	पुन: प्रवेश काल वधी	कापणी पूर्व	वारं वारता
		स.त. (ग्रॅम/%)	द्रावण (लीटर)					
कपाशी	उत्पादन वाढविण्यासाठी रोपणी नंतर ४५,६५ आणि ८५ दिवसात तीन फवारण्या.	०.२५	०.२५	४००-५००	पीकाच्या वनस्पति वृद्धि अवस्थेत पर्णिय	२४ तासा नंतर	लागू नाही	३ फवारण्या २० दिवसांच्या अंतराने
टमॅटो, मरच्या	उत्पादन वाढविण्यासाठी रोपणी नंतर २५,४५ आणि ६५ दिवसात तीन फवारण्या.	०.२५	०.२५	४००-५००	-	-	-	-
भात	उत्पादन वाढविण्यासाठी रोपणी नंतर २५,४५ आणि ६५ दिवसात तीन फवारण्या.	०.२५	०.२५	४००-५००	-	-	-	-
भूंइमुग	उत्पादन वाढविण्यासाठी रोपणी नंतर २५,४५ आणि ६५ दिवसात तीन फवारण्या.	०.२५	०.२५	४००-५००	-	-	-	-

टीप : कीटकनाशक वापरण्याच्या तंत्राशी संबंधित चांगल्या पद्धती.

वापरासाठी निर्देश: रोप वृद्धि नियंत्रक आवश्यक प्रमाणात मोजा आणि थोडाच्या प्रमाणात चांगळे मिसळा. योग्य फवारणी यंत्राच्या साहय्याने पिकाच्या संपूर्ण कव्हरेज साठी करून फवारणीसह निर्दिष्ट केल्यानुसार उर्वरित पाणी घाला.

हवामानाची स्थिती (सर्वसाधारणपणे): पावसाळी, वादळी आणि कडक उन्हात फवारणी करू नका.

माती आणि पाणी (जेथे लागू असेल) : हे तणनाशक पर्णिय फवारणीसाठी आहे आणि शिफारस केलेल्या प्रमाणाध्ये त्याचा वापर केल्यावर कोणताही विपरीत परिणाम होत नाही. जवळील मत्स्यशेतीत वापरणे टाळा.

फवारणीसाठी पीक अवस्था: वनस्पती वृद्धिच्या वेळी पर्णिय फवारणी पिकाची अवस्था.

फवारणी टेक्निक: हाय वॉल्यूम नॅपसॅक स्प्रेयर आणि लो वॉल्यूम मोटराइज्ड नॅपसॅक स्प्रेयर सह हॉलो कोन नोझल.

उपकरण प्रकार: हाय वॉल्यूम नॅपसॅक स्प्रेयर आणि लो वॉल्यूम फ्लॅट फॅन नोझल सह मोटराइज्ड नॅपसॅक स्प्रेयर.

नोजल प्रकार: फ्लॅट–फॅन किंवा फ्लड जेड नोजल.

प्रमाण: ०.२५ लि. फॉर्म्यूलेशन/ हेक्ट. (०.२५ ग्रॅ.आई/ हेक्ट.) ४००–५०० लिटर पाण्यात.

मिश्रणासाठी निर्देश: वापरण्या पूर्वी बाटली हलवा. तरनाशकाचे पुरेसे प्रमाण मोजा आणि त्याला कमी प्रमाणात पाण्यात मिसळा. योग्य फवारणी यंत्राने पिकाच्या संपूर्ण कव्हरेजसाठी कसून एजीटेशन निर्दिष्ट केल्यानुसार उर्वरित पाणी घाला.

पुन: प्रवेश कालावधी: २४ तासांनंतर

फवारणी करण्याची पद्धत आणि वेळ: पहिली फवारणी, दुसरी फवारणी तिसरी फवारणी.

कापूस: पेरणीनंतर ४५ दिवसांनी ६५ दिवसांनी पेरणी ८५ दिवसांनी पेरणी.

टोमॅटो,मिरची: २५ दिवसांनी लावणीनंतर ४५ दिवसांनी लावणी नंतर ६५ दिवसांनी पुनर्लावणी.

भात: २५ दिवसांनी लावणीनंतर ४५ दिवसांनी लावणी नंतर ६५ दिवसांनी पुनर्लावणी.

भूंइमुग : पेरणीनंतर २५ दिवसांनी ४५ दिवसांनी पेरणी ६५ दिवसांनी पेरणी.

फवारणीची वेळ: कोणतेही बंधन नाही. सोसाटयाचा वारा असेल तेव्हा फवारणी टाळा, वारा पावसापूर्वी.

वारंवारता: २० दिवसांच्या अंतराने ३ फवारण्या.

कोणत्याही पिकावर कीटकनाशके फवारू नयेत अशी अवस्था: फवारणी करताना वरील सुचनांचे पालन करा.

फायदेशीर कीटक जसे की मधमाश्या आणि कीटकांचे नैसर्गिक शत्रू यांचे नुकसान टाळण्यासाठी ध्यावयाची खबरदारी.

विषबाधेची लक्षण: डोळे व त्वचेस जळजळ, मळमळ,डोकेदुखी होवू शकते

प्रथमोपचार: जर गिळले गेल्यास: व्यक्ती शुध्दीवर असेल तर,पाण्याने तोंड स्वच्छ धुवा आणि १ किंवा २ ग्लास पाणी पिण्यास दया.व्यक्ती जर बेशुध्द असेल तर तोंडाद्वारे काहीही देवू नये. डॉक्टरला बोलवा.जोपर्यंत उपस्थित चिकित्सका द्वारे उल्टी करण्यास सांगितले जात नाही तो पर्यंत उल्टी करू नये. जर श्वासाद्वारे आत गेल्यास: रूग्णास मोकळ्या हवेत आणा आणि शरीर तापमानावर लक्ष ठेवा. जर रूग्ण श्वास घेत नसेल वा श्वास घेण्यास त्रास होत असेल तर कृत्रिम श्वसन द्या, शक्यतो तोंडाने तोंडस श्वासोच्छ्वास दया. चिकित्सकाचा सल्ला घ्या . जर त्वचेशी संपर्क आल्यास: शरीराशी संपर्क आलेला भाग साबण व भरपूर पाण्याने धुवा, यासह केस व नखे देखील धुवा, जर लालसरपणा किंवा जळजळ कायम राहील्यास डॉक्टरचा सल्ला घ्या सर्व दूषित झालेले कपडे वेगवेगळे आणि यापर करण्यापूर्वी व्यवस्थित पणे साबण व पाण्याने वेगळे धुतले पाहिजेत. जर डोळयांशी संपर्क झाल्यास: तर डोळे भरपूर पाण्याने जवळ–जवळ १५ मिनिटे स्वच्छ धुवा, जर वेदना, जळजळ सहन होत नसेल लालसर पणा व प्रकाश अतिवेदन होत असेल तर नेत्र चिकित्सकाचा सल्ला घ्या

विषोपचार : कोणताही खास विषोपचार माहित नाही. लक्षणानुसार उपचार करा

पानांना विषारीपणा: शिफारस केलेल्या मात्रेत वापरलेअसता रोपांच्या पानांना विषारी नाही

साठवणीची स्थिती: १) तणनाशक तेवलेल्या पॅकेजीसना वेगळ्या खोलीत वा त्या खोलीत वा जागेत जिथे इतर वस्तू तेवल्या जातात त्या पासून दूर ठेवले पाहिजे वा वेगळ्या कपाटात कुलूप चावीत तणनाशकाच प्रमाण व प्रकाराच्या हिशोबाने ठेवावे. २) मुलां पासून दूर, अन्नपदार्थ, जनवरांचा चारा आणि इतर खाद्य पदार्थ थंड आणि कारडया जागी ठेवा. ३) सातवणीची खोली भक्कम बांधलेली,कोरडी,भरपूर प्रकाश असलेली आणि हवेशीर आणि पूरशी लांबरुंद असावी

खबरदारी: त्वचा, डोळे आणि तोंडाशी संपर्क टाळा. संरक्षित कपडे जसे ॲप्रन, हातमोजे, चेहऱ्याचा मुखवटा आणि बूट. खाण्या,पिण्या व धुम्रपान करण्यापूर्वी संक्षित आलेला भाग स्वच्छ धुवा. पर्यावरण किंवा पाणी प्रदुषत हाण्याचे टाळा.

सावधगिरीचे विधान: १) या लेबल /लिफलेट वर नमूद केल्या व्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापरू नये. २) लिफलेट वरील निर्देशानुसार वापरा नंतर डबे नष्ट करा. रिकाम्या डब्यांचा पुर्नवापर धोकादायक आहे.

वापरलेल्या डब्यांची विल्हेवाट, उपकरणे धुवणाचे पाणी आणि अतिरिक्त साहित्य. १) निर्माता, उत्पादन बनविणाऱ्याचे आणि हाताळणाऱ्यांचे कर्तव्य आहे की पॅकेजिस किंवा उरलेले द्रावण किंवा मशीनीतील धाण/पाणी यांची विल्हेवाट पर्यावरण किंवा पाणी प्रदुषित होणार नाही अशा सुरक्षित पद्धतीने लावावी. २) पुन्हा कामासाठी वापरली जाऊ नयेत म्हणून रिकामी पॅकेजिस उघडयावर टाकू नयेत. ३) रिकामी पॅकेजिस मोडून–तोडून वस्तीपासून दूर जागी जमिनीत खोल पुरावीत.

ವಿಪುಲ ಬೂಸ್ಟರ್

ಟ್ರಾಯಕಾಂಟಾನೊಲ್ ೦.೧% ಇ ಡಬ್ಲ್ಯು (೧೦೦೦ ಪಿಪಿಎಮ್ ಕನಿಸ)

(ಆಯ್ದ ರೋಪ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕ)

ಟ್ರಾಯಕಾಂಟಾನೊಲ್ ೦.೧% ಇಡಬ್ಲ್ಯು ಒಂದು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಪ್ರಚೋದಕ ಇದು ಹತ್ತಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗಳ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:	**ಘಟಕ %ಭಾರ/ಭಾರ**
ಡಿಮಿನರಲೈಸ್ಡ್ ಅಕ್ವಾ ಅನ್ಯ ಅಂಶ	ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರ/ಭಾರ
ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೆಟಿವ್ಸ್	೦.೧೦ ಭಾರ/ಭಾರ
ಇಥಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯರ್ಸ್	೦.೫೦ ಭಾರ/ಭಾರ
ಟ್ರಾಯಕಾಂಟಾನೊಲ್ ಸಕ್ರಿಯ ಅಂಶ	೦.೧ ಭಾರ/ಭಾರ
ಒಟ್ಟು	೧೦೦.೦೦% ಭಾರ/ಭಾರ

ಶಿಫಾರಸು :

ಬೆಳೆ	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಹೆಕ್ಟರ್ ಠಿಕ ಮಾತ್ರಾ		ಕಂಪಿಗೆ ಬಳಸುವ ನೀರಿನ ಮಾತ್ರಾ	ಬೆಳೆ ಹಂತ	ಪುನಃ ಪ್ರವೇಶ ಸಮಯ ಗಂಟೆ	ಪೂರ್ವ-ಕಂಪಿಗೆ	ಸಾರವತ್ತಾ
		ಸ.ತ. ಗ್ರಾಮ	ಶ್ರಾವಣ ಲಿ.					
ಕಪಾಸಿ	ಉಳಿಸಿ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ೪೫,೬೫ ಮತ್ತು ೮೫ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮೂರು ಸಿಂಪರಣೆ	೦.೭೫	೦.೭೫	೪೦೦-೫೦೦	ಬೆಳೆಯ ಸಸ್ಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತ	೨೪ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ	ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ	೩ ಸಿಂಪರಣೆಗಳು ೨೦ ದಿನಗಳ ಅಂತರ
ಟಮೆಟೊ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ	ಉಳಿಸಿ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ೪೫,೬೫ ಮತ್ತು ೮೫ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮೂರು ಸಿಂಪರಣೆಗಳು	೦.೭೫	೦.೭೫	೪೦೦-೫೦೦	-	-	-	-
ಅಕ್ಕಿ	ಉಳಿಸಿ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ೪೫,೬೫ ಮತ್ತು ೮೫ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮೂರು ಸಿಂಪರಣೆಗಳು	೦.೭೫	೦.೭೫	೪೦೦-೫೦೦	-	-	-	-
ಕಡಲೆಕಾಯಿ	ಉಳಿಸಿ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ೪೫,೬೫ ಮತ್ತು ೮೫ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮೂರು ಸಿಂಪರಣೆಗಳು	೦.೭೫	೦.೭೫	೪೦೦-೫೦೦	-	-	-	-

ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಬಾದಿಸಂ ಯೊಕ್ಕು ಮೆಸಲುತುಲು ಸಂಭಂದಿಂದಿ ಅವಲಂಬಿಂದೆ ಮುಂದಿ ಅಂಶಾಲು.

ಬಾದೆ ನಿಧಾನಮು : ಅನುಮತಿಸುವಂತೆ ಮೊತ್ತಲ ನಿರ್ಮಾಣದಲ ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನು ತೀಸುಕುನಿ ದಾನಿಕಿ ಕ್ರಾಫ್ಟಿ ನೀರು ಕಲಿಪಿ ಬಾಗುಗಾ ಕಲಾಪಂಡಿಸು.ತರುವಾಯ ಸಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದಿನ ತೆರದಲ್ಲಿ ಕಲಿಪಿ ಬಾಗುಗಾ ಕಲಿಪಿಂದ ಮೊತ್ತಲ ಅಂತಾ ತಡೆಸೇಂದಾ ಕಿಪಿದಾರಿ ಯಂತ್ರಂಲಿಂದೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ವಾತಾವರಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು (ಸಿಫಾರಸಾದಂ) : ಸುರಿಯುವಾಗಲೂ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲು ಬಾಗಾ ಗಾಳಿಯಿರುವ ಸಮಯಂಲಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ.

ನೆಲ ಮತ್ತು ನೀರು (ಎಕ್ಕಡ ಅವಸರಮುಂಟೆ ಅಕ್ಕಡ): ಈ ಕಳುಪುನಾಶಕ ನಂಟ ಆಕುಂಟ್ಲು ಉಪಯೋಗಿಂದೆ ಇದಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪ್ರಭಾವಂ ಚೂಪದು. ಮೀನಿನ ಸಾಕಣಿಕಲ ದೌಟ ದಿನ್ನಿ ಪಾಡದಂದು.

ಪಾದುಬಟು : ನಂಟ ದಶಃ : ನಂಟ ನಿರ್ಮಾಣದಲ ದಶಲೌ ನಂಟ್ಲು ಸಿಂಪರಣೆ.

ಪಾದುಬಟಿನೆ ಸರಿಪಾರಾಂ : ನಂಟ್ಲು ಸಿಂಪರಣೆ ಕೊಸಂ ಹೈವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸಾಕ್ (ಸ್ಪ್ರೆಯರ್ ಮರಿಯು ಮೋಟಾರ್‌ಕೃತ್.ನಾಪಲೆಲಿಗಿಂದುಬಡಿನ ಲೌ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೋಟಾಜ್ಡೈಸ್ಡ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸಾಕ್ (ಸ್ಪ್ರೆಯರ್.

ಸರಿಪಾರಾಲು ರಕಂ : ಫ್ಲಾಟ್ ಫಾನ್ ನೊಜಲ್‌ತಿಗಿಂದುಬಡ್ಡ ಹೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸಾಕ್ (ಸ್ಪ್ರೆಯರ್ ಮರಿಯು ಲೌ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೋಟಾಜ್ಡೈಸ್ಡ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸಾಕ್ (ಸ್ಪ್ರೆಯರ್.

ನಾಜಲ್ ರಕಂ : ಫ್ಲಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ನೊಜಲ್ ಟಿಪ್‌ನಾಜಲ್.

ಮೊತ್ತಾಲು : 0.25ಲಿ. ಸೂತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರ್ (0.25 ಜಿ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ/ಹೆಕ್ಟರ್) 400-500 ಲಿ.

ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಕಲುಪುಟುಕು ಸೂಚನಲು: ಕಾಲಿಪ್ಪುನಂತೆ ಸರಿಯಾಗಿಂದೌ ಕಲುಪುನಾಶಕಾನಿ ಕೌಂಡೆಸೆಸಿ ಕೊಸುಕೊನಿ, ದಾನಿಕಿ ಕೊಡ್ಡಿಗಾ ನೀರುತೊಸಿ ಬಾಗಾ ಕಲಿಯಬಿಟ್ಟು ಬಿಸ್ಸುನಿ ಕ್ರಾಫ್ಟಾನ್ನು ತಯಾರುಚೆಸುಕೌಂಡಿ.ಸಿದಾನ ಮಿಗತಾ ನೀಟಿ ಸರಿಯಾಗಾನ್ನು ಅಂದು ಸೆಸುವುದಿಗಾ ಪೌಸ್ತು ಬಾಗಾ ಕಲಿಯಬಿಟ್ಟುಪುಟಂಬಾ ಕಾಲಿಪ್ಪುನಂತೆ ಕ್ರಾಫ್ಟಾನ್ನು ತಯಾರುಚೆಸುಕೌಂಡಿ.

ಕಿರಿದಿ ಪ್ರವೇಶವು ಸೃಷ್ಟಿ: 24 ಗಂಟಲ ತರ್ವಾತ

ನೀಟಿಲೌ ಸುರಿಯ ಸರಿಯಾ ನಾಡೆ ಸಮಯಂ : ನಂಟ – ಮೊದಲಿ ಸಿಂಪರ್ಕಿ – ರೆಂಡಾ ಸಿಂಪರ್ಕಿ – ಮೂಡಾ ಸಿಂಪರ್ಕಿ.

ಪತ್ತಿ : ನಿಲ್ಲಿ 45 ರೌಜಲ ತರುವಾತ ನಿಲ್ಲಿ 65 ರೌಜಲ ತರುವಾತ ನಿಲ್ಲಿ 85 ರೌಜಲ ತರುವಾತ.

ಟಮೊಟ, ಮಿರಪ : ನಿಲ್ಲಿ 25 ರೌಜಲ ತರುವಾತ ನಿಲ್ಲಿ 45 ರೌಜಲ ತರುವಾತ ನಿಲ್ಲಿ 65 ರೌಜಲ ತರುವಾತ.

ಸರಿ : ನಿಲ್ಲಿ 25 ರೌಜಲ ತರುವಾತ ನಿಲ್ಲಿ 45 ರೌಜಲ ತರುವಾತ ನಿಲ್ಲಿ 65 ರೌಜಲ ತರುವಾತ.

ಶೆಂಗನಗಾ : ನಿಲ್ಲಿ 25 ರೌಜಲ ತರುವಾತ ನಿಲ್ಲಿ 45 ರೌಜಲ ತರುವಾತ ನಿಲ್ಲಿ 65 ರೌಜಲ ತ

விபுல் பூஸ்டர்

டிரையகன்டனல் இடபுள்ளு 0.1%
(1000 பிபிஎம் குறைந்தபடசம்)
(தேநீர்லை தாவர வளர்ச்சி ஊக்கி)

டிரையகன்டனல் 0.1% இடபுள்ளு ஒரு தாவர வளர்ச்சி ஊக்கி. பருத்தி, மிளகாய், தக்காளி, தென் மற்றும் நிலக்கடலை பயிர்களில் விளைச்சலை அதிகரிக்க இது பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இரசாயனச் சேர்க்கை:	மூலப் பொருள் % எ/எ
டிமினாலைல்டு அதுவா அதா இன்கிரிடியன்ட்	கி.கு. எ/எ
எஸ்டர்ஸ் ஆப் பென்ஜோயிக் ஆசிட்	0.10 எ/எ
பிரிக்கா வெடிஸ் இதோக்ஸைலேடெட் எஸ்டர்ஸ் ஆப் பீட்டேடு ஆசிட்ஸ் ஏமுல்லிபையர்ஸ்	0.50 எ/எ
டிரையகன்டனல் வீரியப் பொருள்	0.1 எ/எ
மொத்தம்	100.00 %எ/எ

பரிந்துரைகள்:

பயிர்	பூச்சிகளின் பொதுப்பெயர்	அளவு/ஒரு ஹெக்டேருக்குத் தீர்வு. (கிராம்)	பயனாடு (லிட்டர்)	கலந்தக்கூறும்	பயிரப் பருவம்	மருந்து தெளித்தல் பிறகு நாட்களுடன்	அறுவடைக்கு முன்	அடிக்கடி பயன்படுத்தல்
பருத்தி	விளைச்சலை அதிகரிக்க மூன்று தெளிப்புகளை விதைத்த நிமிடத்திலிருந்து 45, 65 மற்றும் 85 நாட்களில் செய்ய வேண்டும்.	0.25	0.25	400-500	தனது வளர்ச்சிப் பருவத்திற்கு இவை தெளிப்பாகச் செய்ய வேண்டும்.	24 மணி நேரத்திற்குப் பிறகு	பொருந்தாது	20 நாட்கள் இடைவெளியில் 3 தெளிப்புகள் செய்ய வேண்டும்
மிளகாய் மிளகு	விளைச்சலை அதிகரிக்க மூன்று தெளிப்புகளை விதைத்த நிமிடத்திலிருந்து 25, 45 மற்றும் 65 நாட்களில் செய்ய வேண்டும்.	0.25	0.25	400-500				
தென்னை	விளைச்சலை அதிகரிக்க மூன்று தெளிப்புகளை விதைத்த நிமிடத்திலிருந்து 25, 45 மற்றும் 65 நாட்களில் செய்ய வேண்டும்.	0.25	0.25	400-500				
நிலக்கடலை	விளைச்சலை அதிகரிக்க மூன்று தெளிப்புகளை விதைத்த நிமிடத்திலிருந்து 25, 45 மற்றும் 65 நாட்களில் செய்ய வேண்டும்.	0.25	0.25	400-500				

கவனிக்கவும்: பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தெளிப்புக்கான தொழில்நுட்ப ஆலோசனைகள்.

பயன்படுத்தும் விதம்: சிறிதளவு தண்ணீரில் தேவையான அளவு தாவர வளர்ச்சி ஊக்கி மருந்தை சேர்த்து நன்றாகக் கலக்க வேண்டும். பீக்தமுள்ள தண்ணீரை இந்தாய் கரைசலுடன் சேர்த்து குலுக்கி குலுக்கி நன்றாகக் கலக்கி பொருத்தமான தெளிப்பானில் பயன்படுத்தும் விதமாக கரைசலைத் தயாரிக்க வேண்டும்.

வயலில்லை நிலவரம் (பொதுவகை): மழைக் காலத்தில், காற்று வீசிக் கொண்டிருக்கும் போது அல்லது வெயில் தீவிரம் அதிகமாக இருக்கும் போது தெளிக்கக் கூடாது.

நிலம் மற்றும் நீர் (பொருந்தும் இடங்களில்): இந்த பூசணக்கொல்லி மருந்தை இலை தெளிப்பாகப் பயன்படுத்த வேண்டும். இவ்வாறு பயன்படுத்தும் போது பாதிப்பு ஏதும் ஏற்படாது. செயற்கை மீன் வளர்ப்பு இடங்களுக்கு அருகில் பயன்படுத்தக் கூடாது.

மருந்து தெளிப்புப் பயிர் பருவமும்: தலை வளர்ச்சிப் பருவத்தில் இலை தெளிப்பாகச் செய்ய வேண்டும்.

மருந்து தெளிக்கும் முறை: இலை தெளிப்பாக அதிக கொள்ளளவு நாப்சாக் ஸ்பிரேயர் மற்றும் குறைந்த கொள்ளளவு மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட நாப்சாக் ஸ்பிரேயரில் வெற்று முனை கூம்பு பொருத்தி தெளிக்க வேண்டும்.

கருவி வகை: அதிக கொள்ளளவு நாப்சாக் ஸ்பிரேயர் மற்றும் குறைந்த கொள்ளளவு மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட நாப்சாக் ஸ்பிரேயரில் வெற்று முனை கூம்பு பொருத்தி தெளிக்க வேண்டும்.

கூம்பு வகை: அதிக கொள்ளளவு நாப்சாக் ஸ்பிரேயர் மற்றும் குறைந்த கொள்ளளவு மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட நாப்சாக் ஸ்பிரேயரில் வெற்று முனை கூம்பு பொருத்தி தெளிக்க வேண்டும்.

கூம்பு வகை: உட்டை விசிரி அல்லது வெள்ளர் பாய்வு கூம்பு

மருந்தளவு: 0.25 லிட் . தயாரிப்பு/ஹெக். (0.25 கி. தூ./ஹெக்.). 400-500 லி/ஹெக் நீரில் கரைத்து.

மருந்து தயாரிக்கும் முறை: சிறிதளவு தண்ணீரில் தேவையான அளவு களைக்கொல்லி மருந்தை சேர்த்து நன்றாகக் கலக்க வேண்டும். மீதான தண்ணீரை இந்தாய் கரைசலுடன் சேர்த்து குலுக்கி குலுக்கி நன்றாகக் கலக்கி பயிர்கள் முழுவதும் நனையும் அளவுக்குத் தேவையான கரைசலைத் தயாரித்துக்கொள்ள வேண்டும்.

மருந்து தெளிக்த பிறகு நடைமுறைகள்: 24 மணி நேரத்திற்குப் பிறகு தெளிக்கும் முறையும் காலமும்: பயிர் 1வது தெளிப்பு, 2வது தெளிப்பு, 3வது தெளிப்பு.

பருத்தி: 45 நாட்கள் விதைத்த பிறகு, 65 நாட்கள் விதைத்த பிறகு, 85 நாட்கள் விதைத்த பிறகு.

தக்காளி, மிளகாய்: 25 நாட்கள் நடவுக்குப் பிறகு, 45 நாட்கள் நடவுக்குப் பிறகு, 65 நாட்கள் நடவுக்குப் பிறகு.

தென்னை

நிலக்கடலை:25 நாட்கள் நடவுக்குப் பிறகு, 45 நாட்கள் நடவுக்குப் பிறகு, 65 நாட்கள் நடவுக்குப் பிறகு.

நெற்பயிர் : 25 நாட்கள் நடவுக்குப் பிறகு, 45 நாட்கள் நடவுக்குப் பிறகு, 65 நாட்கள் நடவுக்குப் பிறகு.

பயன்படுத்தும் காலம்: வறட்சி இல்லை. பலமாகக் காற்று வீசும் போதும், மழை பெய்யும் வாய்ப்பு இருக்கும் போதும் மருந்தைத் தெளிக்கக் கூடாது. அடிக்கடி பயன்பாடு: 20 நாட்கள் இடைவெளியில் 3 தெளிப்புகள் செய்ய வேண்டும்.

பயிர்கள் மீது பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை தெளிக்கக் கூடாத கட்டங்கள்: மேலே சொல்லப்பட்டிருக்கும் குறிப்புகளைப் பின்பற்றி மருந்தைத் தெளிக்க வேண்டும்.

நன்மை பயக்கும் பூச்சிகள் மற்றும் தும்பூச்சிகளை வேட்டையாடும் உயிரினங்கள் மற்றும் தேனீக்களுக்கு தீங்கு ஏற்படாதிருக்க தேவைப்படும் இனரைச்சிக்கைகள்:

விலங்கோடிய அறிகுறிகள்: கண் மற்றும் கரும் எச்சரை, குமட்டல், தலைவலி ஏற்படலாம்.

தலுதலீட்: விழுங்கியிருந்தால்: தோயாளி கயறினையுடன் விழிப்புடன் இருந்தால், வாமயக் கொப்பளிக்கச் செய்து ; அல்லது 2 கிளாஸ் தண்ணீரைக் குடிக்கச் செய்யுங்கள். சுயநினைவு தவறியிருப்பவர்களுக்கு வாய் வழியாக எதையும் கொடுக்கக் கூடாது. மருத்துவரைக் கூப்பிட வேண்டும். மருத்துவரின் தேர்பாலை இல்லாமல் நோயாளியை வாந்தி எடுக்கத் தூண்டக் கூடாது. சுயாரித்திருந்தால்: தோயாளியை நல்ல காற்றோட்டமான இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்லு. உடல் தப்பிவைப்பத்தக்க சுவனிக்க சிரமப்படுகிறார் என்றால், வாயுடன் வாய் வழியாக ஊதி செயற்கை சுவாசமளிக்க வேண்டும். மருத்துவ உதவிக்கு பெற வேண்டும். மருந்து சருமத்தில் பட்டிருந்தால்: நன்றாகக் குளிக்க வேண்டும். சோப்பு போட்டு நிறைய தண்ணீர் ஊற்றி குளிக்க வேண்டும். கண் இடுக்குகளை, நகங்களை உறுத்தல் உணர்வுகள் தொடர்கிறதென்றால், மருத்துவரிடம் சிகிச்சையைப் பெற வேண்டும். மாசுபட்ட ஆடைகளை தனியாக நன்றாக சோப்பு போட்டு துவைத்த பிறகே மறுபடியோக்கம் செய்ய வேண்டும். கண்களில் பட்டிருந்தால்: கண்களை நன்றாக அலம்பிக்கொள்ள வேண்டும். தொடர்ந்து 15 நிமிடங்கள் வரை கண்களில் நீரைத் தண்ணீர் ஊற்றி கழுவிக்கொள்ள வேண்டும். வலி, உறுத்தல், கண்ணில் வலை வியாகக்குறை சகிக்க யுமாத நிலைமை இருந்தால், கண் மருத்துவரிடம் சிகிச்சையைப் பெற வேண்டும்.

நச்சு முறியீடு: குறிப்பிட்ட நச்சு முறியீடு எதுவும் கிடையாது. அறிகுறிகளுக்கே நிப் சிகிச்சையளிக்கவும்.

தாவரத்திற்கு நிச்சய: சிபாரசு செய்யப்பட்ட அளவுகளில் உபயோகப்படுத்தினால் தாவரங்களுக்கு நிச்சப்பாயக்காது.

செமித்து வைத்தல்: 1. களைக்கொல்லி மருந்தை அதன் ஒரிஜினல் கொள்கலனில், உணவுப் பொருள்கள் வைக்கும் இடத்திலிருந்து விலகி ஒரு தனி அலமாரியில் அல்லது கட்டிடத்தில் பாதுகாப்பாக வைக்க வேண்டும். மருந்தின் அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொறுத்து சாவி பூட்டு வசதியுள்ள ஒரு தனி அலமாரியில் மருந்தைச் சேமித்து வைக்கலாம். 2. குழந்தைகளுக்கு எட்டாத உயரத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும். உணவுப் பண்டங்ள், விலங்கு தீவனங்கள் மற்றும் இதர பிற உணவுப் பொருள்களிலிருந்து விலக்கி குளிர்ந்த உலர்ந்திருக்கும் இடத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும். 3. 2. சேமித்து வைக்கும் அறைகள் போதுமான தீயை அணைத்தல் நன்றாகக் கட்டப்பட்டு, வெளிச்சமும் காற்றோட்டமும் உள்ளதாக இருக்க வேண்டும்.

உபயோகப்படுவர்களுக்கான ஸ்னெச்ச அக்கைகள்: சருமம், கண்கள் மற்றும் வாயிலாய்வுகளை தவிர்க்கவும். ஆப்ரான், கையுறைகள், க ஸலாம் மற்றும் பூட்ஸ் போன்ற பாதுகாப்பான அணிகலன்களை அணியவும். மாசுபட்ட உடல் பாகங்களை உண்ணுவதற்கும், பருகுவதற்கும் புகை பிடிப்பதற்குள் கழுவவும். சுற்றுப்புற சூழல் மற்றும் தீமை ஏற்படுவதை தவிர்க்கவும்.

எச்சரிக்கை அறிவிப்பு: 1. இந்த லேபில்/லீபலேபலுடன் கொடுத்திருக்கும் பயிர்களைத் தவிர்த்து வேறு பயிர்கள் மீது பயன்படுத்தக் கூடாது'. 2. கையேட்டைஒன்றாக குறிப்புகளைப் பின்பற்றி கொள்கலன்களை அழித்துவிடவும். களி கொள்கலன்களை மறு-உபயோகம் செய்வது ஆபத்தானது.

கால் பாத்திரம் கருவிகள், கருவிகளை அலம்பிய நீர் மற்றும் நீர்துவிட்டை கலாசனை அப்புறப்படுத்தல்: 1. பேக்கேஜுகள் அல்லது எஞ்சிய பொருட்கள் மற்றும் எந்திரத்தின் கழுவு நீரி மற்றும் கொள்கலன்களை கற்றுப்பற்று சூழல் மற்றும் நீரி நிலைகளுக்கு மாசு ஏற்படாதவாறு பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்த வேணடியது உற்பத்தியாளர், கலைவை தயாரிப்பாளர் மற்றும் உபயோகிப்பவரின் கடமை ஆகும். 2. உபயோகித்த பேக்கேஜுகளை மறுமுறை பயன்படுத்தும் வகையில் வெளியில் விட்டுவைக்கக் கூடாது 3. பேக்கேஜுகளை உடைத்து வசிப்பிடங்களுக்கு அப்பாலா புதைக்கவும்.

विपुल बूस्टर

ट्रैअ्कैरोनटनल इडबुल्यू 0.1%
(1000 पिपिएम न्यूनतम)
(चिनाबिलीय उद्भिद वृद्धि नियामक)

ट्रैअ्कैरोनटनल 0.1% इडबुल्यू, यह सब्जियों तथा फलों में उपयोग किया जाने वाला एक प्रभावशाली पौधा नियामक है। यह टमाटर, बैंगनमरिचकाय, भिंडी, मक्का तथा नींबूवर्गीय फलों में उपयोग किया जाता है।

रासायनिक संरचना:	फार्मूला % डब्लयू/डब्लयू
ट्रैअ्कैरोनटनल इडबुल्यू	कुछ.ऊ.ए. डब्लयू/डब्लयू
बीटाकेरोटीन ऐक्टिव	0.10 डब्लयू/डब्लयू
ड्रायर्सटायरमार्ग एसएफ़	
फ्रायट एड्यूवेंटार्स इण्टरनेट्रीलेटेड	
एसएफ़ एसएलएड्यूयरमार्ग	0.50 डब्लयू/डब्लयू
ट्रैअ्कैरोनटनल एक्टिव फार्मूला	0.1 डब्लयू/डब्लयू
मिलाकर	100.00 डब्लयू/डब्लयू

उपयोगकर्ता:

बीज	बोआई समय/ मौसम	मात्रा/लेबल मात्रा/ लेबल (ग्रा/ली)	सिंचाई/ वर्षा (दिन)	फसल कटाई/ तुड़ाई (दिन)	कीटनाशक प्रतिबंध	फसल कटाई/ तुड़ाई
मक्का	ग्रीष्मकालीन मौसम/ खरीफ	0.25	0.25	400-500	बीजोपचार तथा पौधशाला मजबूती, 45 दिन बाद मजबूती, 45 दिन बाद	24 घण्टा पश्चात	20 दिन बाद
बैंगन	ग्रीष्मकालीन मौसम/ खरीफ	0.25	0.25	400-500			
भिंडी	ग्रीष्मकालीन मौसम/ खरीफ	0.25	0.25	400-500			
टमाटर	ग्रीष्मकालीन मौसम/ खरीफ	0.25	0.25	400-500			
नींबूवर्गीय फल	वर्ष भर	0.25	0.25	400-500			

सावधानी: कीटाणुनाशक सूचनाओं/लेबिलों संबंधपूर्वक उपयुक्त क्रमानुसार.

प्रयोग निर्देशसंबंध : प्रतिकारावस्था में सब्जियों तथा फलों में प्रयोग करने से पहले पौधों को पानी से अच्छी तरह से गीला करें। यह प्रयोग पौधों के विकास के शुरुआती चरण में करना चाहिए। यह प्रयोग पौधों के विकास के शुरुआती चरण में करना चाहिए। यह प्रयोग पौधों के विकास के शुरुआती चरण में करना चाहिए।

सहायक परिस्थिति (साधारणतः): वृष्टि के दिनों में, प्रबल हवाओं में और उच्च तापमान में प्रयोग करने से बचें।

बतरव परिस्थिति(साधारणतः): बवंडर, तूफान, बर्फ, ओले, तेज हवाओं में प्रयोग करने से बचें।

मिट्टी और जल (यथोचित या प्रयोगयोग्य): मिट्टी में पर्याप्त नमी होने पर ही प्रयोग करें। यह प्रयोग पौधों के विकास के शुरुआती चरण में करना चाहिए। यह प्रयोग पौधों के विकास के शुरुआती चरण में करना चाहिए।

मिट्टी आक्र पानी(यथेष्ट प्रयोग): मिट्टी में पर्याप्त नमी होने पर ही प्रयोग करें। यह प्रयोग पौधों के विकास के शुरुआती चरण में करना चाहिए। यह प्रयोग पौधों के विकास के शुरुआती चरण में करना चाहिए।

प्रयोगपद्धति: प्रयोग के समय पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी द