2, 4-डी, सोडियम सॉल्ट-80% डब्ल्यू.पी.

वीडनँश ''तणनाशक''

एक तृणनाशक जे दीर्घजीवी रानटी झुडपे, लव्हाळे आणि अंकूर फुटलेले गवताचे बी या किंवा तण चावर नियंत्रण राखते.

अर्ध्या स्प्रे - टाकीमध्ये 2-4 डी सोडियम सॉल्टची 80% आवश्यक मात्रा मिसळा. व्यवस्थित मिसळून पाण्याने स्प्रेयर भरून घ्या. हे द्रावण ''उच्च'' किंवा ''मध्यम' व्हॉल्यूम स्प्रेयर ने वापरा, शंभर लिटर प्रति हेक्टर पेक्षा कमी वापर नये. क्षेत्र अधिक असेल सेच पिक किंवा रानटी झडपे दाट असतील तर प्रमाण दोनशे लिटर इतके वाढवा. चांगल्या परिणामासाठी रानटी झुडपे भरात असताना हे वापरा (2ते 3 पानावर असताना).

(ए) ठराविक रांगेत रानटी झुडपांवर नियंत्रणामध्ये-

भात - 400-450 ग्रॅम प्रती एकर (200 लिटर पाण्यामध्ये पेरणीनंतर 21-28 दिवसात गह- 500-700 ग्रॅम प्रती एकर 200 लिटर पाण्यामध्ये पेरणीनंतर 28-35 दिवसात.

(बी) पिका अगोदर एकंदर उगम असल्यास - यामध्ये

ऊस आणि मका- एक किलो प्रती एकर पेरणी/लागवडी नंतर 2-3 दिवसात. (सी) जलीय रानटी झडपे - जलीय कंदयक्त फलझाड आणि पिस्तिया स्पे. 200-250 लिटर पाण्यात एक ते दोन किलो सर्वत्र फवारावे. रानटी झडपे दाट होण्यापूर्वी फवारावे. गरज पडल्यास दोन ते तीन आठवडचानंतर पुन्हा फवारणी करावी.

फवारणीसाठी उपकरणे : नॅपसॅक स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक बॅटरी स्प्रेयर व ॲस्पी-एच टी पी पावडर स्प्रेयर फ्लॅट फॅन व फ्लडेड जेट स्पेयर

विषबाधेची लक्षणे : अशक्तपणा, अतिसार, तोंडाचे व हातापायांचे स्नाय शिथिल होणे. काही वेळा हायपरपायरेक्सिया होऊ शकतो. व्हेन्ट्रीक्युलर फिब्रिलेशन किंवा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू होऊ शकतो.

प्रथमोपचार: पोटात गेल्यास घशात बोटे घालून ओकारी काढा. ओकारीचे पाणी स्वच्छ येईपर्यन्त ओकारी काढा. कपडे दुषित झाले असल्यास साबणाने धवा.

औषधोपचार: पोटात गेल्यास गॅस्टिक लॅव्हेज द्या. मॉयटोनिआ व व्हेन्ट्रीक्युलर फिब्रिलेशनवर किंडिंग सल्फेट उपयोगी ठरू शकते. लक्षणानसार उपचार करावा.

वापरण्याच्या मर्यादा व सावधिंगरी : कापूस, बटाटा, तंबाखू, मिरची, टोमॅटो व द्राक्षे नाजुक पिके असल्यामुळे त्या पिकाजवळ फवारू नका. मासे जवळपास असून त्यांना इजा होण्याची शक्यता असल्यास फवारू नका. फवाऱ्याचा झोत टाळा. फवारलेल्या जागेपासून पशुधन किमान दोन आठवडे दूर ठेवा बियाणे, खते व कीटनाशकोपासून दूर ठेवा. श्वासावाटे घेऊ नका, उघड्या हातांनी मिसळ नका,

साठवण : (अ) तणनाशकाचे पुड़े-डबे स्वतंत्र खोलीत किंवा, जागेत, इतर वस्तू साठविण्याच्या जागेपासून दूर किंवा स्वतंत्र अलमारीत कुलुप लाऊन ठेवावे. तणनाशकाच्या स्वरूपावर व प्रमाणावर हे अवलंबन असावे. (ब) साहित्य साठवणीच्या खोल्या किंवा जागा पक्क्यो. प्रकाशाच्या, हवेशीर व ऐसपैस असल्या पाहिजेत.

वापरलेल्या पुड्यांची विल्हेवाट : (अ) पुडे तोडून वस्तीबाहेर पुरावे. (ब) वापरलेल्या पुड्यांचा गैरवापर टाळण्यांसाठी ते बाहेर फेकू नयेत. (क) पुडे, अतिरिक्त साहित्य व उपकरणे धुतलेले पाणी पर्यावरण किंवा जलप्रदूषण प्रतिबंध होईल अशा पद्धतीने नष्ट करावे.

वापरणारांसाठी सावधगिरी: (अ) पाणी मिसळताना श्वास किंवा त्वचेवाटे संपर्कात येऊ देऊ नये. उघड्या हातांनी मिसळू नये. (ब) फवारताना रबरी हातमोजे, जोडे चेहऱ्यावर मुखवटा, ओव्हरऑल रबर एप्रन, हड किंवा हॅट यांचा समावेश असलेले संरक्षण कपडे घालावे. (क) फवारताना खाऊ-पिऊ अथवा धूम्रपान करू नये.

उत्पादकः

सुव्होकेम इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड

एस-3, ए/19, जगतपूर इंडस्टीयल एस्टेट (नवीन) जगतपूर, कटक-754 021 (उड़ीसा)

वितरक: गोदरेज ॲग्रोव्हेट लिमिटेड

पंजिकृत कार्यालय - फिरोजशा नगर इस्टर्न एक्सप्रेंस हायवे, विक्रोळी, मुंबई-400079 ੨,੪−ਡੀ, ਸੋਡਿਯਮ ਸਾਲਟ−੮੦% ਡਬਲੳ. ਪੀ.

ਵੀਡਨਾਸ ''ਨਦੀਣਨਾਸ਼ਕ''

ਇਕ ਚੁਨੀਂ ਦੀ ਬੂਟੀਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਾਹ, ਕਾਹੀ ਅਤੇ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ੳਗਦੀਆਂ ਪਨੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।

ਅੱਧੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਪ੍ਰੇ ਟੈਂਕ ਵਿਚ ੮੦% ਸੋਡੀਯਮ ਸਾਲਟ ਨਾਲ ੨.੪–ਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਤਰਾ ਮਿਲਾੳ। ਇਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਰਲਾ ਕੇ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਉਂ । ਕਿਸੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ''ਵੱਡੇ'' ਜਾਂ ''ਮਧਮ''ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ੧ ਏਕੜ ਵਿਚ ੧੦੦ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪਾੳ । ਜੇ ਬੂਟੇ ਜਾਂ ਫਸੰਲ ਸੰਘਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਏਕੜ ਵਿਚ ੨੦੦ ਲੀਟਰ ਵਧਾ ਦਿਉ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਇਸਦਾ ਫੈਲਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਅ ਵਾਸਤੇ ਬੂਟੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (੨ ਤੋਂ ੩ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ)

ਖਰਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ :

(ਅ) ਚਨੀਂ ਦੀ ਬਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡਨਾਸ਼ਕ ਨੰ:

ਧਾਨ –੪੦੦–੪੫੦ ਗ੍ਰਾਮ/ਏਕੜ ਲਾਉਣ ਦੇ ੨੧–੨੮ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਦ ੨੦ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ

ਗੇਹੂੰ - ੫੦੦-੭੦੦ ਗਾਮ/ਏਕੜ ਬੀਜ ਬੋਣ ਤੋਂ - ੨੮-੩੫ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦ ੨੦੦ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ

(ਬ) ਫਸਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾ ਉਗਮਣ :

ਗੌਣੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਲਈ−੧ ਕਿਲੋ[ੱ]/ਏਕੜ ਪੋਦਣ/ਬੀਜ ਬੋਨ ਦੇ ੨−੩ ਦਿਨਾਂ ਬਾਦ। (੩) ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਟੇ- ਵਾਟਰ ਹਾਇਸਿੰਥ ਅਤੇ ਪਿਸਤੀਆ ਸਪ੍ਰੈਸ਼ਲ ਸਪ੍ਰੇ ਪੂਰੇ ਉਪਰ ੧–੨ ਕਿਲੋ/ਏਕੜ ੨੦੦–੨੫੦ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚ । ਬੂਟੇ ਸੰਘਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੇ ਕਰੋ । ੨−੩ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਦ ਫਿਰੂ ਸਪੇ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ।

ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਯੰਤਰ : ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਫੁਟ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੈਪਸੈਕ ਬੈਟਰੀ ਸਪੇਅਰ ਅਤੇ ਐਸ ਪੀ-ਐਚ ਟੀ ਪੀ ਪਾਉਡਰ ਸਪੇਅਰ, ਫਲੈਟ ਫੈਨ ਅਤੇ ਫਲੱਡੇਡ ਜੈਟ ਸਪ੍ਰੇਅਰ।

ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਣ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਦਸਤ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਚ ਐਂਠਣ। ਹਾਈਪਰਪੈਕੰਸੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਗਤੀ ਰਕਣ ਨਾਲ ਮਿਰਤੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਪਾਥਮਿਕ ਰਿਕਿਤਸਾ : ਜੇ ਨਿਗਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਦਗਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਲਟੀ ਕਰਾਓ. ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਉਲਟੀ ਸਾਫ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੱਪੜੇ ਦੁਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਬਣ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੇਂ।

ਐਸ਼ਧੀ ੳਪਚਾਰ : ਨਿਗਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੈਸਟਿਕ ਲੈਵੇਜ ਰਾਹੀ ਪੇਟ ਸਾਫ ਕਰਾਓ। ਕਵਿਨਡ੍ਰਿੰਗ ਸਲਫੇਟ, ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਰੁਕਣ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: ਕਪਾਹ, ਆਲੂ, ਤਮਾਖੁ, ਮਿਰਚਾਂ, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇੜੇ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਵਰਤੋ ਜਿੱਥੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਏ। ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਧੁੜੇ ਤੋਂ ਬਚੋ । ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਫਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਓ। ਬੀਜਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜਰਸ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਟੋਰ ਨਾ ਕਰੋ । ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲਓ ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲਾਓ।

ਸਟੋਰੇਜ: (ਏ) ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਪੈਕੇਜ, ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ / ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਰ. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਚ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।

(ਬੀ) ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਥਾਂ. ਪੱਕੇ ਬਣੇ. ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਖਲੇ ਡਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਰੀਦੇ ਹਨ।

ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਨਸਟ ਕਰਨਾ: (ਏ) ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਤੋੜ ਕੋ ਵੱਸੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ

(ਬੀ)ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੜ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। (ਸੀ) ਪੈਕੇਜ, ਬਚਿਆ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਇੰਜ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਏ।

ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ : (ਏ) ਘੋਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਤੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚੋ । ਨੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲਾਓ।

(ਬੀ) ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਸਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ, ਬੂਟ, ਰਬੜ ਦਾ ਐਪ੍ਰਣ, ਹੈਟ, ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਡਸਟ ਮਾਸਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। (ਸੀ) ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਣ. ਪੀਣ ਜਾਂ ਧੁਮਰਪਾਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ।

ਨਿਰਮਾਤਾ:

ਸਵੋਕੇਮ ਇੰਡਸਟੀਜ ਪਾਈ: ਲਿਮੀ:

ਐਸ-੩, ਏ/੧੯, ਜਗਤਪਰ ਇੰਡਸਟੀਅਲ ਏਸਟੇਟ (ਨਵੀਂ) ਜਗਤਪਰ, ਕਟਕ– ੭੫੪ ੦੨੧ (ਓੜਿਸਾ)

ਵਿਕਰੇਤਾ :

ਗੋਦਰੇਜ ਐਗਰੋਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

ਰਜਿਸਟਰਡ ਆੱਫਿਸ : ਪਿਰੋਜਸ਼ਾਨਗਰ ਈਸਟਰਨ ਏਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ, ਵਿਕਰੋਲੀ, ਮੰਬਈ - ੪੦੦੦੭੯ 2, 4-डी, सोडियम सॉल्ट-80% डब्ल्यू.पी.

वीडनाश (खरपतवार नाशक)

चौड़ी पत्तियोंवाला मोथा-फूस और कीचड़-पानी में उगनेवाली फालतु हरियाली को नष्ट करने में एक आदर्श तृण-नाशक।

प्रयोग की विधिः

आधे पानीवाले स्प्रे टैंक में २. ४-डी सोडियम नमक की आवश्यक मात्रा डालिए। उसे अच्छी तरह मिलाए और फिर स्प्रेअर में पानी भर लीजिए। खेत में इस मिश्रण को 'हाई-वॉल्युम' विधि से छिड़िके या 'मीडियम वॉल्युम' विधि से यह जरुरी है कि रपेअर प्रमाणिक हो और घोल प्रति एकड १०० लीटर से कम पानी में तैयार किया गया न हो। मोथा या फसल घनी हो तो मात्रा २०० लीटर प्रति एकड कर दीजिए ताकि ये मिश्रण पत्ते-पत्ते तक पहुँच सके। सबसे अच्छा यह है कि २-३ पत्तियाँ उगते ही इसे मोथे पर इस्तेमाल किया जाय।

(क) क्यारियों के मोथे के विशेष नियंत्रण के लिए

धान : २०० लीटर पानी में ४०० से ४५० ग्राम दवा प्रति एकड़ रोपाई के २१-२८ दिनों

गेहँ : २०० लीटर पानी में ५०० से ७०० ग्राम दवा प्रति एकड़ बोआई के २८-३५ दिनों

(ख) फसल उगने के पहले उगनेवाले आम घास-फूस के लिए

गन्ना और मक्का : प्रति एकड़ १ किलो दवा गन्ने का बखुवा लगने/मक्का बोने के २-३

(ग) पानी का मोथा - फूलदार पौधों (हायसिथ) और पिस्तियाँ स्प्रे के नाश के लिए -२०० से २५० लीटर पानी में १ से २ किलो दवा प्रति एकड-सारे पानी पर छिडिकये। मोथा घना या बलदार बनने से पहले ही आवश्यक हो तो, २-३ सप्ताह बाद

उपयोग में आने वाले यन्त्र :- पीठ पर लाद कर चलाने वाला फहार यन्त्र, पैरचलित फुहार यन्त्र, पीठ पर लादने वाला बैटरी चलित फुहार यन्त्र तथा ए एस पी ई ई -एच.टी.पी. पावर फहार यन्व और फ्लैट फैन जैट के प्रकार के नाजिल का प्रयोग

जहर चढने के लक्षण : कमजोरी दस्त, मुंह व अन्य माँस पेशियों में ऐंठन, कुछ अवस्थाओं में हायपरेरिक्सया हो सकती है। हृदय को रक्त पहुँचाने वाले मार्ग के कोश में संकुचन अथवा हृदय की गति रूक जाने से मृत्यु भी हो सकती है।

प्राथमिक-उपचार :- निगले जाने पर रोगी के गले के पिछले हिस्से में उगली डालकर उल्टी कराएं। यह क्रिया तब तक जारी रखें जब तक कि उल्टी में आने वाला द्रव्य साफ न हो जाए। दुषित त्वचा व कपड़ों को साबन से अच्छी तरह साफ करें।

औषधि-उपचार :- दवा के निगले जाने पर गैस्ट्रिक लवेज से पेट की सफाई की जा सकती है। माइटोनिया तथा हृदय को रक्त पंडुचाने वाले मार्ग में पड़ने वाले कोश के संक्चन के नियन्त्रण के लिए क्वीनीडाइन सल्फेट से सहायता ली जा सकती है।

उपयोगी की सीमा व सावधानियाँ :- कपास, आलू, तम्बाकू, मिर्च, टमाटर व अगूर की फसलों के आस-पास दवा न छिड़कें क्योंकि ये बहुत ही ग्रहणशील फसलें हैं। मधमखियों, पालत् मछलियों, पशओं के नकसान होने की हालत में दवा का प्रयोग न करें। दवा की फुहार से बचें। छिड़के हुए क्षेत्र में पशुओं, जानवरों को न जाने दें। (दो सप्ताह तक) बीज, खाद तथा कीटनाशक के नजदीक दवा का भन्डारण न करें।

संग्रह: १, दवा के डिब्वों को अलग-अलग कमरों में खाद्य पदार्थ रखें जाने वाले कमरों से अलग ताला चाबी में दवा के प्रमाप व प्रकार के हिसाब से अलग-अलग जगहों अथवा अलमारियों में रखना चाहिए।

२. वह कमरे या चार दिवारी जिसमें कीटनाशक संग्रहित किये जाते हों, सुदृढ, सूखे, प्रकाश के अन्दर आने की व्यवस्था वाले हवादानों से यक्त तथा बड़े आकार के होने

प्रयोग में आये हुए यन्त्रों का निपटारा आदि :-

१. खाली डिब्बों को उपयोग के पश्चात अच्छी तरह से तोडफोड़ कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए।

२. उपयोग किये हुये यन्त्रों को खुला बाहर न छोड़ें ताकि पुन: प्रयोग में न लाया जा

3. दवा के पैकिटों अथवा डिब्बों. यन्त्रों के धोवन को और बची हुई दवाओं का यमापन यदी तरीके से करना चादिए जिससे कि वातावरण व पीने का पानी विषेत्रा होने का खतरा न रहे।

उपयोग कर्त्ता के लिए सावधानिया :-

१. मिश्रण तैयार करते समय स्पर्श और सूधने से बचना चाहिए। दवा को नगे हाथों से

२. उपयोग कर्त्ता को सुरक्षा के पूरे वस्त्र धारण करने चाहिए जिसमें ग्लोवस्, जूता मोजा, नकाब, एप्रान, कंटोप व सारे शरीर को ढक लेने वाला वस्त्र या लम्बा चौडा कोट पहनना चाहिए।

३. जिस समय प्रयोग कर रहे हों तब खाना, पीना व धूम्रपान नहीं करना चाहिए।

शभकेम इंडस्ट्रीज प्रा० लिमिटेड

एस-३ ए/१९, जगतपर इंडस्ट्रीयल एस्टेट (न्य) जगतपर, कटक - ७५४ ०२१ (उड़ीसा)

वितरक

गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड पंजिकृत कार्यालय-फिरोजशा नगर इस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, विक्रोली, मुंबई-४०००७९



Read Instructions carefully before use.

प्रयोग से पहले संलग्न सूचना पत्र पढें

WEEDNASH

2. 4-D. SODIUM SALT 80% W.P.

វាំ៤ីកាស៊ី

2, 4-డి, సోడియం సాల్ట్ - 80% డబ్బ్యు. పి.

2, 4–டி, சோடியம் உப்பு – 80% டபிள்யூ.பி.

ವೀಡ್ ನಾಶ್

2, 4-ಡಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಸ್-80% ಡಬ್ಲೂಪಿ.

2, 4-डी, सोडियम सॉल्ट-80% डब्ल्यू.पी.

ਵੀਡਨਾਸ

੨.੪−ਡੀ. ਸੋਡਿਯਮ ਸਾਲਟ−੮੦% ਡਬਲੳ. ਪੀ.

2, 4-डी, सोडियम सॉल्ट-80% डब्ल्य.पी.

MANUFACTURED BY:

SUVOCHEM INDUSTRIES DVI. LTD.

S-3, A/19, JAGATPUR INDUSTRIAL ESTATE (NEW) JAGATPUR, CUTTACK-754 021

Customer Care: 0671-2491342 Email: sipl ct@rediff.mail.com











Marketed By:

GODREJ AGROVET LIMITED

REGD. OFFICE: PIROJSHANAGAR. **EASTERN EXPRESS HIGHWAY** VIKHROLI, MUMBAI-400 079

2, 4-D, SODIUM SALT 80% W.P.

WEEDNASH (Weedicide)

A selective herbicide controls broad-leaved weeds, sedges and germinating grass seeding.

Directions:

Add required quantity of 2, 4-D SODIUM SALT 80% to a half-filled spray tank, Mix thoroughly and fill the sprayer with water. Apply by using any standard 'high' or 'medium' volume sprayer in not less than 100 litres of water per acre. Increase the volume to 200 litres per acre if weeds or crop are dense as good coverage is essential. For best effects apply when weeds are young (2 to 3 leaf stage). Dosage:

- (a) Selective inter-row weed control in : PADDY : 400-450 gm/acre 21-28 days in 200 litres of water after planting. WHEAT : 500-700 gm/acre 28-35 days in 200 litres of water after seeding.
- (b) Pre-crop emergence overall in : SUGARCANE & MAIZE-1 kg/acre 2-3 days after planting/seeding.
- (c) WATER WEEDS: Water Hyacinth and Pistia Sp. Spray overall 1-2 kg/acre in 200-250 litres of water. Spray before the weeds become dense or matty. Repeat, if necessary, after 2-3 weeks.

EQUIPMENT USED IN APPLICATION:-

Knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack battery sprayer and ASPEE-HTP power sprayer, flat fan and flooded jet sprayer.

SYMPTOMS OF POISONING:-

Weakness, diarrhoea, spasticity of muscles of the mouth and limb. There may be hyperpyrexia in a few cases. Death may occur due to ventricular fibrillation or cardiac arrest.

FIRST AID MEASURES:-

If swallowed induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat until the vomit fluid is clear. If clothing is contaminated wash the same with soap.

DRUG THERAPY:-

If ingested, evacuate stomach contents by gastric lavage. Quinidine sulphate may help in myotonia and ventricular fibrillation. Treat symptomatically.

LIMITATION AND CAUTIONS FOR USE:-

Do not spray the crops in the neighbourhood of cotton, potato, tobacco, chillies, tomato and grapes as they are very susceptible. Do not use in those situations where there is possibility of harming fish. Avoid spray a rifts. Keep livestock away from the sprayed areas for at least two weeks. Do not store near seeds, fertilizers and insecticides. Do not inhale or mix with bare hands

- a) The package containing the material shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key, depending upon the nature and quantities of insecticides.
- b) The rooms or premises meant for storing the material shall be well built, well lit, and ventilated and of sufficient

DISPOSAL OF USED CONTAINERS:-

- a) The package shall be broken and buried away from inhabitation
- b) The used package shall not be left outside to prevent their re-use
- c) The packages or surplus materials and washing should be disposed off in safe manner so as to prevent environmental or water pollution.

PRECAUTIONS BY USERS:-

- a) Avoid inhalation and skin contact while diluting. Do not mix with bare hands.
- b) The users should wear full protective clothings which include rubber gloves, boots and either face shield or dust mask and overall rubber apron, bood or hat
- c) Do not eat, drink, smoke while handling the application.

MANUFACTURED BY:

SUVOCHEM INDUSTRIES PVT. LTD.

S-3, A/19, JAGATPUR INDUSTRIAL ESTATE (NEW) JAGATPUR, CUTTACK-754021

Marketed By:

GODREJ AGROVET LIMITED

REGD. OFFICE: PIROJSHANAGAR, **EASTERN EXPRESS HIGHWAY** VIKHROLI, MUMBAI-400 079

2, 4-డి, సోడియం సాల్ట్ - 80% డబ్బ్యు. పి.

ঠার্টিনাতর্ট্ন (కలుప మొక్కల నాశిని)

పెడల్పు ఆకుల కలుపు మొక్కలు, గరికలు మరియు పచ్చిగడ్డి పెరిగే విత్తనాల పెరుగుదలను నియం[తించే ఎన్నుకోదగిన కలుపు మొక్కల నాశని.

ವಾಡೆ ವಿಧಾನಾಲು :

2, 4-డి, సోడియం సాల్ట్ – 80% యొక్క అవసరమైన మోతాదును సగం నింపిన [స్పే టాంకున తీసుకోండి. బాగా కలిపిన తరువాత స్వేయరును నీటీతో నింపండి. కనీసం ఎకరానికి 100 లీటరులకి తక్కువగాకుండా ఏదైనా హై స్ట్వాండర్డ్ లేదా మీడియం వాల్యూమ్ ్రస్పేయర్ను [స్పే చేయడానికై వాడ వచ్చును. అవసరమయిన పరిస్థితిలో అంటే పంట యొక్క విస్త్రీక్షముతో కలుపు దట్టంగా వ్యాపించియున్నట్లెతే పరిమాణాన్ని 200 లీటర్లకు పెంచండి. మంచి పరిణామాలకై కలుపు మొక్కలు లేత దశన (2 నుండి 3 ఆకుల దశలో) పేయడం అత్యుత్తమం.

మందు యొక్క పరిమాణము :

(ఎ) ఎంచుకోదగిన కలుపు మొక్కల నియంత్రణ :

పరి – నారుబడి తరువాత 21–28 రోజులు వ్యవధిన ఎకరానికి 400–450 _|గాములు 200 లీటర్ల సీటిలో కలిపి [స్పే చేయాలి.

గోధుమ - వితనాలు పేసిన తరువాత 28–35 రోజులు వ్యవధిన ఎకరానికి 500–750 గ్రాములు 200 లీటర్ల సిటిలో కలిపి [స్పీ చేయాలి.

(బి) పంట వేయుటకు ముందు చర్య :

లేదా విత్తనాలు పేసిన తరువాత నీటితో కలిపి [స్పే చేయాలి.

(సి) సీటే కలుపు మొక్కలకై – వాటర్ హ్యాసింత్ మరియు పిస్టియా ఎస్పీ. [స్పీను 1-2కేజీలు/ఎకరానికి 200–250 లీటర్ల సీటితో కలిపి [స్ప్ చేయాలి. కలుపు మొక్కలు పెరిగి వ్యాపించే ముందు దశలో పేయాలి. 2–3 వారాల తరువాత ఆవసరమైతే మళ్ళీ స్ప్రీ చేయాలి. సార్గమ్ : కనపడిన తరువాత 45 రోజులకు 10–30 లెమ్స్ పంట ఎత్కులో పేయండి. వాడేందుకు ఉపయోగించే పరికరాలు: న్యాప్ శ్యాక్ స్పైయర్, ఫుట్ స్ప్రెయర్ కంప్రెషన్ న్యాప్శాక్ బ్యాటరీ స్పైయర్ ఘరియు అస్పి-హెచ్ట్రేపి పాడర్ స్పైయర్ ఛదును పంకా, ఘరియు ఫ్లడెడ్ జెట్ స్ప్రెయర్.

విష్మవభావవు లక్షణాలు : బలహీనంగా ఉండటం, విరేచనాలు, ముఖం, నడుము కండరాలు ముడుచుపోవడం కొన్ని సంధర్భాలలో హైవర్ పై రాక్సియా రావచ్చు. వెంటిక్యులార్ ఫ్టైబిలేషన్ లేదా గుండె ఆగిపోయి ఘరణం సంభవించ వచ్చు. ప్రథమ వికిత్స : మింగడం జరిగినట్టయితే గొంతులో చక్కిలిగింత పెట్టి వాంతి చేసుకునేలా ఛూడాలి. వాంతిలో ఘంధు ఉండినంథవరకు ఘళ్ళీ మళ్ళీ వాంతి చేయించాలి. ధుసులు కలిషితమైతే సబ్బుతో శుబ్రపరచాలి.

ఔషధ చికిత్స్ : కడుపులోకి పెళ్ళినట్లయితే గాగ్ట్రిక్ లావేజ్ ద్వారా కడుపులో నుంచి అది బయటకు పోయేలా ఘాడాలి. మైటోటినీయా, ఫెంబ్రిక్యులేట్ ఫైబిలేషన్లో క్విండ్డింగ్ సల్ఫేట్సహా యబడ పచ్చు. లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయాలి.

వాడడానికివరిమితులు, జాగ్రత్తలు :

్డపత్తి, బంగాళధుంప, పాగాకు, మిరప, టొమేటో ద్రాక్ష ఘట్టు ప్రక్కల గల పంటలమీధ పీచికారి చేయవచ్చు. ఎందుకంటే అవి దీని మ్రభావానికి ఇట్టే గురికావచ్చు. చేపలకు చెరువు కలిగే పరిస్థితులలో వాడరాదు. [స్పే జల్లులూ వ్యాపించనివ్వరాదు. మందు పిచికారి చేసిన స్థవదేశంలోకి కనీసం రెండు వారాల పాటు ప్రశువులను వెళ్ళనివ్వరాదు. ధాన్యం మొదలైన వాటికి, ఎరువులు కీటకనాశని మందులకు సమీపంలో నిల్వ వేయవద్దు. ఉట్టి వేతులతో కలుప పద్దు.

నిల్వ చేయుట :

(ఎ) మంధు గల ప్యాకేజిని ఇతర పస్వవులు నిల్వచేసి ఉంఛే గదులకు, లేదా ఆవరణలకు దూరంగా విడి గదులలో లేదా ఆఫరణలకు దూరంగా విడి గదులలో లేదా ఆఫరణలలో నిల్వచేసి ఉంచాలి. లేదా విడిగా అల్మారాలో ఉంచి తాళం పేయాలి. కీటకనాశని మందు స్వభావం, పరిమాణం బట్టి ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.

(బి) ఘంధు నిల్వఛేసీ ఉంఛే గధులు, లేదా ఆవరణలు బాగా నిర్మించబడి, బాగా ఫెలుతురు, గాలి ఫసు, తగినంత పెద్దవిగా ఉండాలి.

వాడేసిన, డబ్బాలను పారఫేయడం :

- (ఎ) ప్యాకేజీలను పగులగొట్టి, నివాస ప్రాంతాలకు దూరంగా భూమిలో పాతి పెట్టాలి. (బి) వాడేసిన ప్యాకేజీలను అరిగి వాడటం జరక్కుండా ఉండేందుకు వాటిని బయ్టట
- (సి) ప్యాకేజీలు, లేదా మిగులు పదార్థాలను, వాషింగ్లను పర్యావరణం, నీరు కలుషితంకాని విధంగా సురక్షితంగా పారపేయాలి.

వాడే ఫ్యక్తులు తీసుకోఫలసిన జాగ్రత్తలు :

- (ఎ) నీళ్ళలో కలిపేటప్పుడు లోపలికి పీల్చరాదు. ఛర్మంమీధ పడనివ్వరాధు. ఉట్టి చేతులతో కలుసకూడదు.
- (బి) మందు ఉపయోగించే వ్యక్తులు రక్షక దుస్తులు ధరించాలి. పీటిలో రబ్బరు గ్లౌజులు, బూట్లు ముఖ అచ్చాదం లేదా ఉష్ట్ మాస్క్, రబ్బరు కోటు, హేట్ ఉన్నాయి. (సీ) ఘంధు వాడే సమయంలో ఏదీ తినరాధు. జాగరాధు. పాగ్రతాగరాధు.

ఉత్పత్తిదారు :

నువోకెమ్ ఇండ్మస్టీస్ చ్రపేట్ లిమిటెడ్ ఎస్-3, ఎ/19, జగత్పూర్ ఇండ్ స్ట్రియల్ ఎస్టేట్ (న్యూ) జగత్పూర్, కటక్-754021 (ఒరిస్పా)

మార్కెట్టు చేయువారు : గో।దేజ్ ఎ।గొపెట్ లిమిటెడ్

రెజిష్టర్డ్ ఆఫీస్ : పిరోజ్ష్మానగర్ ఈస్టర్స్ ఎక్స్ట్రెపెస్ హైవే, విక్రోలి, ముంబాయి – 400079

2, 4-டி, சோடியம் உப்பு - 80% டபிள்யு.பி.

வீட்நாஸ் களைகொல்லி

தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட மூலிகை கொல்லிகள் அகலமான இலைகளை உடைய கலைகளையும், ஈரமான இடத்தில் வளர்கின்ற புல்லுகளையும் _________________ப்பிர்கள் பிரிக்கின்ற புல் நாற்றுகளையும் கட்டுப்படுத்துகிறது. வழிகாட்டுதல் :

வதுவட்டுதல் : பாதி அளவு நிரப்பபட்ட ஸ்ப்ரே தொட்டியில் 2.4-டி சோடியம் உப்பு 80% சேர்க்கவும் . நன்றாக கலக்கி மற்றும் தண்ணீரால் ஸ்பிரேயர் முழுவதும் நிரப்பவும் . ஒரு ஏக்கருக்கு 100 விட்டருக்கும் குறையாமல் இருக்கும் உயர்ந்த அல்லது மீடியம் கன அளவு கொண்ட ஸ்பிரேயர் பயனபடுத்தி தெளிக்கவும். மேலும் எல்லாப்பகுதியும் நன்றாக தெளிக்கவேண்டிய அவசியம் இருப்பதால் கலை அல்லது பயிர் அடாத்தியாக இருப்பின் ஒரு ஏக்கருக்கு 200 விட்டர் கன அளவு அதிகப்படுத்தி தெளிக்கவும். நல்ல பலன் பெறுவதற்க்கு கலைகள் சிறியனவாக இருக்கும்பொழுதே தெளிக்கவும் (2 லிருந்து 3 வரை இலைகள் இருக்கும் நிலையில்)

மருந்தின் அளவு:

(ஏ) தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கலை கட்டுப்பாடு : **நெல்** - நட்டபின் 21-28 நாட்களில் 400-450 கிராம்/ஏக்கரில் 200

பட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும். டோத் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும். **கோதுமை –** விதைத்த பிறகு 500-700 கிராம்/ ஏக்கர் அளவு 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து 28-35 நாட்களில் தெளிக்கவும். (பி) பயிர் வெளிவரும் முன் :

(பி) பயர் என்னமெரும் முன் : கரும்பு & சோஸ் - நட்ட அல்லது விதைத்த பிறகு 2-3 நாட்களில் 1கிலோ/ஏக்கர் அளவு எடுத்து தெளிக்கவும். (சி) தண்ணீரில் கானப்படும் கலைகள் - வாட்டர் ஹையாசிந்த் மற்றும் பிஸ்டியா சிறப்பு தெளிப்பான் 200-250 விட்டர் தண்ணீரில் 1-2 கிலோ/ஏக்கர் என்ற அளவில் கலக்கி தெளிக்கவும். கலையானது

மிகவும் அடர்த்தியாக வளர்வதற்க்குள் தெளிக்கவும். தேவையானால் 2-3 வாரத்திற்க்கு பிறகு அப்படிடே செய்யவும்.

சோளம் : விதைப்புக்கு 45 நாட்களுக்குப் பிறகு 10.30 லெம்ஸ் பயிர் உயாக்கில் மருந்கிடவும்.

உயரத்தில் மருந்திடவும். மருந்திடுவதற்கு உபயோகிக்கும் சாதனம். நேப்லேக் தெளிப்பான், காலால் இயக்கும் தெளிப்பான் அழுத்த நேப்லேக் பேட்டரி தெளிப்பான் மற்றும் 'ஏஎஸ்பிஇஇ-எச்டிபி பவுடர் தெளிப்பான் ஃப்ளேட் ஃபேன் மற்றும் ஃப்ளாட்டப் தெளிப்பான்.

த்கப்பட்ட அறிகுறிகள் பலவீனம், வயிற்றுப் போச்கு, வாய்மற்றும் அங்கம் இழுத்துக் கொள்ளுதல், சிலருக்கு கடும் காய்ச்சலும் வரலாம். சிறை நார் இழைபினவறல் அல்லது மார் அடைப்பினால் மரணம் நேரலாம். முதல் உதவீப் பணிகள் விமங்கியிளர்கால் கொண்டைக்கள் காகாரப்ப எர்படச் செய்து வார்கி

முதல் உதனப் பண்கள் விழுங்கியிருந்தால் தொண்டைக்குள் குறுகுறுப்பு ஏற்படச் செய்து வாந்தி எடுக்கவையுங்கள், வாந்தி திரவும் தெளிவாக இருக்கும் வரை திரும்பத் திரும்ப வாந்தி எடுக்க வைக்கவும். துணி மீது மருந்து பட்டிருந்தால் அதை சோப்பு போட்டு சுத்தம் செய்யவும்.

மருந்து சிகிச்சை வயிற்றுக்குள்ளே போயிருந்தால் வயிற்றிலுள்ள வற்றை வயாறு நகு காலள் போயாருந்தால் வயாற்ற இள்ள வற்றை காஸ்ட்ரிக்காவே இரும்றம் வெளிவரச் செய்யவேண்டும். மொய்டோனியா மற்றும் சிறை நார் கிழைவிளவு இருந்தால் குவிண்டரிங் சல்டேட் உதவி செய்யலாம். நோய் அறிகுறிக்கு த்தக்கபடி சிகிச்சையளிக்கவும்.

உபயோகிப்பதற்கான வரம்புகளும் முன் எச்சரிக்கையும். உபயோகிப்பதற்கான வரம்புகளும் முன் எச்சரிக்கையும். பருத்தி, உருணைக்கிறும்கு , புகையிலை, மிள்காய் தக்காளி, திராட்சை ஆகிய பயிர்களுக்கு அருகில் உள்ள பயிர்கள் மீது தெளிக்காதீர்கள், ஏனெளில் அவை மிக்கபும் பாதிக்கப்படக் கூடியவை, மீன்களை பாதிக்கக்கூடிய நிலைமைகளில் உபயோகிக்காதீர்கள், மருந்து தெளிக்கப்பட்ட பகுதிகளிலிருந்து இரண்டு வராங்களுக்காவது கால்நடைகளை விலக்கி வைக்கவும். விதைகள், ரசாயன உரங்கள் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளிலிருந்து அப்பால் தள்ளி வைக்கவும்.மருந்தை சுவாசிக்கவோ, வெறுங்கைகளால் கலத்தலோ செய்யாதீர்கள். **சேமித்துவைத்தல்**

ப் பகுதுலைத்தல் கட் பகுத்து உள்ள பேக் கேஜ்களை தனி அறைகளில் அல்லது கட்டங்களில் சேமித்துவைக்கவும். அவை பிறபொருள்கள் சேமித்து வைத்துள்ள அறைகள் அல்லது கட்டங்களிலிருந்து தள்ளியிருக்க வேண்டும்.

அல்லது தனி அலமாரியில் பூட்டி வைக்க வேண்டும். பூச்சிக்கொல்லியின்இயல்பையும் அளவையும் பொறுத்து அப்படி வைக்கவேண்டும்.

வைக்கவேண்டும். ஆ) மருந்துவைப்பதற்கான அறை அல்லது கட்டங்கள் நன்கு கட்டப்பட்டு, நல்ல வெளிச்சத்துடனும் காற்றோட்ட முள்ளதாகவும். போதுமான பரிமானங்க குடலும் இருக்கவேண்டும். உபயோகித்த டப்பாக்களை பைசல் செய்தல்

ஆ) உப்போன்றது உப்பான்களை காப்பூல் பிருதல் அ) டப்பாவை உடைத்து, வசிப்பிடத்திற்கு அப்பால் புதைக்க வேண்டும். ஆ) உபயோகித்த டப்பாக்களை மீண்டும் பயனடுத்துவதை தடுப்பதற்கு

ஆ) உபலபாகத்த பபாகணை மண்டும் பயனிழத்துவதை தடுப்பதற்கு அவற்றை வெளியில் வீட்டு வைக்க கூடாது. இ)பேக்கேஜ்களும், உபரிகளும், கழிவுகளும் சுற்றுச் சூழலையும் நீரையும் மாசுபடுத்தமல் பத்ரமாக பைசல் செய்யப்பட வேண்டும். உபயோகிபாளர்களுக்கான முன் எச்சரிக்கை

உப**்பாகப்பாளாகளுக்கான முன எசசாக்கை** அ) மருந்து கரைத்கும் போது நெடியை கவாசிக்ககவோ, சருமத்தில் படுவதோ கூடாது. வெறுங்ககைகளால் கலக்கக் கூடாது. ஆ) உப்போகிப்பவர்கள் முழுபாதுகாப்பு உடைகள் அணிய வேண்டும். ரப்பர் கையுறைகள், யூடஸ்கள், முகமறைப்பு அலஸ்லது தூகமுகமுட்டி

ஒவர் ஆல் ரப்பர் ஆயரன் தலை அல்லது ஹேட். இ) மருந்தை கையாளும் போது சாப்பிடவோ எதையும் பருகவோ, புகை பிடிக்கவோ கூடாது.

தயாரித்தது :

ஸூவோசெம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் (பி) லிமிடெட்

எஸ்-3, ஏ/19, ஜகத்பூர் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் (புதியது) ஜகத்பூர், கட்டாக் 754021 (ஓரிஸ்ஸா)

விற்பனையாளர் : கோத்ரிஜ் அக்ரோவெட் லிமிடட்

பதி. அலுவலகம் : பிரோஷ்நகர் கிழக்கு எக்ஸ்பிரஸ் நெடுஞ்சாலை விக்ரோலி, மும்பை-400079

2, 4-ಡಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಸ್-80% ಡಬ್ಲೂಪಿ.

ವೀಡ್ ನಾಶ್ "ಕಳೆನಾಶಕ"

ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಕಳೆಗಳನ್ನು, ತೃಣವರ್ಗದ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಕಳೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲು ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಇದರ ಬೀಜಗಳ ಮೋಳೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಳಿಸಿ ನಂತರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದ ಅದಲ್ಲದೇ ಬೆಳೆಯ ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬಳಕ: "ಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಎಂದರೆ 2,4–ಡಿ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಕ್ 80% ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನೋಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಕೊಷ್ಟ 100 ಲೀ. ನೀರನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಡರ್ಡ್ 'ಪ್ರ' ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಂ ತುರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಉತ್ತಮ ಸಾಂಧ್ವೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಆಗತ್ಯಕ್ಷನುಗುಣವಾಗಿ 200 ಲೀ. ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಲಾಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಲುವದರಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಬೆಳೆ ಬತಾಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಆಗ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕಳೆ ಅಥವಾ ಗಿಡಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಾಗ ಇದನ್ನು ಬಳಸುವದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಭಾವ ಇರುತ್ತದೆ.

(2-3ರ ಎಲೆಗಳ ಅಂತದಲ್ಲಿ). ಔಷಧದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಡೋಸೇಜ್ :

(ಎ) ಸೆಲೆಕಿಫ್ ಇಂಟರ್-ರೋ ವೀಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್:

ಭತ್ತ –400–450 ಗ್ರಾಂ/ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಗಿಡ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿದ 21–28 ದಿನಗಳ

ನಂತರ 200 ಲೀ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಗೋದಿ – 500–700 ಗ್ರಾಂ/ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ 28–35 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 200 ಲೀ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.

(ಬಿ) ಪೀ-ಕ್ರಾಪ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ ಓವರ್ಆಲ್ ಇನ್ :

ಕೆಬ್ಬು ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ – 1 ಕೆ.ಜಿ./ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ (ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ 2–3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. (ಸಿ) ನೀರಿನ ಕಳೆಗಳು – ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಂಸಿತ್ ಮತ್ತು ಪಿಸಿಯಾ ಎಸ್.ಪಿ. ಸ್ಟೇ ಓವರ್ ಆಲ್ 1-2

ಕಿ.ಜಿ./ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 200-250 ಲೀ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಕಳೆಗಳು ಹೊಳಪು ಬರುವದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ 2-3 ವಾರಗಳ ನಂತರ ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ.

ಸೋರ್ಗಮ್: ಬಿತಿದ 45 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಗಿಡದ ಎತರ 10-30 ಸೆ.ಮಿ. ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ.

ನಾಪ್ ಸ್ಕ್ರಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೇಯರ್, ಫುಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಯರ್ ಕಂಪ್ರಷನ್ ನ್ಯಾಪ್ ನ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೇಯರ್ ಮತ್ತು ಆಸಿ ಎಚ್ ಟಿಪಿ ಫುಡಿ ಸ್ಟೇಮಾಡುವ ಅಗಲದ ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಡೆಡ್ ಜಿಟ್ ಸ್ಟೆಯರ್.

ವಿಷಪ್ರಯೋಗವಾದ ಸೂಚನೆಗಳು:

ನಿಶ್ವಕ್ತಿ, ಅತಿಸಾರ, ಬಾಯಿಯ ವುತ್ತು ಕೈಕಾಲುಗಳ ಸ್ಕ್ರಾಯುಗಳ ನಿಶ್ವಲನೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೈಪರ್ ಫೈರಾಕ್ಷಿಯಾ ಆಗಬಹುದು. ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಅಥವಾ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಬ್ರಿಲ್ಫೆಶ್ವನ್ ಆಗಿ ಸಾವುಂಟಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಜಿಕಿತಾ ಕೃಮಗಳು: ನುಂಗಿದ್ದರೆ, ಕತ್ತಿನ ಹಿಂಭಾಗ ಉಜ್ಜಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಿ. ವಾಂತಿ ನಿರಾಳವಾಗಿರುವ ವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗಲಿದ್ದರೆ, ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.

ಡ್ರಗ್ ಥೆರಾಪಿ: ನುಂಗಿದ್ದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ವಚ್ಛಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಮೈಟೋನಿಯಾ ಅಥವಾ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯು ಲರ್ ಫೈಬ್ರಿಲ್ಲೆಶನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕ್ವಿಂಡ್ರಿಂಗ್ ಸಲ್ಫೆಟ್ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಯಾಗ

ಬಳಕೆಗೆ ಸೀಮಿತತೆ ಮತ್ತು ಮುಂಜಾಗರೂಕತೆ :

ಹತ್ಯಿ ಅಲೂಗಡೆ, ತಂಬಾಕು, ಮೆಣಸು, ಟೊಮೊಟೊ ಮತು ದ್ಯಾಕಿ ಬೆಳೆಗಳು ನಾಜೂಕಿನವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಬೆಳೆಗಳ ಸಮೀಪ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ.ಮೇನುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವಿರುವ ಸಾದ್ವತೆಯಿದಾಗ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ. ಹುರಳಿಯಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ. ಸಿಂಪಡಿಕೆಯಾದೆಡೆ ಕನಿಷ್ಠ 2 ವಾರಗಳ ವರೆಗೆ ದನಕರುಗಳನ್ನು ಮೇಯಲು ಬಿಡದಿರಿ. ಬೀಜ ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಸಮೀಪ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬೇಡಿ. ಅಫ್ಯಾಣಿಸಬೇಡಿ. ಬರಿಗ್ನಯಿಂದ ಮಿತ್ರಮಾಡಬೇಡಿ.

ದಾಸಾನು:

1 ಕಳೆನಾಶಕ ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಡಿ. ಅದು ಇತರ ವಸುಗಳನು ಸಂಗಹಿಸುವ ಕೋಣೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲಿ. ಅಥವಾ ಪತ್ರೇಕ ಆಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಹಾಕಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತು ಸ ರೂಪವನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತದೆ.

ಅದನುಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ಕೋಣೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಚಿನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಮತು ಸಳವಕಾಶ ಇರುವಂತತಾದಾದ ಗಿರಬೇಕು.

ಬಳಸಿದ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳ ನಿವಾರಣೆ :

(a)ಜನವಾಸ ಇರುವೆಡೆಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಒಡೆದೂ ಹೊತಿಡಿ. (b) ಪ್ರನಬನಳಕೆಯಾಗದಂತೆ, ಖಾಲಿ ಡಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆಲ್ಲೂ ಬಸಾಕಬೇಡಿ. (c) ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗಳು ಉಳಿದ ಕೀಟನಾಶಕ ಮತ್ತು ತೊಳೆದ ನೀರು. ಇತಾಯದಿಯನ್ನು ಸುರಕಿತವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಿದಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ವಾಯು ಅಥವಾ ಜಲ ಪ್ರದೂಷಣ ಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಬಳಕೆದಾರರು ವಹಿಸ ಬೇಕಾದ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ :

(a)ಸಾಂದ್ರತೆ ತಗ್ರಿಸುವಾಗ, ಅಫ್ಯಾಣೆಸದಂತೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೋಕದಂತೆ ಎಚ್ರಕೆ ಬಹಿಸಿ ಬರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಮಾಡಬೇಡಿ.

(b) ಪ್ರಯೋಗಿಸುವವರು ಮೈಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಬಟ್ಟಿ ಧರಿಸಬೇಕು. ರಬ್ಬರಿನ ಕೈಚೀಲ ಭೂಟ್, ಮುಖ ಕವಚ ಆಥವಾ ಡಸ್, ಮಾಸ್ತ್ ಮೇಲಂಗಿ, ಆಥವಾ ಇಡಿಯ ರಬ್ಬರಿನ ಮೇಲಂಗಿ, ಹ್ಯಾಟ್ ಧರಿಸಬಹುದು.

(c) ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ವೇಳೆ, ಕುಡಿಯುವುದು, . ತಿನುವುದು ಅಥವ್ ಧೂಮಪಾನಮಾಡಬೇಡಿ.

ತಯಾರಿಕರು :

ಸುವೊಕೆಮ್ ಇಂಡಸ್ಪೀಸ್ ಪೈಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಸ್-3, ಎ/19, ಜಗತ್ಪೂರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ರೇಟ್ (ನ್ಯೂ) ಜಗತ್ಫಾರ್, ಕಟಕ್- 754 021 (ಒರಿಸಾ)

ಮಾರಟಗಾರರು:

ಗೋದ್ರೇಜ್ ಆಗ್ರೋವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ರಿಜಿಸರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್: ಪಿರೋಜ್ಶಾ ನಗರ್ ಈಸ್ಫರ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರ್ಯಸ್ ಹೈವೇ, ವಿಖ್ರೋಲಿ, ಮುಂಬಯಿ - 400079