

ବୀଡନାଶ

ଆଗାହାନାଶକ

୨,୫-ଡି ଆମିନ ଚଲ୍ଟ ୫୮% ଏଚ. ଏଲ.

ବର୍ଷ ପତ୍ୟା ବନ ଟେକିଆ ଜାତୀୟ ବନ ଆବ୍ ଗଜଲି ଧବା ଦୁର୍ବଳି ଜାତୀୟ ବନ ଆଦି ଅନାଗତିଆଳେ ଉଦ୍ଭିଦ ନାଶ ପର୍ବା କରବି ଏବିଷ ବିଶେଷ ଧବନବ ଉଦ୍ଭିଦ ନାଶକ ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ :

ପାନୀରେ ଆଧା ଭରି ଥକା ସ୍ପ୍ରେ ଟେକ୍ସତ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ପରିମାଣ ୨୫ ଡି ଚିଡିଆମ ଚଲ୍ଟ ଭାଲଦରେ ମିହଲାଇ, ପାନୀରେ ପରାହି ନିୟକ । ପ୍ରାଚଳିତ ନିରିକ୍ଷର, ହାହି ବା ମିଡିଆମ ଭଲିଓମ ସ୍ପ୍ରେୟାରବ ଶ୍ଯାସା ସ୍ପ୍ରେ କରବି । ସ୍ପ୍ରେର ପରିମାଣ ପ୍ରତି ଏକ ବତ ୧୦୦ ଲିଟାରବ କମ ଯେନ ନହୟ । ଉଦ୍ଭିଦବୋର ଯଦି ଠାହି ଖାହି ଗଜିହେ, ତେନେହ୍ଲତ ଭାଲଦରେ ବିୟପାବର କାସେ ଏକବତ ୨୦୦ ଲିଟାର ହିଟାସେ ପ୍ରୟୋଗ କରବି । ଆଶନୁରାପ ସୁହ୍ଲ ପାବହେ, ଏହି ଘାହ ବନ କୁମଳୀୟା (୨-୩ ପତୀୟା ଅବହ୍ଯା) ହି ଥାକୋତେହି ସ୍ପ୍ରେ କରବି ।

(କ) ନିମୋକ୍ତ ଶସ୍ୟର ମାଜତ ବନବୀୟା ଉଦ୍ଭିଦ ବାଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରବି ।

ଧାନ : କଟିୟା ବୋବାର ୨୧-୨୮ ଦିନର ପାହ୍ତ, ଏକବେ ପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟାର ପାନୀତ ୫୦୦-୬୦୦ ମି ଲି ହିଟାସେ ।

ସେହ : ଗଜାଲି ଓଲୋବାର ୨୮-୩୫ ଦିନର ପାହ୍ତ, ଏକବେ ପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟାର ପାନୀତ ୫୦୦-୬୦୦ ମି ଲି ହିଟାସେ ।

(ଖ) ନିମୋକ୍ତ ଶସ୍ୟ ଗଜି ଉଆର ଆଗତେ ସର୍ବକ୍ଷୁ ।

କୁହିୟା ଓ ଗୋମଧାନ : ବୋରାର ଗଜାଲି ଧବା, ୨-୩ ଦିନ ପାହ୍ତ ପ୍ରତି ଏକବତ ୧ ଲିଟାର

(ଗ) ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ : କଟୁରି ପାନା ପିଠିୟା ସ୍ପ୍ରେଟି । ପ୍ରତି ଏକବତ ୨୦୦-୨୫୦ ଲିଟାର ପାନୀତ ୧-୨ ଲିଟାର ହିଟାସେ । ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ଠାହି ଖାହି ଡାଟ ହି ପରାବ ଆଗତେ ସ୍ପ୍ରେ କରବି । ଦରକାର ହେ ୨-୩ ସପ୍ତାହର ପାହ୍ତ ଆକୋ ଏବାର ପ୍ରୟୋଗ କରବି ।

ଚା : ୨୦୦ ଲିଟାର ପାନୀତେ ୫୦୦-୬୦୦ ମି ଲି ଓଷ୍ଠ ପ୍ରତି ହାକ୍ ଟେୟାର ମିଲାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରବି ।

ସତର୍କତା :

ଏହି ଓଷ୍ଠ ପ୍ରୟୋଗର କାସେ ବ୍ୟବହାର କରା ଆହିଲା ପାତି, ଅନ୍ୟ କୀଟନାଶକ ସ୍ପ୍ରେ କରବିଲେ ବ୍ୟବହାର କରାବ ଆଗତେ ଭାଲଦରେ ଥୁହି ଲବ । ଶସ୍ୟର ଖୁଟି, ସାର ଆବ୍ କୀଟନାଶକର ଓଚବତ ନଥବ । ଶୁଦା ହାତେବେ ନିମିହାବ । ସ୍ପ୍ରେ ବାସ୍ପକନାର ପ୍ରତିକୂଳତ ନାଧାକିବ । କମେ ଓ ଦୁସ୍ତାହଲେକେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରୟୋଗ କେନ୍ଦର ପରା ଦୁର୍ବତ ବାଧିବ ।

ବିସାକ୍ରିୟାର ଲକ୍ଷଣ :

ଦୁର୍ବଳତା, ଏଲାହ, ଆଡୋକ, ମୁଖର ଓ ଆନ ଅସ୍ପତ୍ତାସର ମାଂସପେଶୀ କନ୍ଦିୟାହି ଧବା, ପେଶୀ କମ୍ପନ, ହାଞ୍ଜକମ୍ପନ ବନ୍ଦ ହବର ଉପକ୍ରମ ଇତ୍ୟାଦି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶିତ ହବ ପାରେ । ଅତିମାତ୍ରା ବିସାକ୍ରିୟାର ଫଳତ, ଅସାଧାରଣ ଭାବେ ବେହି ଶରୀରର ଉତ୍ତାପ ବାଧିକ ସ୍ନାୟୁ ଫୁଲି ଥକା ଦୋଷ ଇତ୍ୟାଦି ଜାତି ଲକ୍ଷଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହବ ପାରେ ।

ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା :

ବିଷ ଗିଲି ଖାଲେ, ଡାଣ୍ଡର ଚାମୁଚେ ଏଚାମୁଚ ନିମିଷ ମିହଲୋବା । କୁହୁମିୟା ଗର୍ଭମ ପାନୀ ଏଗିଲାଚ ଧୁରାହି ବମି କରୋବାର । ବମି ପରିହାର ନୋହୋରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବ୍ୟବହାର ମୋହରାହି ଧାକିବ । ପିନ୍ଧା ଯାଜ୍ଞୋହାକ ଦୁଷିତ ହଲେ, ଖୁଲି ଥିେ ଗାର ଛାଲ ଚାବେନ ପାନୀରେ ଘରି ପ୍ରଚୁର ପାନୀ ମାରି ଥୁହି ପେଲାବ । ଏହି ଓଷ୍ଠ ଚକୂତ ସୋମାଲେ କମେ ଓ ୫ ମିନିଟ ପାନୀ ମାରି ଚକୂ ଥୁହି ପେଲାବ ।

ପ୍ରତିଷେଧକ :

ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରି ପାମ୍ପର ସାହାୟତା ପାକହୁଲୀ ପରିହାର କରବି । ପେଶୀ କମ୍ପନ ଆବ୍ ହାଞ୍ଜକମ୍ପନର ଉଷ୍ଣତା ସମ୍ପନ (ଡେକ୍ଟିକୂଲାର ଫାହିବ୍ରିଲେନ) ନିୟନ୍ତ୍ରଣତ ବାଧିବିଲେ କୁହିନିଡାହିନ ଚାଲଫେଟ ଦିୟକ । ତାର ଲାଶେ ସହାୟକାରୀ ଲକ୍ଷଣ ଉପଯୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ଚଲାହି ଥାକକ ।

ବ୍ୟବହାର ସୀମା :

ପଥାରବ ଓଚାବେ ପାଜରେ ଯଦି କପାହ, ଆଳୁ, ଧପାଭ, ଜଳକୀୟା, ବିଲାହି ଆବ୍ ଆଣ୍ଡର ଧେତି ଥାକେ ତେନେହ୍ଲତ ପଥାରତ ପ୍ରୟୋଗ ନକରବି, କିୟାକୋ ଏହିବୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନାଶପ୍ରବଣ । ଉର୍ବହୀଜାତୀୟ ଶସ୍ୟତ ପ୍ରୟୋଗ ନକରବି । ହିୟାର ପ୍ରୟୋଗେ ଏହି ଫଳର ଫଳିତ କରେ । ମାଛର ଫଳିତ ହୋରାବ ସନ୍ତାନବା ଧାକିଲେ ପ୍ରୟୋଗ ନକରବି ।

ସଂବନ୍ଧନ :

ସି କୋଥାଲି ବା ଠାହି ଅହିନ ବନ୍ତୁ ବାଧିବର କାସେ ଓ ଦରକାର ତାତ ଏହି ଓଷ୍ଠର ବାକସ, ଟେଲା, ମୋନା ଇତ୍ୟାଦି ପେକେଜବୋର ନାବାଧି, ଆତବର ଧିକୋନୋ କୋଥାଲି ବା ଠାହିତ ଥବ । ନହେଲେ ଓଷ୍ଠର ଧବନ ଓ ପରିମାଣର ଓପରତ ନିର୍ଭର କରବି ବେଲେଗ ଆଲମାରୀତ ତଲା ମାରି ବନ୍ଦ କରବି ବାଧିବ ଏହି ଓଷ୍ଠ ବଧା କୋଥାଲି ବା ତେନେ ଅହିନ ସ୍ନାନ ମଜବୁତଭାବେ ତେୟାରୀ, ଶୁକାନ, ମୋହର ବାୟୁର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଥକା ଆବ୍ ଆହଲ ବହଲ ହୋରା ଦରକାର, ଯାତେ ଓଷ୍ଠର ଡାସେ ବାୟୁ ଦୁଷିତ କରବି ବାଧିବ ନୋରବେ ।

ଓଷ୍ଠଧମାର, ଯନ୍ତ୍ର ଧୋରା ପାନୀ, ଅତିରିକ୍ତ ଓଷ୍ଠ ନଷ୍ଟ କରା ପ୍ରଣାଳୀ :

ପେକେଜବୋର ଡାଢି ଆବାସହ୍ଲର ପରା ଦୁର୍ବତ ପୁରି ପେଲାବ । ଦନାହି ବ୍ୟବହାର କରାବ ପରା ବିସତ ବାଧିବିଲେ ଖାଲି ପେକେଜବୋର ବାଧିବତ ପେଲାହି ନଥବ । ପେକେଜା ଅତିରିକ୍ତ ପେଲିନ ଯୋରା ଓଷ୍ଠ ଆବ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଧୋରା ପାନୀ ଏନୋଭାବେ ନଷ୍ଟ କରବି ଯାତେ ତାର ପରା ଟୋପାଶର ପରିବେଶ ବା ଜଳାସ୍ଥୟ ଦୁଷିତ ନହୟ ।

ପ୍ରସ୍ତୁତକାରକ : ଶୁଭକେମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ

ଏସ-୩ଏ-୧୧ ଜଗତ୍ ପୁର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏସ୍ଟେଟ (ନିଉ), ଜଗତ୍ ପୁର, କଟକ-୭୫୧୦୨୧

ବିକ୍ରେତା : ଗୋଦରେଜ ଏଗ୍ରୋବେଟ ଲିମିଟେଡ

ପଞ୍ଜିକୃତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ-ଫିରୋଜ୍‌ଶା ନଗର, ୟୁନିଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହାହିବେ, ବିକ୍ରୋଶୀ, ମୁହୂର୍-୫୦୦୦୭୯

ବିଡନାଶ

ଅରମା ନାଶକ ଓଷ୍ଠ

୨, ୪-ଡି ଏମିନ ସଲ୍ଟ, ୫୮% ଏସ. ଏଲ.

ଏହି ଅରମା ନାଶକ ଓଷ୍ଠ ବିଶେଷ ଚଉଡ଼ା ପତ୍ର ଯୁକ୍ତ ଅରମା, ବହୁଆଁ, ଖରି ଇତ୍ୟାଦି ଗାଧର ଚାରା ବିନାଶକରେ ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ : ଅଧାରା ଶ୍ରେଣୀଙ୍କରେ ପାୟୋଜନୀୟ ୨, ୪-ଡିଏମିନ ସଲ୍ଟ, ୫୮% ମିଶ୍ରାନ୍ତ । ଭାଲକରି ମିଶ୍ରାଭବା ପରେ ଶ୍ରେୟାରଚିତ୍ତ ପାଣିଦେଲ ପୂରା କରି ଦିଅନ୍ତୁ । ଯେ କୋଣସି ଶ୍ଯାୟାର୍ତ୍ତ ସାଲକର, ହାଲ କିଂବା ମିଡିୟମ ଭଲିଭସ ଶ୍ରେୟାରଦେଲ ଶ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ କମ ପକ୍ଷେ ୧୦୦ ଲିଟର ପାଣିର ଦରକାର । ଅରମା କିଂବା ଫସଲର ଗଛ ବହଳିଆ ହେଲେ ମିଶ୍ରଣର ପରିମାଣ ୨୦୦ ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ସବୁ କାରଣରେ ଏ ଓଷ୍ଠ ଉଲକରିପଡ଼ିବା ଦରକାର । ଅରମା ଯେତେବେଳେ ହୁଲପତ୍ର କିମ୍ବା ଚିନିପତ୍ର ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଓଷ୍ଠ ଶ୍ରେ କଲେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ।

ମାତ୍ରା : (କ) ନିୟୋକ୍ତ ଶସ୍ୟ ଶେଷତରେ ଶସ୍ୟ ସମୂହର ମଧ୍ୟକୁ ବିଶେଷ ଧରଣ ଅରମା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଓଷ୍ଠଧର ମାତ୍ରା ହେବ ।

ଧାନ : ଚାରା ରୋପଣ କରିବାର ୨୧ ଠାରୁ ୨୮ ଦିନପରେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୪୦୦-୫୦୦ଗ୍ରାମ୍ ଓଷ୍ଠ ମିଶ୍ରାଲ ଶ୍ରେ କରିବେ ।
ଗହମ : ଅଙ୍କୁର ଗଜାଇବାର ୨୮ ଠାରୁ ୩୫ ଦିନପରେ ଏକରପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫୦୦-୬୦୦ ଗ୍ରାମ ଓଷ୍ଠ ମିଶ୍ରାଲ ଶ୍ରେ କରିବ ।

(ଖ) ନିୟୋକ୍ତ ଶସ୍ୟ ଉପର ପୂର୍ବରୁ ଜମିର ଚାରିଆଡେ ପକାଇବା ମାତ୍ରା ହୋଇଛି ।
ଆଖୁ ଓ ମକା : ରୋପଣ / ବୁଣିବାର ୨/୩ ଦିନପରେ ଏକର ପ୍ରତି ୧ କିଲୋ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ବାବଧାନତା : ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ତ୍ତନାଶକ ଓଷ୍ଠ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରେ କରିବାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଭାଲକରି ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରିନିଅନ୍ତୁ । ବିହନ, ସାର, ଓ କାର୍ତ୍ତନାଶକ ଓଷ୍ଠ ପାଖାପାଖି ରଖିବେ ନାହିଁ । ଖାଲି ହାତରେ ମିଶାଇବେ ନାହିଁ । ଶ୍ରେୟାର ପାଣି ଯେପରି ଦେହରେ ନପଡ଼େ । ଲକ୍ଷ ରଖିବେ ଏ ଓଷ୍ଠ ଶ୍ରେ କରିବା ଯାଗାରେ ୨ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହ ପାଳିତ ପଶୁକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ।

ବିଷ କ୍ରିୟାର ଲକ୍ଷଣ : ଏହି ଓଷ୍ଠ କନିତ ବିଷ କ୍ରିୟାର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳତା, ଆହାର, ଅନିଦ୍ରା, ପେଟ ଚାଣିବା ସାରା ଶରୀରରେ ପେଶି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ କମ୍ପନ ଏବଂ ଧୀରେ ହୃତ ପିଣ୍ଡର କ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦୁର୍ବଳତା ଓ ଉତ୍ତାପ ଦେଖା ଯାଏ ।

ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା : ଏଇ ଓଷ୍ଠ ଯଦି ତେହି ପକାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଲକ୍ଷତ୍ ଉଷ୍ଣ ପାଣିରେ ୨ ଚମଚ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ବାନ୍ତି କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ବାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଷ୍କାର ନା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲବଣମିଶ୍ରା ଜଳ ଖୁଅଇବେ । ଜୀବାଳପତ୍ରରେ ଏ ଓଷ୍ଠ ଲାଗିଥିଲେ ଭଲ ଭାବେ ସାବୁନଦେଇ ପରିଷ୍କାର କରିବେ । ଏଇ ଓଷ୍ଠ ଅଖିରେ ଲାଗିଲେ କମ ପକ୍ଷେ ୫ ମିନିଟ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଅଖି ପରିଷ୍କାର କରି ନିଅନ୍ତୁ ।

ପ୍ରତିଷେଧକ : ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ପଶୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ପେଟ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ । ପେଶିର କମ୍ପନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଓ ହୃତ ପିଣ୍ଡର କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି ଚାଲୁ କରିବାକୁ କୁଇନାଇନ୍ ସଲଫେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଲକ୍ଷଣାୟ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।

ନିଷେଧ : ତୁଳା, ଆଳୁ, ଧୁଆଁପତ୍ର, ବିଲାତି, ଲଙ୍କ ଓ ଅଙ୍କୁର, ଜମିର ଲଗାଇଲି ଜମିରେ ଓଷ୍ଠ ଶ୍ରେ କରିବେ ନାହିଁ । କାରଣ ଅତି ସହଜରେ ଏ ସବୁ ଫସଲର କ୍ଷତି ହୁଏ । ରବି ଯାତୀୟ ଫସଲରେ ଏ ଓଷ୍ଠ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ମାଛର କ୍ଷତି ହେବ । ଏପରି ଯାଗାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ ।

ସଂରକ୍ଷଣ : ଏଇ ଓଷ୍ଠ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପରିମାଣ ଓ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ରଖିବା ଘର ଅଥବା ଜଗାଠାରୁ ପୃଥକ ଘର କିମ୍ବା ଜଗାରେ ଆଲମାରିରେ ରଖି ଚାଲାଇ ପକାଇବେ । ବାଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ସଂକ୍ରମଣ ନା ହୁଏ ତା ପାଇଁ ଏଇ ଅରମା ନାଶକ ଓଷ୍ଠ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଖିଳା ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଅଲୋକ ପବନ ଯୁକ୍ତ ବଡ଼ ଜଗା ଦରକାର ।

ଖାଲି ପାତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଆଦି ଧୂଆପାଣି ଏବଂ ବଞ୍ଚିଥିବା ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ କରା ଖାଲି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଲୋକ ବସତିଠାରୁ ଦୂରରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ । ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଧୂଆପାଣି ଓ ଶ୍ରେ ଚ୍ୟାଲରେ ପାଣିକୁ ଏପରି ନଷ୍ଟ କରିବେ ଯେପରି ପରିବେଶ ତଥା କୋଣସି ଜଳାଶୟ ଦୂଷିତ ନା ହୁଏ ।

ପ୍ରସ୍ତୁତ କାରକ :

ଗୁରୁକେମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ
ଫାକ୍ତରୀ : ଏସ୍-୩, ଏ/୧୯, ଜଗତପୁର, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ (ହୃତନ)
ଜଗତପୁର, କଟକ - ୭୫୪୦୨୧

ବିତରକ :

ଗୋଦରେଜ ଏଗ୍ରୋବେଟ ଲିମିଟେଡ

ଫିରୋଜ୍‌ଶା ନଗର, ଇସ୍‌ଚର୍ନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହାଲକ୍ସେ, ବିକ୍ରୋଶୀ,

ମୁମ୍ବାଇ-୪୦୦୦୭୯

PESTICIDE FOR AGRICULTURAL USE ONLY

WEEDNASH

HERBICIDE

2,4-D Amine Salt 58% S.L.

INSTRUCTIONS



Customer Care: 0671-2491342
e-mail: sipl_ct@rediffmail.com

IS : 1827



CM/L-0005112036

Manufactured by :

SUVOCHEM INDUSTRIES PVT. LTD.

S-3, A/19, JAGATPUR INDUSTRIAL ESTATE (NEW),
JAGATPUR, CUTTACK-754 021

Marketed By :

GODREJ AGROVET LIMITED

REGD. OFFICE : PIROJSHANAGAR,
EASTERN EXPRESS HIGHWAY
VIKROLI, MUMBAI-400 079

वीडनाश

हरवीसाईड

२,४-डी अमीन सॉल्ट ५८% एस.एल.

चौड़ी पत्तियोंवाला मोथा-फूस और कीचड़-पानी में उगनेवाली फालतू हरियाली को नष्ट करने में एक आदर्श तृण-नाशक।

प्रयोग की विधि

आधे पानीवाले टैंक में २, ४-डी सोडियम नमक ५८% एस. एल. की आवश्यक मात्रा डालिए। उसे अच्छी तरह मिलाए और फिर स्प्रेअर में पानी भर लीजिए। खेत में इस मिश्रण को **हार्ड-वॉल्यूम** विधि से छिड़किये या **मीडियम वॉल्यूम** विधि से यह जरूरी है कि स्प्रैअर प्रमाणिक हो और घोल प्रति एकड़ १०० लीटर से कम पानी में तैयार किया गया न हो। मोथा या फसल घनी हो तो मात्रा २०० लीटर प्रति एकड़ कर दीजिए ताकि यह मिश्रण पत्ते-पत्ते तक पहुँच सके। सबसे अच्छा यह है कि २-३ पत्तियाँ उगते ही इसे मोथे पर इस्तेमाल किया जाये।

मात्रा

(क) क्यारियों के मोथे के विशेष नियंत्रण के लिए

धान : २०० लीटर पानी में ४०० से ४५० ग्राम दवा प्रति एकड़ रोपाई के २१-२८ दिनों बाद छिड़किए।

गेहूँ : २०० लीटर पानी में ५०० से ७०० ग्राम दवा प्रति एकड़ बोआई के २८-३५ दिनों बाद छिड़किए।

(ख) फसल उगने के पहले उगनेवाले आम घास-फूस के लिए -

गन्ना और मक्का : प्रति एकड़ १ लीटर दवा गन्ने का बखुवा लगाने-मक्का बोने के २-३ दिन बाद।

(ग) पानी का मोथा - फूलदार पीधों (हायसिथ) और पिस्सियाँ स्प्रै के नाश के लिए - २०० से २५० लीटर पानी में १ से २ लीटर दवा प्रति एकड़-सारे पानी पर छिड़किये। मोथा घना या बलदार बनने से पहले ही आवश्यक हो तो, २-३ सप्ताह बाद दुबारा छिड़किये।

चाय : २०० लीटर पानी में ५००-६०० मिलि दवा मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिड़किये।

सावधानियाँ :

किसी दूसरे कीटनाशक के लिए उपयोग करने के पहले स्प्रैअर व दूसरे उपकरणों को अच्छी तरह से धो लीजिए। इस दवा को बीज, खाद तथा दूसरे कीटनाशकों के पास संग्रह न करें। इसका घोल हाथ नंगे रखकर मत तैयार कीजिए। इसकी फुहार से दूर रहिए। छिड़काव वाली जगह में पशु-परिदों को कम-से-कम दो सप्ताह तक विचरने न दीजिए।

विष-बाधा के लक्षण :

कमजोरी शिथिलता, भूख मर जाना, दस्त, मुँह तथा अन्य अवयवों के रगपुट्टों का तनाव, स्नायु कंपन और हृदय की गति का मंद हो जाना। ज्यादा खराब स्थिति में बहुत ही तेज बुखार और नस-नस में छिटपुट पीड़ा भी।

प्राथमिक उपचार :

यह दवा निगली गई हो तो एक गिलास गर्म पानी में बड़ा चम्मच भर नमक घोलिए और इसे पिलवाकर पीड़ित व्यक्ति को के करवाइए। कपड़ों में दवा लग जाने पर कपड़े बदल डालिए। साबुन और पानी से त्वचा को मली भाँति धो लेने के बाद, उसे भरपूर पानी से और साफ कर लीजिए। दवा आँख में पड़ जाने पर, कम-से-कम ५ मिनट तक आँखों को भरपूर पानी लेकर धो लीजिए।

विष-निवारण :

गैस्ट्रिक लेवेज विधि से पेट साफ कीजिए। रगपुट्टों के कंपन और हृदय प्रवेशों के तन्तु ह्रास की रोकथाम के लिए पीड़ित व्यक्ति को विनिडाइन सल्टेक के अलावा दूसरी सहायक और लक्षणों को मिटानेवाली दवा दीजिए।

निषेध :

कपास, आलू, तम्बाकू, मिर्च, टमाटर और अंगूर की फसल के आसपास के खेतों में इस दवा का उपयोग न करें अन्यथा, फसलों को नुकसान पहुँचेगा। फलीदार फसल पर भी यह दवा डाली न जाय, अन्यथा फसल को नुकसान पहुँचेगा। मछलियों को नुकसान पहुँचा सकने वाली परिस्थितियों में भी यह दवा न डालें।

संग्रह व्यवस्था :

इस दवा के पैकेट, थैले आदि ऐसे कमरों में या जगह में रखिए जहाँ दूसरी कोई चीज नहीं रखी जाती - अथवा दूसरी वस्तु की मात्रा और उसके गुण-धर्म को ध्यान में रखकर इस दवा को अलग अलमारियों में तालाबंद रखा जाए। इस दवा को पक्के-सूखे अच्छी रोशनी और खुली हवा वाले, वैसे ही इतने खुले कमरों में रखा जाय जहाँ इसकी बास से प्रदूषण न हो सके। **खाली डब्बे - थैले, मशीन की घुलाई के पानी और बची हुई सामग्री का निपटान :** इसके पैकेटों-थैलों को तोड़कर, बरसी से दूर किसी स्थान पर जला देना चाहिए। खाली पैकेट-थैले बाहर नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि इन्हें दुबारा इस्तेमाल करना अच्छा नहीं। दवा के पैकेटों, बची हुई सामग्री और मशीन की घुलाई के पानी की इतने सुरक्षित ढंग से निकासी की जाय कि इससे हवा या पानी दूषित न हो।

निर्माता:

शुभकेम इंडस्ट्रीज प्रा० लिमिटेड

एस-३ ए/१९, जगतपुर इंडस्ट्रीयल एस्टेट (न्यु)

जगतपुर, कटक - ७५४ ०२१ (उड़ीसा)

वितरक :

गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड

पंजिकृत कार्यालय-फिरोजशा नगर

इस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, विक्रोली, मुंबई-४०००७९

WEEDNASH

HERBICIDE

2,4-D Amine Salt 58% S.L.

A selective herbicide controls broad-leaved weeds, sedges and germinating grass seedlings.

Directions :

Add required quantity of 2, 4-D Amine Salt 58% S.L. to a half-filled spray tank. Mix thoroughly and fill the sprayer with water. Apply by using any standard 'High' or 'Medium' volume sprayer in not less than 100 litres of water per acre. Increase the volume to 200 litres per acre if weeds or crop are dense as good coverage is essential. For best effects apply when weeds are young (2 to 3 leaf stage).

Dosage :

(a) Selective inter-row weed control in :

PADDY - 400-450 ml/acre 21-28 days in 200 litres of water after planting.

WHEAT - 500-700 ml/acre 28-35 days in 200 litres of water after seeding.

(b) Pre-crop emergence overall in :

SUGAR CANE & MAIZE - 1 Litre/acre 2-3 days after planting/seeding.

(c) WATER WEEDS - Water Hyacinth and Pistia Sp. Spray overall 1-2 litre/ acre in 200-250 litres of water. Spray before the weeds become dense or matty. Repeat, if necessary after 2-3 weeks.

TEA : 500-600 ml/Hectare in 200 Litres of water.

Precautions :

The application equipment must be thoroughly washed before it is used for applying other pesticides. Do not store near the seeds, fertilizers and insecticides. Do not mix with bare hands. Avoid spray drift. Keep farm stocks away from the sprayed areas for at least two weeks.

Symptoms of poisoning :

Weakness, lethargy, anorexia, diarrhoea, spasticity of muscles of the mouth and limbs and myotonia cardiac arrest may occur. Hyperpyrexia and protracted peripheral neuritis may be complications in acute cases.

First aid :

If swallowed induce vomiting by giving a tablespoon of slat in a glass or warm water. Repeat until vomit fluid is clear. If clothing has been contaminated remove the clothing and wash the skin thoroughly with soap and water, then flush the skin with plenty of water, if the chemical has gone into the eyes flush the eyes with plenty of water for at least five minutes.

Antidote :

Gastric lavage. Quinidine Sulphate to counter myotonia and ventricular fibrillation. Supportive and symptomatic treatment.

Limitations for use :

Do not spray the crops in the neighborhoods of cotton, potato, tobacco, chillies, tomato and grapes as they are very susceptible. Do not use in leguminous crops as it reduces nodulations. Do not use in those situations if there is a possibility of harming fish.

Storage :

The packages containing the material shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises needed for storing other articles or shall be kept in separate almirah under lock and key, depending upon the quality and nature of the material. The rooms or premises meant for storing the material shall be well built dry well-lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Disposal of containers, washing from equipment and surplus material :

The packages shall be broken and burned away from habitation. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. Packages or surplus material should be disposed of in safe manner so as to prevent environment or water pollution.

Manufactured by :

SUVOCHEM INDUSTRIES PVT. LTD.

S-3, A/19, JAGATPUR INDUSTRIAL EASTATE (NEW), JAGATPUR, CUTTACK-754 021

Marketed By :

GODREJ AGROVET LIMITED

REGD. OFFICE : PIROJSHANAGAR,

EASTERN EXPRESS HIGHWAY

VIKROLI, MUMBAI-400 079

बीडनाश

आगाहानाशक

२,४-डि आमिन सल्ट ५८% एस. एल.

এই আগাছানাশক ওষুধ বিশেষ চওড়া পাতাওয়ালা আগাছা, হোগলা, আর উঠন্তু ঘাসের চারা বিনাশ করে।

নির্দেশাবলী :

আধা-ভরা স্প্রে ট্যাংকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ২.৪ ডি আমিন সল্ট ৫৮% এস. এল. মেশান। ভাল করে মেসানোর পর স্প্রেয়ারটি জল দিয়ে ভরে দিন। যে কোনো প্রামাণিক হাই কিম্বা মিডিয়াম ভলিউম স্প্রেয়ার দিয়ে স্প্রে করার জন্য কমপক্ষে ১০০ লিটার জলের দরকার। আগাছা বা ফসলের গাছ ঘন হলে মিশ্রণের পরিমাণ ২০০ লিটার পর্যন্ত বাড়িয়ে দিন। কারণ, সবজায়গায় এই ওষুধ ভাল করে লাগা চাই। সবচেয়ে ভাল ফল পেতে হলে আগাছা কচি থাকতে থাকতে (২টি কি ৩টি পাতা গজালেই) এই ওষুধ লাগান।

মাত্রা :

(ক) নিম্নোক্ত শস্যের ক্ষেত্রে শস্য-সারির মধ্যে বিশেষ ধরনের আগাছা নিয়ন্ত্রণ করতে **ওষুধের মাত্রা হবে :**

ধান : চারা লাগাবার ২১-২৮ দিন পরে একর প্রতি ২০০ লিটার জলের সাথে ৪০০-৫০০ মিলি ওষুধ মিশিয়ে স্প্রে করবেন।

গম : অঙ্কুর গজাবার ২৮-৩৫ দিন পরে ২০০ লিটার জলের সাথে ৫০০-৭০০ মিলি **ওষুধ মিশিয়ে স্প্রে করুন।**

(খ) নিম্নোক্ত শস্যে উদ্গমের আগে ক্ষেতের সব জায়গায় লাগাবার জন্যে মাত্রা হচ্ছেঃ আখ ও ভুট্টাঃ রোপণ /রোনার ২-৩ দিন পরে একর প্রতি ১ লিটার হারে ব্যবহার করুন।

(গ) জলের আগাছাঃ কচুরিপানা ও পিস্টিয়া স্প্রে, বিনাশ করতে একর প্রতি ২০০-২৫০ লিটার ১-২ লিটার ওষুধ মিশিয়ে স্প্রে করুন। আগাছা অতি ঘন কিম্বা জট পাকিয়ে ওঠার আগে স্প্রে করবেন।

চাঃ ২০০ লিটার জলে ৫০০-৬০০ মিলি ওষুধ মিশিয়ে প্রতি হ্যাকটেয়ারে স্প্রে করুন।

সতর্কতা :

অন্যান্য কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ করার জন্যে ব্যবহার করার আগে স্প্রে করার যন্ত্রপাতি ভাল করে ধুয়ে নিন। বীজ, সার, ও কীটনাশক ওষুধের কাছাকাছি রাখবেন না। খালি হাতে মেশাবেন না স্প্রে-এর জল উড়ে এসে গায়ে লাগতে দেবেন না। এই ওষুধ স্প্রে করা জায়গাতে দূষণহীন পর্যন্ত গৃহপালিত পশুপক্ষীদের খেতে দেবেন না।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ :

দর্বলতা, আলসা, আহারে অনিচ্ছা, পেটের অসুখ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পেশীর খিটুনি, পেশীর কম্পন, ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। জটিল অবস্থায় অত্যধিক তাপ আর একটানা স্নায়ু প্রদাহ ঘটে।

প্রাথমিক চিকিৎসা :

গিলে ফেললে এক গ্লাস ঈষদুষ্ণ জলে বড় চামচের এক চামচ লবণ মিশিয়ে খাইয়ে বমি করান। বমির জল পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত খাইয়ে যাবেন। জামাকাপড়ে এই ওষুধ লাগলে জামাকাপড় খুলে ফেলে সাবান ও জল দিয়ে ভাল করে গা ধুইয়ে দিন, তারপর সবাসে প্রচুর জল বাপটা দিন। এই ওষুধ চোখে লাগলে কম পক্ষে পাঁচ মিনিট ধরে প্রচুর জল বাপটা দিয়ে চোখ পরিষ্কার করে দিন।

প্রতিবেদক :

ভাঙারের সাহায্যে পাম্প করে পেট পরিষ্কার করান। পেশীর কম্পন বন্ধ করতে এবং হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন নিয়মিত করার জন্যে কুইনিডিন সালফেট দিন আর সহায়ক ও লাক্ষনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।

ব্যবহার সীমা :

তুলো, আলু, তামাক, লঙ্কা, টমাটো ও আঙ্গুরের ক্ষেতের কাছাকাছি এই ওষুধ স্প্রে করবেন না কারণ অতি সহজেই এসব ফসলের ক্ষতি হয়। শুটিদার ফসলে এই ওষুধ ব্যবহার করলে ফসলের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। মাছের ক্ষতি হতে পারে এমন জায়গায় প্রয়োগ করবেন না।

সংরক্ষণ :

এই ওষুধের প্যাকেজগুলি পরিমাণ ও প্রকৃতি অনুসারে অন্যান্য জিনিস রাখার ঘর অথবা জায়গা থেকে আলাদা ঘর কিম্বা জায়গায় আলাদা আলাদা আলমারিতে রেখে তালাবদ্ধ করে রাখবেন। বাষ্প দ্বারা সংক্রমণ যাতে না ঘটে তার জন্যে এই আগাছানাশক ওষুধ গুদামজাত জন্যে কিম্বা জায়গা মজবুত, শুকনো, প্রচুর আলো-বাতাসযুক্ত এবং যথেষ্ট বড় হতে হবে।

খালিপাত্র, যন্ত্রপাতি ধোয়ানি এবং উদ্ধৃত নষ্ট করা :

খালি প্যাকেজগুলি ভেসে লোকবসতি থেকে দূরে পুড়িয়ে ফেলুন। খালি প্যাকেজগুলির পুনর্ব্যবহার প্রতিরোধে বাইরে ফেলে দেবেন না। প্যাকেজ স্প্রে মিশ্রণের তলানি এবং যন্ত্রপাতি ধোয়ানি এমন ভাবে নষ্ট করে ফেলুন যাতে পরিবেশ অথবা জলধারা দূষিত না হয়।

প্রস্তুতকারক : **শুভকেম ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড**

এস-৩-এ-১৯ জগৎপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট (নিউ), জগৎপুর, কটক-৭৫৪০২১

বিক্রেতা : **গোদরেজ এগ্রোবেট লিমিটেড**

পংজিকৃত কার্যালয়-ফিরোজশা নগর, ইস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়ে, বিক্রোলা, মুম্বই-৪০০০৭৯